

郭

也陰不足則陽邪入裏而與陰爭乃陽勝而為熱也若邪入而正氣不與之爭則但熱而無寒矣陽不足則先寒陰不足則先熱表邪多則寒多裏邪多則熱多半表半裏則寒熱相等半往半來而間作也入門。瘧者少陽也少陽者專治之氣也逆行則發寒順行則發熱故分之氣異往來不定也東垣。身後為太陽太陽者膀胱水寒也身前為陽明陽明者大腸金燥也少陽之邪在其中近後膀胱水則惡寒近前陽明燥則發熱故為往來寒熱也東垣。甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣直指

瘧發日數多少

夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外因秋遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣並居衛氣者晝日行於陽夜行於陰氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作。經。衛氣與邪相並則病作與邪相離則病休其並於陰則寒並於陽則熱離於陰則寒

已離於陽則熱。次日又集而並合則復病也。
綱目。其日發者由邪氣內薄於五藏橫連募

原也。其道遠其行遲不能與衛氣俱行不得皆出

故間日乃作也。內經。時有間二日或至數日發

或渴或不渴其故何也。曰其間日者邪氣與衛氣

客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作

也。瘧者陰陽更勝也。或甚或不甚故或渴或不渴

內經。三日一發者受病一年間日一發者受病

半年連日發者受病一月二日連發住一日者氣

血俱受病也。又曰三日一發陰經受病也。最重。丹

水。陽為府邪淺與榮衛並行一日一發。陰為

藏邪深橫連募原不能與正氣並行故間日蓄積

乃發或三四日一發

久則必為瘧母。入門

瘧發有晝夜早晏之異

帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯曰邪氣客於風府循

膂而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下
節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府

則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此
作日稍益晏也其出於風府日下一節二十五日
下至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂之脉其
氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益
早也內經○陽為晝發邪淺榮衛晝行背與脊故
也○陰為夜發邪深榮衛夜行臂與腹故也○陽
為子時至巳陰為午時至亥如發寅卯而退於未
申或發未申而退於子丑皆謂之陰陽不分須用
藥釐早或移時分定陰陽然後陽瘧截住陰瘧升
散入門○從卯至午發者邪在外也從午至酉發
者邪在內也從酉至子發或至
寅發者知邪在血分也保命

六經瘧

夏傷於暑秋必病瘧初不知何經受病隨其受
而取之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪
氣其證各殊在太陽經者謂之寒瘧治多汗之在
陽明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂之
風瘧治多和之此三陽受病皆謂暴瘧發在夏至
後處暑前此乃傷之淺者近而暴也○在陰經者

則不分三陰皆謂之溫瘧其發在處暑後冬至前

此乃傷之重者遠而深也瘧瘧者老瘧也故謂之

久瘧保命○傷寒餘熱未淨重感於寒而變瘧名

曰溫瘧亦曰風瘧此為傷寒壞病其證先熱後寒

入門○瘧屬三陽宜汗宜吐瘧屬三陰宜下宜和

宜溫正傳○太陽瘧宜桂枝羌活湯麻黃羌活湯

○陽明瘧宜人參白虎湯柴苓湯二方並見寒門

○少陽瘧宜柴胡桂枝湯柴胡加桂湯○三陰溫

瘧宜白虎桂枝湯麻黃白朮湯或小柴胡合四物

湯名曰柴胡四物湯○太陽陽明合病桂枝芍藥

湯桂枝石膏湯三陽合病宜

桂枝黃芩湯以和之保命

桂枝羌活湯

治太陽瘧自汗頭項痛腰脊強桂枝羌活防風甘艸各一錢半右剉作一貼水

煎服

綱目

麻黃羌活湯

治太陽瘧無汗即前方去桂枝加麻黃也劑法服法同上綱目

柴胡桂枝湯

治少陽癰寒熱乍往乍來柴胡二錢桂枝黃芩人參芍藥半夏各一錢甘草五

分右剉一貼入薑三

棗二水煎服入門

柴胡加桂湯

治少陽癰往來寒熱極驗柴胡三錢黃芩桂枝各二錢半夏一錢甘草四分右

剉作一貼入薑三

棗二水煎服入門

白虎桂枝湯

溫癰者其脉如平身無寒但熱骨節煩疼時便難朝發暮解暮發朝解此藥主

之石膏四錢知母二錢桂枝甘草各一錢粳米一

合右剉作一貼水煎服傳正。一名加減桂枝湯得

麻黃白朮湯

治風癰麻黃桂枝皮青皮陳皮川芎白芷半夏麴紫蘇葉赤茯苓白朮桔梗細辛

檳榔甘艸各七分右剉作一

貼入薑三棗二水煎服直指

柴胡四物湯

治三陰經溫癰或夜發者柴胡生乾地黃各二錢人參半夏黃芩甘草川芎當

歸赤芍藥各一錢右剉作

一貼入薑三棗二水煎服

桂枝芍藥湯

治瘧寒熱大作此太陽陽明合病也謂之大爭寒熱作則必戰動發熱則必汗

泄經日汗出不愈知為熱也不治則恐久而傳入

陰經宜用此桂枝一錢赤芍藥知母石膏黃芩各

二錢右剉作一

貼水煎服保命

桂枝石膏湯

治太陽陽明合病間日瘧熱多寒少石

膏知母各三錢黃芩二錢桂枝一錢右

剉作一貼水

煎服之入門

桂枝黃芩湯

服桂枝芍藥湯後寒熱轉甚者知太陽

陽明少陽合病也宜用此和之柴胡二

錢石膏知母各一錢半黃芩人參半夏甘草各

一錢二分桂枝一錢右剉作一貼水煎服保命

瘧晝發夜發宜分治

氣虛晝發宜六君子湯方見內傷加半夏黃

芩。血虛夜發宜柴胡四物湯。方見上 桃仁承氣湯。方見寒門 麻黃黃芩湯。柴胡芎歸湯。諸方

麻黃黃芩湯

治夜發癰麻黃三錢黃芩二錢甘草一錢半桂心一錢桃仁十五枚右剉作一

貼水煎臨卧服。桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此麻黃黃芩湯乃發散血中風寒之劑也。目細

柴胡芎歸湯

治夜發陰癰引出陽分而散後服人參

櫻當歸赤芍藥人參厚朴白朮茯苓陳皮各七分紅花甘草各三分右剉作一貼入薑三棗二梅一水煎服。同春

諸癰證治

癰有風癰寒癰熱癰溼癰痰癰食癰勞癰鬼癰疫癰瘡癰疔癰老癰。諸方

風癰

自感風而得先熱後寒宜麻黃白朮湯無汗則宜散邪湯有汗則宜正氣湯。入門

寒瘧

自感寒而得寒多熱少宜人參養胃湯方見寒門
交解飲果附湯草果飲柴胡桂薑湯。一名牝瘧

熱瘧

因暑勝熱多得之一名癰瘧亦曰暑瘧宜人參白
虎湯柴芩湯二方見寒門柴胡知母湯爭功散

溼瘧

因冒襲雨溼汗出澡浴得之寒熱相半小便
不利宜五苓散方見寒門加蒼朮川芎羌活入門

痰瘧

因外感內傷鬱聚成痰頭痛肉跳吐食嘔沫甚則
昏迷卒倒宜柴陳湯加草果或四獸飲冷附湯久

不止以露薑飲截之入門。有人忽得瘧疾嘔吐

異常以二陳湯方見痰門加人參縮砂倍用白豆

蔻進一二貼自然寒熱不作蓋白豆蔻能消

能磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平也直指

食瘧

一名胃瘧因飲食失節飢飽有傷所致寒已復熱
熱已復寒寒熱交併苦飢而不能食食則吐痰經

勞瘧

日寒熱善飢而不能食食已支滿腹脹病以日作
名曰胃瘧是也宜平陳湯加枳實白朮山楂子神
麴青皮或清脾飲小清脾湯又二陳湯
加青皮檳榔縮砂白豆蔻亦佳諸方

印久瘧也寒熱微微寒中有熱熱中有寒最難調
治由表裏俱虛真氣未復疾雖暫止小勞復來經

年不差宜芎歸龍甲散常山飲玉勞丸六和湯烏

頭七棗湯露薑養胃湯十將軍丸一補一發丹辰

砂丸養胃丹諸方。久瘧屬元氣虛寒蓋氣虛則

寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流

則寒熱交作或吐涎不食或泄瀉腹痛手足逆冷

寒戰如慄皆脾胃虛弱也但服補中益氣湯方見

內傷諸證悉愈若投清醫鑒今人參因發熱

脾截瘧多致不起醫鑒今人參因發熱

因感尸症客忤寒熱日作夢寐不祥多生恐怖互

鬼瘧

辟邪丹雄朱丹或燒人場土作丸塞男左女右鼻

人中

門入

疫癘

一方長幼相似或染時行變成寒熱須茶運氣用藥宜不換金正氣散方見寒門如意丹五瘟丹癘

瘧癘

挾山溪嵐瘴蒸毒之氣令人迷困發狂或啞乍寒乍熱乍有乍無南方多病此宜雙解飲子地龍飲

羌活蒼朮湯瘧疽丸方見瘧門觀音丸諸方

瘰癧

者老瘰也以其隔三日一發纏綿不去也綱目○

者少陰經瘰也作於寅申巳亥日者厥陰經瘰也

作於辰戌丑未日者太陰經瘰也瘰得於暑當以

汗解夫感冒與風皆外邪也故非汗多不解必先

與參朮等補劑為君加柴葛等發散藥漸而收汗

得汗而虛又行補養下體屬陰最難得汗補藥力

到汗出至足方是佳兆丹心○老瘰係風暑之邪

入在陰分宜用血藥引出陽分而散古方多用峻

劑恐非所宜丹心○若感病極深雖得大汗所感

之邪必自藏傳出至府其發無時必亂而失期若
發於午之後寅之前者血受病也為難愈須漸趨
早亦是佳兆故治此病春夏為易秋冬為難非有
他也以汗之難易為優劣也丹心○凡瘧經年不
差謂之老瘧必有痰水瘀血結成痞塊藏於腹脇
作脹且痛乃瘧母也雖內虛非常山檳榔決不能
除但須製熟則不損胃老瘧丸是也血虛者宜鼈
甲丸有水癖者暫用消癖丸以補脾化痰湯藥輔
之且量虛實用老瘧飲入門○老瘧宜七棗湯鼈
甲飲子參歸鼈甲散秘方清脾丸經效瘧丹黃甲
丸

徹邪湯

治風瘧初起川芎白芷麻黃白芍藥防風荊
芥紫蘇葉羌活各一錢甘艸五分右剉作一

貼入薑三蔥白三莖煎
露一宿早晨溫服

醫鑑

正氣湯

治同上柴胡前胡川芎白芷半夏麥門冬檳
榔草果青皮赤茯苓各一錢桂枝甘艸各五

分右剉作一貼入薑
三棗二水煎服 醫鑑

交解飲

治寒癰即雙解
飲子也 方見下

果附湯

治脾寒癰疾面青振寒草果附子炮各二錢
半右剉作一貼入薑七棗二水煎服 入門

草果飲

治寒癰草果白芷良薑青皮川芎紫蘇葉
甘州各一錢右剉作一貼水煎服 直指

柴胡桂薑湯

治邪在半表裏寒熱往來極驗柴胡三
錢桂枝牡蠣各一錢半天花粉黃芩各

一錢乾薑甘州各八分右

剉作一貼水煎服 入門

柴胡知母湯

治熱癰及瘰癧柴胡知母各一錢半蒼
朮黃芩乾葛陳皮半夏川芎各一錢甘

州炙七分右剉作一貼入薑三梅二水煎清

晨服午煎又一服久癰加人參當歸 節齋

爭功散

治熱癰多效知母貝母柴胡常山梔子檳榔
地骨皮甘草各一錢蟬退二七箇右剉作一

貼入桃柳枝各五寸煎服未效
加過路葛藤五寸同煎服得效

龍虎湯

治熱瘧火盛舌卷唇焦鼻如烟熏六脉洪緊
石膏二錢半柴胡黃連各一錢半黃芩知母

黃栢各一錢梔子八分半夏七分粳米百粒右剉作一貼人薑三棗二水煎服醫鑑

柴陳湯

治痰瘧柴胡半夏各二錢人參黃芩陳皮赤茯苓各一錢甘州五分右剉作一貼薑三棗

二水煎服入門

四獸飲

治七情聚痰王藏氣虛瘧久不已人參白朮白茯苓陳皮半夏草果甘州烏梅生薑大棗

各一錢右剉作一貼拌鹽少許淹食頃以皮紙包果水浸溼慢火煨香熟取出水煎服未發前連進

數貼即效得效

冷附湯

瘧疾無過是痰實而脾胃弱停于胃膈所以五更冷服使藥下達壯脾胃去痰實也大附

子一箇炮去皮臍右切片分二貼每一貼入薑十片水煎去滓露一宿五更初冷服得效

露薑飲

治痰癰生薑四兩連皮搗爛止取自然汗約明日當發隔夜安排將紗片蓋露一宿五更

初澄者一上飲之或有痰吐任之即安得效

平陳湯

治食癰蒼朮半夏各二錢厚朴陳皮赤茯苓各一錢三分半甘州七分右剉作一貼薑三

棗二水煎服入門

清脾飲

治食癰柴胡半夏黃芩草果白朮赤茯苓厚朴青皮各一錢甘州五分右剉作一貼入薑

三棗二水煎服。此方乃小柴胡平胃二陳合而爲一也一方加常山二錢煎之露服五更截癰令

人不吐爲妙。一

名清脾湯入門

小清脾湯

治胃癰厚朴二錢烏梅肉半夏青皮良薑各一錢草果甘草各五分右剉作一貼薑

三棗二煎
服得效

芎歸鼈甲散

治勞瘵鼈甲二錢川芎當歸赤茯苓赤芍藥半夏陳皮青皮各一錢烏梅一箇

右剉作一貼入薑五棗二水煎服入門

常山飲

治勞瘵常山知母草果各一錢半良薑一錢烏梅肉甘州各五分右剉作一貼入薑五棗

二水煎服入門

五勞丸

治勞瘵及瘴瘵常山三兩半桃仁一兩二錢辣桂七錢半淡豉三兩半烏梅肉二兩半右

日乾為末蜜丸梧子大空心溫酒下三四十九直指

六和湯

治瘵久不愈常山二錢知母貝母人參草果白芷烏梅檳榔柴胡各一錢右剉作一貼入

薑三棗二酒水相半同煎露一宿臨發日服之丹心

烏頭七棗湯

治勞瘵及寒瘧大川烏一箇以鹽水浸炮七次去皮臍右剉分二貼每貼入薑

七棗七葱白三水煎稍冷先喫棗乃服藥直指

露薑養胃湯

治久瘧三五日一發者先以生薑四兩搗取自然汁露一宿次早將入參養胃

湯方見寒門一貼入棗二梅一同煎去滓和薑汁空心溫服醫鑑

十將軍丸

治久瘧及瘧母綱砂檳榔常山艸果各二兩三稜蓬朮青皮陳皮烏梅半夏各一兩

右先將常山草果酒醋各一椀浸一宿後入八味同浸至晚炭火煮乾為末酒醋各半打糊和丸梧子大白湯下三四十九日二服服至八兩即除根丹心

一補一發丹

治久瘧內傷挾外感間發內治痰外發汗赤茯苓一兩半夏陳皮柴胡黃芩蒼

朮葛根各七錢常山三錢右為末麵糊和丸梧子大白湯下七十丸入門

辰砂丸

治久癰不損元氣辰砂阿魏真者各一兩右研勻稀米糊和丸皂角子大空心以人參湯

化下一丸得效

養胃丹

治久癰二三年不愈者蒼朮常山酒蒸各二兩半夏陳皮厚朴各一兩半赤茯苓藿香草

果各一兩甘艸炙五錢烏梅四十九箇取肉右爲末淡薑湯打糊和丸梧子大薑湯下五七十丸醫

辟邪丹

治嵐瘴鬼癰菹豆雄黑豆各四十九粒信砒半錢另研黃丹一錢朱砂二錢右爲末滴水

和勻分作三十粒每一粒取東南桃枝七枚研汁和并華水早晨日出時面東吞之虛人慎勿用

雄朱丹

治鬼癰大黑豆四十九粒約五錢重端午日以冷水浸從早至巳時去皮晒乾研入信砒

未一錢再研勻麪糊和勻作丸少壯人梧子大老人黃豆大小兒菹豆大雄黃朱砂爲衣晒乾收貯

臨發五夏面東井水下丸一名癰靈丹醫鑒

入門