

活人慈航

牙宣此症牙齦宣腫齦肉日漸腐爛久則崩縮以致牙齒腐露由胃客熱積久外受邪風寒涼相搏而成有喜涼飲而惡熱者係客熱遇寒涼凝滯於齦肉之內客熱遇寒者牙齦出涼者係客熱受邪風凝於齦肉之內客熱遇寒者牙齦出血惡熱口臭宜清胃散客熱受風者宜獨活散後俱用涼膈散加生地丹皮外俱用水研散抹之

清胃散

石膏

四兩

黃芩

生地

丹皮

黃連

各半

升麻

一兩

獨活散

獨活

羌活

防風

川芎

各六分

薄荷

生地

荊芥

各一

細辛

七分

為散每服二錢日三服

鑽牙疳由肝胃二經積熱所致乃牙根肉內鑽出骨尖如刺
疼痛異常小兒多有之宜被針就患處刺開好肉連牙齊
根取出若血出不止用溼紙換貼數次內服蘆薈消疳飲
外敷冰硼散

蘆薈消疳飲

蘆薈

胡黃連

石膏

羚羊角

梔子

牛子

銀胡

桔梗

大黃

元參 各五分

薄荷

甘草

各三分 竹葉不

牙疳由胃中火毒或太陽溼熱皆可致之每生兩傍牙縫腫
起一粒形如粟米痛連腮頰項若兼麻癢破流血水疼痛異
常者即黑疔也屬腎火毒宜刺破見血為度搽入蟾酥丸
又以蟾酥丸噙化徐徐嚥之若煩躁口渴宜黃連解毒湯
若失治毒反攻心煩躁昏憤者逆

牙疳由胃經熱毒所致生於牙床堅腫疼痛身發寒熱腮頰浮腫初宜荊防敗毒散若大渴煩嘔者蟾酥丸汗之便開者貴金丸下之腫處宣軟刺破搽冰硼散若初時堅腫破流血水久不收口過食寒涼必生多骨候骨尖刺出搖則內動始可取出其口方能收斂

走馬牙疳最為迅速多由癖疾積火疹痕餘毒上攻而成初起口臭牙根腐爛隨變黑色臭穢難聞治法必用累攻宜蕪荑消疳湯若不能食者宜隔一日或隔二日攻之不必戒口若堅硬青紫腐穿腮頰臭穢齒脫者不治外用人中白枯白礬等分為末塗之

蕪荑消疳湯

雄黃

無荑

大黃

蘆薈

黃連

胡黃連

黃芩

牙齒痛有痛而腫者有痛而不腫者有痛引腮頰頭腦者有惡熱者有惡冷者凡牙齒上斷屬足陽明下斷屬手陽明牙齒屬腎 牙痛得冷便痛者宜從治如萆撥川椒薄荷荊芥細辛章腦青鹽為末擦之及一笑丸 牙痛得熱則痛者宜辛涼藥如黃連苦參薄荷荊芥升麻為末擦之及冰硼散 牙齒痛而腫者屬血分宜生地赤芍歸尾丹皮以涼血 牙齒痛而不腫者屬氣分宜川芎白芷防風荊芥青皮以散熱 牙齒痛而件引頭腦者陽明經脉不動宜升麻細辛川芎白芷獨活宣散通其經脉 凡牙齒痛均屬陽明胃火宜清胃散及牙痛方 夫陽明者陽極多血多氣之經也風寒等邪到是經皆化為熱或素食積熱上犯經脉凝結牙根而作大痛方書有風寒邪犯牙痛亦多風寒搏於熱也若陰虛火浮牙痛時作時止宜甘露飲

八味地黃丸加減八味地黃丸陰虛於下則少陽相火乘入陽明而上行則時痛時止由漸而甚若煩勞傷中鬱志傷肝致動少陽相火上乘而牙痛者宜梔子煎雜食以降鬱火也故效 齒長動搖為腎虛宜還少丹地黃丸百效云牙齒痛疼宜分經上四齒屬心下四齒屬腎二邊上下屬脾胃左邊上下牙盡處屬肝與膽右邊上下牙盡處屬肺與大腸均宜牙痛方屢獲奇效 又方牙齒疼痛不論上下二邊出血及黑縫虫蛀等症用桂附八味丸屢效

牙痛方

石膏

荊芥

防風

丹皮

甘草

生地

青皮

痛甚加膽草

心經加黃連麥冬

肺經黃芩桔梗

肝經柴胡梔子

信下之下 卒 仁川外科

腎經黃柏知母 脾胃經白芷大黃梔子

蟲牙痛名齒齲其牙有孔蛀盡一牙復蛀一牙其齒缺少而色變甚則齒齲脹痛腐爛時出膿血口臭甚者胃火極盛上攻所致也先服玉池散次服牙痛方外用蕪荑仁搗爛塞入孔內或用好醋溫漱虫出自愈或用韭菜子燒烟薰之 海藏云虫牙痛數年不愈當作畜血治宜桃仁承氣湯蜜丸服好飲過多者多得此疾屢效

舌部 喉部 俱列在雜症集腋內

肩部

肩中疽生於肩中廉屬三焦膽二經紅活高腫一名疵癰堅硬平塌為肩中疽肩之前廉屬大腸經名乾疽肩之後廉屬小腸經名過肩疽無論瘡勢大小惟在發原之處命名也俱由淫熱風邪鬱成亦有負重瘀血凝結而成高腫紅

活炊熱速潰者順若平塌堅硬無紅無熱潰遲者險甚則
腫痛連及臂胛口禁寒戰大痛不食或兼綿潰便瀉者逆
初起有表症宜敗毒散汗之有裏症宜黃連湯下之汗下
後腫痛不退膿勢將成宜托裏透膿湯膿熱針之臨時加
入引經藥

膠疽生肩之後下腋之後外微上歧骨縫之間經屬小腸堅
貞穴由風火凝結而成初起如粟堅硬腫痛肩膈拘急不
能舉揚初服敗毒散便實貴金丸

肩風毒生於肩稍臈上骨尖處屬大腸經肩髃穴由邪風深
套骨縫與溼稽留化熱而成初起宣腫色赤大者如桃小
者如杏痛連肩膈更兼拘急初服蠲痛無憂散汗之即消
若腫痛日深不能全消者膿勢將成也宜托裏透膿湯

蠲痛無憂散

番木別

即馬前

當歸

甘草

麻黃

半夏

山甲珠

川烏

草烏

蒼朮

鹽山

等分

為末酒下一錢

樂疽生於肩前腋之上骨縫開合空凹陷中初起如椒子漸
腫堅硬大如鵝卵按之疼痛入骨屬包絡經血熱氣鬱而
成其症信期潰破出稠膿腫消者順月餘不潰既潰出清
水腫硬不退者逆初宜衛生湯若惡風太過者加蔥白汗
之次服托裏透膿湯潰遲宜大補湯

臍部

自肩至肘曰臍

臍癰由風瘟或風火凝結而成生於肩下肘上週匝漫腫色
赤焮痛初起狀如粟米一攢亦有起一粒殭疣瘡者漸次
焮腫紅熱疼痛紅腫之外無暈者順有二暈者險三四暈
者逆腫發臍內或臍外結腫一枚如桃如蛋名藕包毒青

者癰之輕症也。臈癰、藕包、毒內、外治法按癰疽若在臈內者，屬手三陰經在臈外者，屬手三陽經。隨症加引經藥，必然獲效。

魚肚發生臈之後，垂肉處屬心經。青靈穴由火毒凝結而成，暴腫色赤，焮熱疼痛，形如魚肚。法按癰疽臨症加引經藥。石榴疽生肘尖上寸餘，屬三焦經。天井穴初起黃粟小，炮根脚便覺開大，色紅，焮腫堅硬，疼痛腫如覆碗，破翻如榴寒熱如瘡，由三焦相火與外淫相搏而成。初宜蟾酥丸汗之外，以艾灸九壯貼蟾酥丸料膏蓋腫處，敷冲和膏服菊花清燥湯煩躁熱甚者服護心散九日後作稠膿痛減喜食表裏症俱退者順反此者逆破後用菊花煎洗次以菊花燒灰存性加輕粉少許敷之神效。

菊花清燥湯

菊花

生地

當歸

川芎

白芍

知母

犀角

貝母

地骨皮

麥冬

各一

柴胡

黃芩

升麻

甘草

各五

竹葉

二十片

燈心

二十寸

肘癰生於肘之圍繞暴發高腫焮熱色紅疼痛由心肺風火之邪凝滯而成形勢小者為癰毒形勢大者為癰初宜敗毒散汗之次服白芷升麻湯外敷拔毒散

白芷升麻湯

黃芩

連翹

黃芪

白芷

升麻

桔梗

紅花

甘草

酒水煎服

臂部

自肘至腕曰臂

臂癰臂疽生臂外側屬手三陽經臂內側屬手三陰經高腫紅活焮痛潰速者慎為癰平陷紫暗堅硬木痛潰遲者為

疽俱由榮衛不調感受風邪逆於肉理而成初起形如粟粒憎寒壯熱宜敗毒散汗之焮腫疼痛煩熱宜白芷升麻湯消之膿勢將成宜托裏透膿湯膿熟針之若疽症木痛無紅無熱此屬氣血二虛不論已潰未潰宜大補湯托之若拳縮筋不能舒疼痛徹骨者係潰深傷脉也屬逆

腕

癰生於手腕背面屬手三陽經由風火凝結而成高腫紅活者十四日潰破膿出痛減者順手腕乃皮肉澆薄之處若延日久不潰或漫腫平塌既潰腐爛露骨者逆初服敗毒散汗之外用紫金錠敷之膿成宜托裏

兌

疽生手腕裏面橫紋前稍動脉之間兌骨裏側屬肺經太

淵穴由憂思氣滯風火結成堅硬漫腫疼痛徹骨手轉不能轉動此動脉處乃肺經門戶或潰深大洩肺氣最為陰候內外治法按癰疽

穿骨疽生於間使穴在掌後橫紋上三寸兩筋陷中屬包絡經蘊熱凝結而成初起如粟漸增堅硬漫腫微紅焮熱疼痛應期速潰者順若潰破遲緩膿毒潰穿骨縫從臂外側出膿者險治法內外按癰疽

骨蟬疽生於臂外側前廉大骨之後屬手陽明經由憂鬱暴怒凝結而成初如粟豆旬日大如桃李腫硬疼痛瘡根收束多見五善之症順若紫暈開大腐爛斑點串通肌肉抽搐拘急多見七惡之症者逆治按癰疽

蟬蛄串生臂內中廉掌後橫紋上二寸屬包絡經由思慮傷脾脾傷則運化遲故生濁液流於肌肉脾氣滯鬱不舒凝結而成初起筋骨如中流矢疼痛漸增漫腫堅硬不紅不熱連腫數塊漸次潰破孔孔時流白漿內潰串通諸孔外勢腫硬不消膿水淋瀝如漏虛症悉添如面黃食少消瘦

甚則午後寒熱交作而成敗症也初宜消遙散外敷紫金錠次服養榮湯十中可保二三

手部

手發背生手背屬手三陽經由風火凝滯而成初起形如芒刺漸覺疼痛高腫紅活炊熱潰速為癰若漫腫堅硬無紅無熱潰遲為疽無論形勢大小但潰深露筋骨者難痊初宜羌活散汗之次宜黃連湯下之

羌活散

羌活

二

獨活

二

前胡

一

桔梗

一

甘草

五分

肉桂

三分

當歸

二

烏藥

二

靈仙

二

升麻

一

荊芥

一

掌心毒生手掌心赤腫疼痛屬包絡經勞宮穴積熱而成若偏於掌邊名穿掌毒初起治同手發背餘按癰疽

虎口疽生合谷穴在手大指次指歧骨間屬大腸經溼熱凝結而成初起如豆漫大色青木痛堅硬名虎口疽若初起黃粟小炮養熱熨痛根深有紅線上攻腋內即名合谷疔無論疔疽初宜羌活散汗之內疎黃連湯下之疽症膿熟針之疔症初起將疔根挑破出血入蟾酥丸有紅絲者當紅絲盡處用針砭斷

病鰕生手背屬手三陽經積熱毒盛而成形勢如鰕高硬赤腫疼痛初宜黃連消毒飲外用食鹽酒糟香油同炒令香淬以滾湯淋洗患處即消如高硬不消再用蟾酥餅貼之外用膏藥蓋之以腐盡換紅玉膏收口塗烏金膏收口亦可

手了發生於手了歧骨縫間除大指合谷穴其餘指了生患即名手了發本於脾經溼火凝結而成初起如粟色紅漸大如豆熾熱疼痛潰後疼痛不止者俟膿塞脫出其痛方

止內外治法按疔門

無疔生手大指由肺經積熱而成初如粟豆漸腫如李子青紫麻木癢痛徹心六日刺破出稠膿鮮血者吉出黑血者險初服蟾酥丸汗之次服活命飲外敷拔毒散若黑腐延蔓不痛者逆

蛇頭疔天蛇毒此二症生手指頂尖然手指雖各有專經總兼肺經火毒而成蛇頭疔自筋骨發出根深毒重初起小蛇色紫疼痛堅硬如疔初宜服蟾酥丸汗之外敷雄黃散天蛇毒自肌肉發出其毒稍輕初起悶腫然頭色紅痛如火燎初宜服蟾酥丸汗之外敷雄黃杜鵑散二症服藥將成俱宜活命飲膿熟開之但手指皮肉澆薄之處不宜灸亦不宜開早否則以致皮裂努肉翻出疼痛倍增者不能速愈一法初起用磁針日破腫上出血效天蛇毒用

大田螺二三箇搥益糟包封指頭上二三次即愈

雄黃散

雄黃示 輕粉五分 蟾酥二分 冰片一分

為末水調重湯炖溫敷外用薄紙蓋之日三四次

雄黃牡蠣散

雄黃示 牡蠣四小塊 另研共和蜜水調濃溫塗能止痛

蛇疔有五如蛇眼疔生指甲二傍形如豆粒色紫半含半露
硬似鐵釘蛇背疔生指甲根後形如牛鼻色赤胖腫蛇節
疔又名蛇節疔生中節透指俱腫其色或黃或紫蛇腹疔
又名魚肚疔生指中節前面腫如魚肚色赤疼痛泥鯁疽
一指通腫色紫形如泥鯁熱痛連肘臂初起俱宜蟾酥
九汗之外敷雄黃散次服活命飲膿熟開之貼膏藥餘腫
敷鐵極散此五症不外火毒凝結而成屬何經臨時加入