

濟陰綱目卷之十

關中

武之望叔卿父輯著

武林

徐弘衍瑤璋父訂正

西陵

汪淇瞻漪子評釋

天都

查

望于周父叅閱

臨產

○論臨產調理法

原有產圖此
不載錄亦况
由法也

之生藥切不
可早若見未
轉身宜以補
血爲主而寬

大。全。云。凡。妊。娠。至。臨。月。當。安。神。定。慮。時。常。步。履。不。可。多。睡。飽。食。過。飲。酒。醴。雜。藥。宜。先。貼。產。圖。依。位。密。鋪。床。帳。預。請。老。練。穩。婆。備。辦。湯。藥。器。物。欲。產。時。不。可。多。人。喧。闐。愴。惶。但。用。老。婦。二。人。扶。行。及。僂。物。站。立。若。見。漿。水。腰。腹。痛。甚。是。胎。離。其。經。令。產。母。仰。臥。令。見。轉。身。若。見。頭。回。產。門。方。可。用。藥。催。生。坐。草。若。心。煩。用。水。調。服。白。蜜。一。匙。覺。饑。喫。糜。粥。少。許。勿。令。飢。渴。恐。乏。其。力。不。可。強。服。催。藥。早。於。坐。草。慎。

氣佐之

中指屬心胞絡也

固血之說宜

玩

八珍益母配法服法俱佳

之

薛氏曰欲產之時。覺腹內轉動。即當正身仰臥。待見轉身向下時。作痛。試捏產母手中指中節。或本節跳動。方與臨盆。即產矣。若初覺不仰臥。以待轉胞。或未產而水頻下。此胞衣已破。血水先乾。必有逆生難產之患。若胎衣破而不得分娩者。保生無憂散以固其血。自然生息。如血已耗損。用八珍湯料一觔。益母草半觔。水數十碗煎熟。不時飲之。亦有得生者。凡孕婦只腹痛未產也。若連腰痛甚者。將產也。蓋腎候於腰。胞繫於腎故也。凡孕家宜預請有仁心知事穩婆。當以恩結其心。先與說知。倘有生息不順。只說未產。或遇雙胎。只說胎衣未下。恐驚則氣散。愈難生息。余家親驗之大抵難產多患於鬱悶。安佚富貴之家。治法雖云胎前清氣。產後補血。

不可專執若脾胃不實氣血不充宜預調神不然臨產必有患難

○論臨產催生法

大全云大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生滑胎等

藥或勢不得已則服之又云切不可坐早及令穩婆亂動手凡催

必候腰痛甚胎轉向大法滑以流通滿滯若以驅逐閉塞香以開

下漿水破方可服竅逐血氣滯者行氣胞漿先破疾困者固血

丹溪云催生只用佛手散最穩當又効捷

○論難產由於安佚氣滯

大全云婦人以血為主惟氣順則血和胎安則產順今富貴之家

過於安逸以致氣滯而胎不轉或為交合使精血聚於胞中皆致

產難若腹或痛或止名曰弄胎穩婆不悟八手試水致胞破漿乾

固血如調水
於舟最穩當

血暈血溢以
永解之在暑
月尤宜餘月
亦無害惟少
與之

見難轉身亦難生矣凡產直候痛極見逼產門方可坐草時當盛暑倘或血暈血溢當飲清水解之冬末春初產室用火和煖下都衣服尤當溫厚方免胎寒血結若臨月洗頭濯足亦致產難

論難產由於氣虛不運

丹溪曰世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴奉養之家若貧賤辛苦者無有也古方書止有瘦胎飲一論而其方爲湖陽公主作也實非極至之言何也見有用此方者其難白若子表妹苦於難產後遇胎孕則觸而去之子甚憫焉視其形肥勤於針指回思旬日忽自悟曰此正與湖陽公主相反彼奉養之人其氣必實耗其氣使平和故易產今形肥知其氣虛久坐知其不運必氣愈弱見在胞胎用母氣不能自運耳當補其母之氣則兒健易產矣

此紫蘇飲最
穩當可法

今其有孕至六七個月來告遂以大全方紫蘇飲加補氣藥與數
十貼因得兒而甚快後遂以此方隨母形色性稟叅時令加減與
之無不應者因名其方曰達生散

○論難產由於血滯血乾

郭稽中曰產難者因兒轉身將兒枕血塊破碎與胞中敗血壅滯
兒身不能便利是以難產急服勝金散消其血使兒自易生陳無
擇云多因兒未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而血水
乾產路澁而兒難下宜先服催生如神散以固其血設或逆生橫
產當用前法針刺之

大全云治胞漿先破惡水來多胎乾不得下須先與四物湯補養
血氣次煎濃葱湯放冷令穩婆洗產戶須是欵曲洗令氣上下通

暢更用酥油滑石末塗產口裏次服神妙乳硃丹或葵子加聖散

楊子建十產論

一曰正產者婦人懷胎十月滿足忽腰腹作陣疼痛相似胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛穀道挺迸繼之漿破血出兒自遂生

二曰傷產者蓋因人之生陰注陽定名有時日不可改易今有未產一月已前忽然臍腹疼痛有如欲產仍却無事是名試月非正產也但一切產母未有正產之候即不可令人抱腰產母亦不可

繫抱則兒不能轉身故不可

此學養子法可於平日令兒女子熟聞
虛亂用力兒身纔方轉動却被產母用力一遍使兒錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母用力未當之所致也凡產母用力須待兒

補正氣確是
良工
有用人參五
錢催生最妙

予順身臨逼門戶方始用力一送令兒下生此方是產母之用力
當也若未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如
揠苗助長無益而有害矣

三曰催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛極甚腰重穀
道挺逆已見是正產之候但兒却未生即可服藥以催之或有經
及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服
藥以助產之正氣令兒速得下生

四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以致兒子不能生下
此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處當
滿房著火常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常煖血得
熱則流散使兒易生

如見此誓
用凉水益元
催之

五曰執產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭疼而赤昏昏如醉乃至不知人事。

六曰橫產者兒先露手或先露臂此山產母未當用力而用之過也。兒身未順用力一逼遂至身梗不能生下。當令產母安然仰臥後令看生之人先推兒手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推上而正之。或以指攀其耳而正之。須是產母仰臥然後推兒直上徐徐正之。候其身正煎催生藥一盞吃了方可用力令兒下生。七曰倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉使直下先露其足。當令產母仰臥令看生之人推其足入去不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順。

母氣弱而倒
產者當服補
劑若用力早
者又當別論

五更三

八曰偏產者兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏在左腿或偏在右腿故頭雖露偏在二畔不能生下當令產母仰臥次令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送即便生下若是小兒頭後骨偏在穀道只露其額當令看生之人以綿衣炙溫裹手於穀道外邊輕輕推兒頭正便令產母用力送兒生也。

九曰礙產者兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生當令產母仰臥令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒生下

十曰坐產者兒將欲生其母疲倦久坐椅褥拽其生路急於高處

繫一手申令產母以手攀之。輕輕屈足坐身。令兒生下。非坐在物上也。

十一日盤腸產者。臨產母腸先出。然後兒生。趙都運恭人每產則大腸先出。然後產子。產後其腸不收。甚以為苦。醫不能療。偶在建昌得坐婆一法。而收之。其法以醋半盞。新汲水七分調停。喚產母面每喚一縮三喚盡。收此良法也。

收腸法妙絕

產難治驗

不乳不產也

良藥是迷藥其根惡毒考

之本草並無

催生語。然是

毒惡亦或感

其毒氣而胎

下也

淳于意治菑州王美人懷子而不乳。召于意往。飲以黃蘗藥一撮。以酒飲之。旋乳。意復診其脈。而脈躁躁者有餘病。即飲以消石一劑。出血。血如豆。比五六枚。滑伯仁治一婦難產。七日而不乳。且食甚少。伯仁視之以涼粥二

其煩也又涼
則性降
本草楓葉亦
能催生今利
婦亦每用之
臨月洗浴第
不知胃氣不
足者亦可用
否耳
法術神奇罕
聞見耳

孟搗楓葉煎湯調啖之旋乳或詰其理滑曰此婦食甚少未有無
穀氣而生者天楓葉先生先落後生後落故以作湯飲也

龐安常治一婦產七日而子不下百治不効龐視之令其家人以
湯溫其腰腹自為上下拊摩孕者覺腸胃微痛呻吟間生一里其
家驚喜而不知所以龐曰兒已出胞但一手誤執母腸不能脫非
符藥所能為吾隔腹捫兒手所在鍼其虎口痛即縮手所以遽生
無他術也取兒視之右手虎口鍼痕存焉

一婦累口產不下服催生藥不効龐曰此必坐草太早心下懷懼
氣結而不行井不順也素問曰恐則氣下蓋恐則精神怯怯則上
焦閉閉則氣逆逆則下焦脹氣乃不行矣以紫蘇飲一服便產及

治婦人子懸證紫蘇飲見
胎前脹滿

芣苢即車前
或用草亦可
性最溫利故
君之

凍產治驗注
奇而正妙妙

吳菱山治一婦產難三日不下服破血行經之藥俱罔效吳因製
一方以車前子爲君冬葵子爲臣白芷枳殼爲佐使已服牛產衆
醫異之吳曰本草謂催生以此爲君毛詩採芣苢以防產難是也
劉復真遇府判女產不利已歛劉取紅花濃煎扶女子臂上以綿
帛蘸湯燻之連以澆帛上以器盛水又煖又淋久而甦醒遂生男
子蓋遇嚴冬血冷凝滯不行溫卽產見亦神矣

一醫宿客店值店婦產數日下下下體已冷無藥甚窘以椒橙菜
葉等煎湯可下手則和臍腹產四處皆淋洗之氣溫血行遂產

論交骨不開

薛氏曰交骨不開產門不閉皆出元氣素弱胎前失於調攝以致
血氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用加味芎歸湯補中

益氣湯產門不開氣血虛也用十全大補湯

地官李孟卿娶三十五歲女爲繼室。妊娠慮其產難。索加味芎歸湯四帖備用。至期果產門不開。止服一帖。頓然分娩。

上舍費懷德之室。產門不開。兩日未生。服前藥一劑。卽時而產。主舍傳此方用之者。無有不驗。

一婦人分娩最易。至四十妊娠。下血甚多。產門不開。與前湯一劑。又以無憂散。飭許煎熟。時時飲之。以助其血而產。

論胎死腹中

隼絕云。產難子死腹中者。多因驚動太早。或觸犯禁忌。致令產難。胞漿已破。無血養胎。枯涸而死。故也。須驗產母舌若青黑。其胎死矣。當下之。

其首用坎擊
之藥而無益
者以產母之
本氣竭而神
不使也宜補
之
愚意虛劇者
朴硝同補劑
下之何如

大法寒者熱以行之熱者涼以行之燥者滑以潤之危急者重藥下之。

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢余意其胎必死令視其舌果青黑與朴硝半兩許服之隨下利水而愈。

一婦胎死服朴硝而下穢水肢體倦怠氣息奄奄用四君為主佐以四物薑桂調補而愈。

○臨產脈法 附驗看生死法

脈經云懷妊六七月脈是太牢強弦緊者生沉細者死○脈勻細易產大浮緩氣散難產。

脈訣云欲產之婦脈離經沉細而滑也同名夜覺痛應分誕來朝日午定知生○身重體熱寒又頻舌下之脈黑復青反舌上冷

子當死腹中須遺母歸冥面赤舌青細尋看母活子死定應難展口俱青沫又出母子俱死總教攘面青舌赤沫出頻母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛陳

臨月束胎方

束胎丸 胎瘦易生服至產則已

白朮

枳殼去穢麤炒
各等分

燒飯用荷葉煎湯更妙

右為末燒飯丸如桐子大八月一日食前服三五丸溫水下送生散一孕至八九個月內服十數帖甚好易產

大腹皮三錢

人參

陳皮

紫蘇莖葉各五分

歸身尾

白朮各一錢

白芍藥各一錢

甘草各二錢

右切作一服八青葱五葉黃楊腦七個即黃楊樹葉稍見食少胎瘦者不須用水

加法俱妙甚

即東胎丸變法也若氣迎不足者當再酌之

煎服○或加枳殼砂仁○春加川芎○夏加黃芩○秋加澤瀉

○冬加砂仁○氣虛倍參朮○氣寔加香附陳皮○血虛加當

歸地黃○形寔倍紫蘇○性急多怒加黃連柴胡○熱甚加黃

芩○濕痰加滑石半夏○食積加山楂○食後易飢倍黃楊腦

○腹痛加水香官桂

又方一第九個月服

酒芩

酒炒一兩虛弱人不宜涼藥者減半

白朮一兩

枳殼

麸炒

滑石

各七錢半臨月十日前用小便多者減此一味

右為末粥丸桐子大每服五十丸空心熱湯下○氣寔人宜服

多則恐損元氣

滑胎枳殼散●姙孕七八個月常宜服滑胎易產湖陽公主每產