

6803

女科正宗

三

女科正宗卷三

廬江何 濤松菴

纂著

京兆浦天球鳴虞

怔忡

孕婦心神不寧。恍惚驚悸。氣急脉亂者。屬血虛有火。或痰鬱。宜大聖散。血少心神不寧者。四物加茯神。遠志。棗仁。柏子仁。或定志丸。加天花粉。貝母。瓜蒌。鬱金。以去痰鬱。若火盛者。安神丸。益榮湯。

大聖散 治孕婦因驚而致怔忡者。

川芎

一兩

棗仁

炒極熟  
一兩

黃芪

蜜炙  
一兩

當歸

一兩

人參

一兩

甘草

炙一兩

茯神

一兩

麥門冬

去心  
一兩

右爲末每服七錢。水煎空心服。

定志丸

治妊婦心虛恍惚健忘。

遠志

去心  
一兩

人參

一兩

茯神

三兩

棗仁

炒三兩

右蜜丸如桐子大。辰砂爲衣。米飲下五十丸。

安神丸

抑火安神。妊娠患怔忡必用此丸。  
方見子煩門

益榮湯

治妊娠驚悸怔忡。

當歸

一錢  
二分

黃芪

蜜炙  
一錢

遠志

去心

棗仁

炒熟各  
一錢

茯神一錢

木香六分

人參一錢

甘草三分

紫石英

八分

栝子仁一錢 白芍藥一錢

右加燈心煎服

轉胞

孕婦六箇月已後。覺胎墮在一邊。小水不通者。名曰轉胞。由於小腸有熱。傳於胞而不通。若胞不自轉。爲胎所壓。轉在一邊。胞係纏戾。則小便不通。若舉其胎居於中正。胞係自疎。水道自利。若右手三部微弱無力。或氣口虛大。倦怠食少者。屬氣虛。宜補中益氣湯服後。探吐以

提其氣。若左手三部或瀉而數。夜熱心煩。或大便秘者。屬血虛。宜四物加黃芩。知柏調益元散。若肥盛婦人。右手三部沉滑兼惡心者。屬痰滯。宜二陳加青皮。升柴煎服探吐。再用參耆大補。以安胎理氣為主。卽探吐不過。升舉之不宜大甚。亦視其人形症變通之耳。

丹溪參朮散 治轉胞小水不利。

四物湯

方見前

人參 白朮

陳皮

各一錢

甘草

三分

右薑水煎服。原方雖有半夏。亦不必用。

治轉胞口乾心煩兩尺弦急有力者。

冬葵子

梔子

白朮

木通

條芩

各一錢五分

右水煎服。外以冬葵子滑石梔子爲末。田螺爲膏。或

葱白搗爛貼臍上卽通。

切不可用射。

八味丸

治妊娠轉胞煩熱不得溺。

方見前謂經條下

集驗方

治小便利飲食如故。

當歸

貝母

去心炒

人參

各三兩

滑石

半兩

茯苓

二兩

右爲末蜜丸如桐子空心米飲下三十丸。

榆皮散

治小便不通。臍下急。心中煩悶。

榆白皮

葵子

研各二錢

蔥白

七莖

黃芩

一錢五分

右水煎服。

一方用滑石末水調和臍上。

又方用車前草汁調滑石末塗臍上周圍四寸熱易之。  
一方用四物二陳湯空心服後探吐使升舉其胎小便  
自通若專用滑利之藥恐傷胎氣。

附方

補中益氣湯

方見前調經條下

益元散

方見前產後瀉痢條下

二陳湯

方見前痰多閉條下

胎前霍亂

夫飲食過度觸冒風冷。陰陽不和。清濁相干。名曰霍亂。或有先吐腹痛而利者。是熱邪先發於上也。或有先腹痛而利者是邪氣挾於下也。若吐利並發。心痛腹疼。有暑氣者。吐利冷飲。有風邪者。身熱頭疼。風冷搏於筋。則手足轉筋。妊娠犯此。須防其傷胎。若感風寒者。藿香正氣散。白朮散。理中湯。最佳。若脾胃氣虛。停積飲食者。平胃散。或人參散。人參白朮散。如胃氣不順。煩燥不解者。丁香散。五苓散。參苓白朮散。香薷飲。俱可選用。

藿香正氣散

治霍亂吐利頭疼寒熱

藿香一錢五分 桔梗 大腹皮 紫蘇 茯苓 白

白芷 陳皮 半夏麴 白朮 厚朴各一錢

甘草五分 右水煎服

白朮散 治胎前霍亂吐利腹痛煩渴手足厥冷尚有暑氣

亦宜酌用後方皆如之

白朮 麥冬 人參各二錢 陳皮 乾薑

甘草各一錢

右水煎服

理中湯 治裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷胃中滿悶

作痛

人參 白朮 甘草炒 乾薑炒各三兩 丁香一兩

右為末每服三錢。水煎空心溫服。

人參散 治脾胃虛寒。霍亂吐利。心煩腹痛。飲食不入。

人參 厚朴薑製 橘紅各一錢

乾薑炮 當歸 甘草炙各五分

右棗水煎服

人參白朮散 治脾胃虛弱。吐利作渴不食。

人參 白朮 茯苓 甘草 木香

藿香各五分 乾葛一錢

右水煎服。

丁香散 治胎前直中陰寒霍亂吐利不止。

丁香五錢 白朮一兩 訶子皮 厚朴 良薑

附子各三錢 木瓜 陳皮各一兩

右為末每服三錢米飲調下。

五苓散 治霍亂吐利燥渴引飲。

白朮 赤茯苓 豬苓各一兩五錢 肉桂三錢 澤瀉二兩

右為末每服二錢熱湯調下。

參苓白朮散

治胃氣不順吐利止後燥渴不解。

人參

錢一

茯苓

錢一

白朮

錢一

甘草

分三

藿香

錢一

木香

分三

麥門冬

錢二

右水煎服。

香薷飲

治清濁相干霍亂吐利。

香薷

錢五

厚朴

黃連

澤瀉

茯苓

陳皮

各二

甘草

錢一

右水煎冷服。

平胃散

方見胎前傷食條下

瀉利

妊娠泄瀉。因傷胃虛冷而邪氣乘之。經云春傷於風。夏必泄瀉。若其色或青或白。水穀不化。腹痛腸鳴。謂之洞瀉。用理中湯。胃風湯。或六君子加柴胡。生薑。兼嘔逆腹痛者。錢氏益黃散主之。若水穀不化。嘔逆煩燥。脈虛大而數。此胃經虛熱。併于太腸所致。宜五苓散。四味阿膠丸。或三白散。正氣散主之。此泄瀉之大法也。若胎前痢疾。傷於血則痢赤。傷於氣則痢白。氣血俱傷則赤白相雜。總屬溼熱乘於大腸爲痢。如初起腹痛後重者。香連

化滯湯。熱盛下迫。裏急者。宜黃芩芍藥湯。日久元氣虛者。香連丸。如胎氣不安。急補脾胃而胎自安矣。如補中益氣八味丸之類。切忌大下。若不得已而欲下者。可與玄明粉一錢。甘草湯調下。

理中湯。治孕婦脾虛泄瀉。

人參

白朮

各一錢五分

甘草

一錢

乾薑

五分

右水煎服。

胃風湯

治症同前

人參

一錢五分

白朮

一錢五分

當歸

酒炒一錢

白茯苓

一錢

川芎 一錢五分

白芍藥 一錢五分  
肉桂 三分

右水煎服

錢氏益黃散 治脾虛寒。水來侮土。以致嘔吐不食。或腹痛泄瀉。

陳皮 一兩

青皮 訶子肉

甘草 各二分  
丁香 五分

右爲末。每服四錢。水煎服。

四味阿膠丸 治胎前下痢。水穀不化。心胸煩燥。脉虛大而數。此胃經虛熱所致。

黃連 二兩

赤茯苓 二兩

芍藥 炒三分

阿膠 一兩

右爲末醋丸。空心陳米湯下三十丸。

三白散 益氣健脾調胃和丸。

香薷白朮

白芍藥

白茯苓 各三錢

右水煎服。

藿香正氣散 治內停飲食外感風寒腹痛泄瀉。或作

寒熱。方見胎前。霍亂條下。

香連化滯湯 治孕婦痢積不行。裏急後重。

陳皮 一錢五分

青皮

厚朴

枳實

黃芩

黃連

當歸

白芍藥

滑石

各一錢 甘草 三分

檳榔 八分  
木香 五分

右水煎服。

黃芩芍藥湯 治妊娠痢疾。

白芍 一錢  
當歸  
黃芩  
黃連 各一錢 五分

肉桂 四分  
檳榔 八分  
甘草 四分  
云明粉 六分

右水煎服。

香連丸 治症同前。

黃連 一斤吳茱萸炒  
去茱萸不用  
木香 四兩不見火

右爲末醋爲丸每服三錢。