

武昌醫館叢書

三二

仲景傷寒補亡論目錄

卷第一

傷寒名例十問

敘論五問

治法大要九問

脈法刺法六問

仲景元化五問

卷第二

仲景辨脈法三十八條

卷第三

仲景平脈法四十五條

卷第四

六經統論二十二問

太陽經證治上九十五條

卷第五

太陽經證治下九十一條

卷第六

陽明經證治八十七條

少陽經證治十一條

卷第七

太陰經證治十條

少陰經證治四十七條

厥陰經證治六十三條

卷第八

不可發汗四十條

可發汗五十八條

卷第九

汗後四十四條

不可吐五條

可吐十條

卷第十

不可下四十七條

可下四十八條

卷第十一

發汗吐下後七十三條

卷第十二

病可溫十三條

病不可灸七條

病可灸八條

病不可刺八條

病可刺二十九條

病不可水十條

病可水八條

病不可火十一條

病可火二條

火邪三條

卷第十三

兩感證五條

陰陽交十一條

三陽合病十五條

結胸二十二條

心下痞二十五條

卷第十四

陽毒五條

陰毒七條

發斑十三條

發黃三十條

卷第十五

瘀血圍血便血證十一條

衄血吐血證十條

傷寒狐惑匿病十條

傷寒百合病十四條
傷寒勞復三十二條

傷寒陰陽易病六條

卷第十六

缺

卷第十七

痙溼暍敘論一條
痙瘓證二十六條

溼病十八條
中暍證六條

霍亂證二十六條
虛煩證七條

卷第十八

傷寒溫疫論一條

溫病論六條

風溫溫毒論四條

傷寒相似證論十四條

卷第十九

婦人傷寒證十八條

妊娠傷寒證三十三條

小兒傷寒證十九條

小兒瘡疹上四十七條

卷第二十

小兒瘡疹下十八條

斑瘡癰疹辨一條

仲景傷寒補亡論卷第十

河南郭雍讓次

不可下四十七條 可下四十八條

不可下四十七條

仲景曰脈濡而弱弱反在關

龐云關下三分也

濡反在巔

關上

三分也

微反在上

寸脈也

濇反在下

尺部也

微則陽氣不足

濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血厥而且寒陽微不可下下之則心下痞鞭龐氏以氣血俱不足用小建中湯常氏云下後心下痞鞭用增

損理中丸

又曰動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也龐氏以咽燥鼻乾宜竹葉湯

又曰動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱臥則欲蹠龐常皆云先服乾薑甘草湯後服小建中湯

又曰動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自瀉欲得水自灌常氏云宜小建中湯

又曰動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食

則下清穀心下痞也龐氏云心下痞宜半夏瀉心湯
又曰咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下
臥則欲蹠身急痛下利日數十行常氏云咽中閉塞
可烏扇煎下利宜四逆散

又曰諸外實者不可下下之則發微熱亡脈厥者當
臍握熱雍曰宜服去白朮理中湯以朮利腰臍閒血
故也

又曰諸虛者不可下下之則大渴求一作引水者易愈
惡水者劇雍曰宜小建中湯

又曰脈濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦爲虛虛者不可下也微則爲欬欬則吐涎下之則欬止而利因不休利不休則胸中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘急喘息爲難頸背相引臂則不仁極寒反汗出身冷若冰眼睛不慧語言不休而穀氣多入此名除中一云消中口雖欲言舌不得前雍曰此不治之證故諸家無治法龐氏云諸脈濡弱微虛細相搏俱不可下

又曰脈濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上數反在下浮爲陽虛數爲亡血浮爲虛數爲熱浮爲虛自汗出而惡寒數爲痛振寒而慄微弱在關胸下爲急喘汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相搏形如瘧狀醫反下之故令脈數發熱狂走見鬼心下爲痞小便淋瀝小腹甚鞭小便則尿血也常氏云可小柴胡湯鵲石散延胡索散

又曰脈濡而緊濡則衛氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩醫爲有大

熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛
竭卒起而頭眩客熱在皮膚悵怏不得眠不知胃氣
冷緊寒在關元技巧無所施汲水灌其身客熱應時
罷慄慄而振寒重被而覆之汗出而冒巔體惕而又
振小便爲微難寒氣因水發清穀不容間嘔變反腸
出顛倒不得安手足爲微逆身冷而內煩遲欲從後
救安可復追還常氏云可灸關元雍曰仍服通脈四
逆湯

又曰脈浮而大浮爲氣實大爲血虛血虛爲無陰孤

陽獨下陰部者小便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反更實津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠血薄肉消而成暴液暴液一作黑液醫復以毒藥攻其胃此爲重虛客陽去有期必下如污泥而死常氏云可小建中湯已經下者不治

又曰脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗而不可下也常氏云可桂枝麻黃各半湯雍曰仲景可汗證中只用麻黃湯

又曰趺陽脈遲而緩胃氣如經也趺陽脈浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所爲也榮衛內陷其數先微脈反但浮其人必大便鞭氣噫而除何以言之本以數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便鞭氣噫而除今脈反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脈當遲緩脈因前後度數如法病者則飢數脈不時則生惡瘡也常氏云可小柴胡湯惡瘡漏蘆湯

又曰脈數者久數不止止則邪結正氣不能復正氣

卻結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脈數者不可下
下之必煩利不止常氏云可柴胡桂枝湯

又曰少陰病脈浮不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈
弱濇者復不可下之雍曰宜建中湯

又曰脈浮大應發汗醫反下之此爲大逆雍曰誤下
宜四味理中丸誤下則中氣受傷故用是湯

又曰脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發
汗屬府者不令洩數洩數則大便鞭汗多則熱愈汗
少則便難脈遲尙未可攻常氏云可小柴胡湯雍曰