

古方神書注解

卷 15

急救考痧方

霍乱轉筋 附 仔膈頭 禁 布脚痧證



十藥神書註解序

此葉天士家藏祕書也前此流傳皆為寶本余歸田後始得原書重加訂註附於傷寒論金匱要略之後益以傷寒論金匱要略為萬古不易之準繩而此書則奇以取勝也然奇而不離於正故可取焉

閩長樂陳念祖識

姑蘇葛可久先生精通方術與丹溪朱彥修齊名所著十藥神書專治虛損雖編中僅列十方而用藥之次第逐一條陳其航陳修園謂其奇而不離於正誠哉是言也顧前此流傳皆為寶本修園解組後始得原書重加註解將刊附於傷寒論金匱要略之後而未果乙卯歲宣從舊書坊中得一鈔本於今三年矣遍詢方家俱無是書宣不敢私自祕藏因並作湯方俚歌亟謀付梓以廣其傳庶不負先生壽世寄人之意云爾

咸豐歲次疆圉大荒落季冬月後學林壽萱譯跋

程序

吾吳天士葉先生凡治吐血證皆祖葛可久十藥神書更參以人之情性病之淺深隨其應變無過不及治無不愈然亦治之於初病之時與夫病之未經深入者若至五臟遍傳雖虛偏不莫可如何矣家藏此書有年幾獲脉望故亟付梓然書中僅列十方世皆以方少忽之不知十方中錯綜變化有幾千百方故復探周氏之說使人粗曉業是者更察虛損二字分自上而下自下而上自不致弊以六味開半矣古吳瘦樵程永培識

葛氏自叙

夫人之生皆稟天地之氣而成形宜乎保養真元固守根本則一病不生西體輕健若曰不養真元不守根本病即生矣根本者氣血精液也子得先師之教萬病無如癆證之難蓋因人之壯年血氣充聚精液完足之際不能守養惟務酒色豈分飢飽日夜耽吟無有休息以致耗散精液則嘔血吐痰骨蒸煩熱腎虛精竭形羸煩紅面白口乾咽燥小便白濁遺精盜汗飲食難進氣力全無斯因大來全位重則半年而斃輕則一載而傾況為醫者不究其源不通其治或大寒大熱之藥妄投亂進不能取效殊不知大寒則愈虛其中大熱則愈竭其內所以世之醫者無察其

情子師用藥治勞如昇之射無不中的余以用藥次第開列於後用藥之法逐一條陳如嘔血咳嗽者先服十灰散
揭住如不住者須以花蕊石散止之大抵血熱則行血冷則凝見黑則止此定理也止血之後患者必疏解其體用
渴冬湯補之令其熟睡一覺不要驚動醒則病去六七矣次服保真湯止嗽寧肺太平丸潤肺扶腎消化丸下痰疏
氣保和湯分治血盛痰盛而盛熱風盛寒盛六事加味治之餘無加法又服藥法曰三日煎服供真湯三日後服
保和湯二藥相間服之為準每日仍濃煎薄荷湯灌漱喉中用太平丸徐徐噙下次噙一丸緩緩化下至入床時候
如此用之夜則肺竅開藥必流入肺竅此訣最而切要如痰壅却先用飴糖烊消化凡百丸吞下又依前嚼太平丸
令其仰卧而睡嗽必止矣如有餘嗽可煮潤肺膏服之復其根本完其真元全愈之後方合十珍丸服之此謂收功
起身藥也前藥如神之妙如神之靈雖含扁再世不過於此吁世之方脈用藥不過草木金石碌碌之常耳何以得
此通神訣要奇異之靈也余蒙師授此書其中治勞何止十萬人而未嘗傳與一人今此書既就汎失重次序一新
名曰十藥神書留遺子孫以廣其傳時至正乙酉一陽日可久書於姑蘇養道丹房

余自髫稚學醫道迄究方脈三十餘年遍歷江湖多學廣傳者不過言語文字形容之耳及至用藥治病皆不能
捷是以日夜苦心用志務在中病後遇至人同處三月斯人極明醫道精通方術用藥如發矢無不中的余曰必神
人也遂拜為師得授奇方一冊閱之或羣隊者或三四味者皆余目覩至人用致者也使子如久旱逢霖夜行得月
心中豁然自此回至吳中一用一捷無不刻驗信乎奇方可窮粹者也余以三餘暇日將至人所授奇方併日用決
效之法類成一帙名曰十藥神書蓋用效者輒記錄之令西湖大癡道人與余通家之好用禮求授故錄以奉養生
濟人之功用爾時至正戊子春正月三陽日可久再書於姑蘇春先堂

姑蘇萬可人編 閩東台林念祖修圖註

甲子十灰散 治嘔血吐血咯血嗽血先用此藥止之

大薑

小薑

荷葉

扁柏葉

茅根

苦根

山梔

大黃

牡丹皮

棲櫚皮分各等研末

右各燒灰存性研極細末用紙包碗蓋於地上一夕出火毒用時先將白鴟持汁或蘿蔔十磨

京墨半碗調服五錢食後服下如病勢輕用此立止如血出成升斗者用後藥

十灰大小薑大黃桔子莖根茜草根側柏葉同荷葉等棲櫚皮並牡丹膏

陳修園按前散自註云燒灰存性今藥肆中止知燒灰則色變為黑而不知存性二字大有深義蓋各藥有差
之性若燒之太過則成灰灰無用之物矣惟燒之初燃即速放於地上以碗覆之令滅其火俾余藥一經火燒色
雖變易而本來之真性俱存所以用之有效人以為放地出火氣猶淺焉者也伏余治證四十餘年習見時醫喜
用此藥效者固多而不效者亦復不少推原其故蓋因製不如法亦因輕藥不能當此重任必須深一步論治審
其脈洪而赤傷於醉惱怒者為大載血而上行證余製有惜紅丸日夜三四服但須以麻沸湯泡服不可煮服
為囁番其素能保養脈沉而細而赤淡白血來時外有寒冷之狀者為陽虛陰必走證余製有惜紅散加鮮竹茹
日夜服三劑其藥之配合散見於拙刻各種中茲因集醫不能備登

乙辛花蕊石散 五藏崩損湧噴血成升斗用此止之

花蕊石大煅存性研末

右用童便一鍾燉溫調末三錢甚者五錢食後服下男子用酒一半女人用醋一半與童

便和藥服使瘀血化為黃水服此以後藥補之

花蕊石大煅存性研末 右用童便一鍾燉溫調末三錢重五錢

舊註但瘦惟云孫周氏所註治吐血者號推葛可久而先生首以二方止血明明剖毫無顧忌細玩始知先生
意之所到理之精也人生於陽根於陰陰氣虧則陽自勝上氣為之喘促欬吐痰沫發熱面紅無不相因而致故

留得一分自家之血減得一分上升之大易為收恰何今日之醫動以引血歸經為談不過概用止血之味甚至有吐出亦美繼反為害遂令遷延時日陰虛陽旺煎不止至於不救果誰之咎執引經而緩時日更復元神吾恐有形之血真能使之速生而無偶之陽何法使之速降此先生所以急於止血之大旨也 陳修園按虛勞證金匱以桂枝加龍骨牡蠣湯從腎虛以立法建中湯從脾虛以立法黃耆建中湯從氣血兩虛以立法入味地黃丸天雄散溫其下元從脾腎氣血之總根虛以立法是以補虛為一大綱也以薯蕷丸治風氣百疾虛羸諸不足是以祛風為一大綱也以大黃䗪蟲丸治乾血成勞是以逐瘀為一大綱也三綱鼎足為此證不易之準繩今葛仙翁以花蕊石散繼於十灰散之後雖云止血實欲使瘀血化為黃水而不見血也然自余思之吐血既止而離經之血蓄而不行不可不用此散化之若血來勢如泉湧相續不絕竟用此散令其盡化為水是令一身之血俱歸焉有尚有生理乎讀書不可死於句下此其一也且三大綱因虛而成勞醫書恆有治法而因風而致者言之頗罕而因瘀血而致者除仲景金匱大黃䗪蟲丸仲景小品百勞丸外未有發明其旨且金匱以薯蕷丸與大黃䗪蟲並舉意以風氣不去則足以賊正氣而生長不榮乾血不去則足以留新血而滲灌不固怯證種種所由來也余治吐血諸藥不止者用金匱瀉心湯百試百效其效在生大黃之多以行瘀也 附錄仲景百勞丸方當歸炒乳香沒藥各一錢人參分數錢䗪蟲十四個去翅足水蛭十四個炒桃仁十四粒去皮尖大黃四錢蜜丸如梧桐子大都作一服可百丸五更用百勞水下取惡物為度服白粥十日百勞水者杓湯百遍即甘潤水也

丙子獨參湯 止血後此藥補之

大人參二兩
去蘆 右每服水一盞棗五枚煎一盞細呷之服後熟睡一覺後服諸藥除根

功建三才得令名陰陽血脫可回生人參二兩五枚棗服後方知氣力宏
舊註凡失血後不免精神怯弱神思散亂前方雖有止血之功而無補益之力故有形之陰不能即復而幾微之氣不當急固子賴使獨參湯不但脫血益氣亦且陽生陰長觀先生自註云熟睡一覺使神安氣和則煩除而自靜蓋人之精神由靜而生亦由靜而復也奈何今之醫者遇吐血家乃視參如毒藥 陳修園按神農本草經云

人無氣味甘微寒無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明日開心益智久服輕身延年經文曰此三十
七字其提綱云主補五藏以五藏屬陰也精神不安驚悸不止目不明心智不足皆陰虛為元陽所擾也令五藏
得甘寒之助則安之定之止之明之開之益之之效矣曰邪氣者非指外邪而言乃陰虛而壯火食氣大即邪氣
也今五藏得甘寒之助則邪氣除矣細味經文無一字言及溫補回陽何後人信從宋元鼎之說而反疑開天
門道之聖經邪此證用至一而以失血之後藏陰大虛陰虛則不能維陽陽亦隨脫故用二兩任專力大可以項
刺奏功但人參雖有補虛之功而致嗽者忌之乘此大血甫止之際致嗽未作急急飲之若得熟睡一夜則生布
然莫之能禦即所失成升成斗週時補之而有餘矣若睡未足而驚醒之則血亦停而不生矣若血止一二三日
而始服之不徒無益而有害周氏舊註亦起但以人參為補氣之品未免固於俗見然人參補陰與地黃龜板之
一於補陰者不同按其字義參者參也其功與天地人並立為三且能入肺腎為一身之薑籥謂益氣却不近道
程山齡謂貧者以歸脾湯代之然不如取當歸補血湯二劑入童便二茶碗隔湯炖二柱香取汁頓服之

丁子保和湯

久嗽肺痿成瘻

知母 貝母

天門冬

欵冬花各三錢

天花粉

薏苡仁

杏仁

五味子各二錢

甘草

兜鈴

紫苑

百合

桔梗

阿膠

當歸

地黃

紫蘇

薄荷

百部

半錢

右以水二盞生薑三片煎一盞入飴糖一匙調服日三食後各進

一鍾與保真湯相間服 血盛加炒蒲黃茜根蕷節大薊小茴子花當歸 痰盛加南星半夏陳皮茯苓枳實枳
殼 嘴盛加桑白皮陳皮蘿蔔子草薢子蘇子 热甚加山梔子黃連黃芩黃柏連翹大黃欵冬花 風甚加荆
芥防風菊花細辛香附子旋覆花 寒甚加人參桂枝蠟片芍藥

知貝款天冬各三二錢杏意味天花五分二百阿歸地紫苑兜蘇薄桔甘

加減歌

歸茅大小蘿蒲黃芻節茜根血盛當陳半入茯苓枳實枳殼將喘加桑白皮皮等蘿蔓草蘇三子詳熱甚

芩連柏欽連翹合併大黃杏風加香附荆防細旋復菊花六件良寒甚加參兼北桂芍加蠟片不須言陳修園按此方治久嗽不過類集順氣化痰清火解鬱之品以多為貴絕無把柄抑又思之先生有道之士也其方又得之神人何以庸陋至此且蘇葉桔梗薄荷辛散非久嗽所宜百部欽久苦溫非血後所宜兜鈴花粉杏仁亦為中虛所忌知母貝母天門冬地黃阿膠百合性寒而滯力亦輕微其去市肆中之間證立方接鈴草之儼統配合以零責者幾希耶然此方不見於大家之書如明季蟲太醫各刻及萬病回春壽世保元等本亦載之但方名間有不同藥品偶有增減村醫用之往往見效余向以病人壽算未終總不歸功於此方亦隨見而隨忘之耳今得此書始知禮失而求諸野沾體塗足中大有人馬轉悔從前之肉眼也究竟於此方未得其旨大抵奇之弗去而揭之一方不去而複之如韓信將兵多多益善且其輕重大有法度加生薑之辛溫以潤肺飴糖之甘培土以生金卓然大家可知仙方非凡人所可窺測也但喘盛加蘿蔔子與地黃相反臨時自當去取

戊宇保真湯

治虛弱骨蒸體虛

當歸	生地黃	白朮	黃耆	人參各三	赤茯苓	陳皮	赤芍藥	甘草
白茯苓	厚朴略分一錢	天冬	來冬	白芍藥	知母	黃柏	五味子	柴胡
地骨皮	熟地黃各一錢	每服水二錢	薑三片	東子五枚煎	與保和湯同服	每日一服	驚悸加茯神遠志	
柏子仁酸棗仁	淋濁加草薢烏藥	猪苓澤瀉	便澀加石韋	通木通亦令	遺精加龍骨牡蠣蓮心蓮鬚			
燥熱加石膏	石斛甲青蒿	益汗加浮小麥	牡蠣黃耆麻黃根					
參耆歸地木三錢	赤白茯苓	朴草	桑杏	陳皮錢半等味	柴白芍二錢	編骨皮熟地	和知柏各一錢	加薑東煎
加減歌								

骨蒸又月忤和驚東遠伏神柏子仁淋濁草薢澤入遺精龍牡蓮鬚心小便澀要加石韋通木通亦令燥加青蒿石滑蜜麻根益汗蠅浮者舊註一名保和者因失血之後氣血未調率難把握然調氣者以氣為主調氣者實肺為司故大旨以瀉肺中之

伏熱益下焦之化源此其治也若和而失其所以為和則保亦失其所以為保矣至保真則氣血之味俱等大旨以甘溫為主甘涼佐之而苦寒又佐之未嘗禁用苦寒也而與今日之用寒涼者異矣曰保真者大補其正兼瀉其邪使生機活潑油油然而不已也兩方加法大備然非盡用亦姑列之以俟去取耳學者須知陳修園按此方即十全大補湯去川芎肉桂加赤芍赤芍生地天冬麥冬五味子柴胡厚朴陳皮地骨皮知母黃柏是也氣血雙補之中加柴胡地骨皮疏肝邪肝大即雷火也知母黃柏以降腎火腎火即龍火也又合麥冬五味子為生脈散俾水火一氣又合天門冬為三十湯以伍育一身最妙是陳皮厚朴甘草入胃竇中行滯導諸藥各盡其運動之力而煩和共濟且藥品輕重得宜大有法度但引藥以花之赤白別之其根則不可辨也藥肆中另有一草葉小根大葉與藥無異余家山中親見採藥人握取盈囊問之則曰藥鋪所備赤芍皆此種也始信本草崇原註云赤芍不知何草之根今外科小兒科習用害人之說非虛語也方中當去之

己卯太平丸治久嗽肺痿肺癰

天門冬	麥門冬	知母	貝母	款冬花	杏仁	當歸	熟地
生地	黃連	阿膠珠	蒲黃	京墨	桔梗	薄荷	一
白蜜四兩	麝香少許	右為細末和勻用銀石器先下白蜜燉熟後下諸藥末攪勻再上火入麝香略熬三二沸丸如彈子大每日三食後細嚼一丸薄荷煎湯緩緩化下臨卧時如痰盛或先用船榔拌消化丸吞下却噙嚼此丸仰卧使藥流入肺竅則肺清潤其嗽退除服七日病痊丸放喉只服此藥立愈					

二兩三冬二母如歸連二地黃阿膠各需兩五錢甘草兩京墨薄荷桔梗

醫註太平丸非正方也先生意計周密恐人正氣漸復之後尚留一分未盡必有一分未妥特於宴息之時噙服此尤使人於靜中不知其所以然而藥力無不到此少許麝香之所以為神妙也陳修園按方中潤燥化痰養液少佐薄荷以利氣無甚深義惟難以黃連之苦寒麝香之走竄不幾令人駭而吐舌乎而不知令人駭處正是神仙妙用處補農本草經云黃連氣味苦寒苦為火之本味以其味之苦而補之而寒能勝火即以其氣之寒而

不如籌一生路而為破釜沉舟之計倘有餘望每見痰嗽不絕肌骨消瘦聲啞骨蒸五更更熱而汗出早飯後皮膚雖熱而脊背畏寒手指微冷此廢損既成十不救一之證醫有議論互異而一種迂儒謂肺虛液少但云保肺猶其淺也必以六君子湯歸脾湯補中益氣湯之類常服土旺自可生金毋區區於保肺因前病全受火耗但知清心治其末也必以六味地黃湯瓊玉膏三才湯郁氣丸八仙長壽丸之類常服脾水足自能濟火毋汲汲以清心此為東垣立齋之法人人信服而不疑且有更進一步自誇為得張良安之心法謂真水為元陰真火為元陽肾根於命門元陰之水中生艮土而上潤肺金元陽之火中生坤土而上通心火陰陽互根而不相離六味湯丸左歸丸八味湯丸右歸丸皆為極品自此說一行而虛勞之證十患九死曷不思脾為諸藏之母當無病時常服補藥尚難進其飲食長其肌肉至虛損病篤之時將何法補其不足且能令其有餘以生金耶腎為壽命之根當無病之時服補藥尚難充其精氣強其腰膝至虛損病篤之時又何法補其不足且能令其有餘以濟火邪鄉原德之賦吾謂庸醫之陰毒更甚妄醫之陽毒也近日更有襲取葉天士一派遇有感冒即用前胡乾葛杏仁桑葉桔梗紫蘇防風茯苓橘紅蘇法夏神龜殺半麥芽山楂炭甘草為主方頭痛加川芎白芷身痛加羌活秦光葛根加紫苑百部口渴加麥冬花粉小便短少加滑石木通澤瀉猪苓腹脹加厚朴枳實蘿蔔子砂仁蔻皮膚作痒加蟬退白蒺藜連翹喉痛加元參軒干牛蒡子貝母寒熱往來加柴胡酒芩腰膝痛加牛膝杜仲柳腫加木瓜防已病從拂鬱則加黑鬱金香附發熱不退加白薇地骨青蒿耳鼻數日未愈曰當略調其氣血加當歸酒芍何首烏乾地黃丹參沙參等出入互用至於久病虛人則以達東海參蟲高鯖魚殺半烏桑草等為主其參木者苓二地桂附具萸炮薑等隨證加入而金銀花炭枸杞炭菊花炭白木炭地黃炭鮮桑枝金銀花藤泡淡乾薑生薑渣泡淡附子泡淡吳茱萸秋稻根鬚鹽血柴胡五色石英父丁子整個生扁豆黑楂豆皮綠豆皮西瓜翠皮之類曰我是葉天士一派與恆法不同而不知葉天士居江蘇該處人腠理較薄外邪易入而亦易出不用仲景正法故於傷寒論一部未得師授議論甚覺偏執其於雜症胸中頓有書卷加以絕世聰明驗證甚多所以名謙一時而虛勞一證專祖十藥神書不必全用其方神而明之信手拈來頗頗是道何若輩僅於醫證指南中食

其糟粕而論託之也耶

平牛潤肺膏 久嗽肺燥肺痿

羊肺一具

杏仁淨研

柿霜

真酥

真粉酪一

白蜜二兩

右先將羊肺洗淨

次將五味入水燙黏灌入肺中白水煮熟如常服食前七藥相間服之亦佳
真粉真酥正柿霜杏仁淨研兩平量蜜加二兩調黏用灌入肺中水煮嘗

舊註血去則燥燥則火旺肺必枯欲從腎源滋水而不先滋水之母有是理乎然肺為多氣少血之藏故一切血藥概不砍用以羊肺為主諸味之潤者佐之人所易能也若以真粉之甘寒不獨涼金且以培土人所未知也

陳修園按方中真粉即傷寒論猪膚湯之白粉也本文未明為何粉一說即天花粉主滋潤肺金取金水相生之義一說即粳米粉以少陰之水大交會於陽明中土交水火而止煩躁而且藉土氣以生金二說俱有深義余每用則從後說令讀先生此方又聞周氏所註真白粉即天花粉無疑嘉慶丁巳歲余應典泉觀察阿公泉州郡伯張公聘主清源書院講席日者用天花粉一味藥鋪送白粉一包其色莹白迥出諸藥之上余傳問之答曰此物最賤而製造却難惟冬月葉落其氣盡歸於根掘取以法取汁和水淘洗澄之曬乾收貯纔有如此寶色若無此色恐偽物弗致不如止用天花粉片之較妥也今先生加一真字何等鄭重其辭推而論之金匱於蟲病製有甘草粉蜜湯以殺蟲若虛勞久嗽為瘵蟲蚀肺鉛粉性毒能殺三蟲令雜於蜂蜜柿霜羊肺之中誘蟲食之旋而甘味盡毒性發而蟲患除矣此非正解亦可備之以啟悟機

士子曰風膏 一切久怯極虛備死嗽吐痰咯血發熱

黑嘴白鴨隻大京東半參芩半平胃散半陳煮酒一盞 右將鴨縛定脚量患人飲酒多少隨量以酒燙溫將鴨頭剖開置入酒燙勿飲之直入肺經潤補其肺却將鴨乾去其毛於脇邊開一孔取去腸雜拭乾次將裏子去核每個中寶納參苓平胃丸末填滿鴨肚中用麻糬定以沙紙一個置鴨在內四圍用火慢煨將陳煮酒作三次添入煮乾為度然後食裏子陰乾隨意用參湯化下後服補髓丹則補髓生精和血順氣

參參平胃散一升京東二升酒一瓶黑嘴白毛肥鴨一照方如法製來斟

陳修園按怯而日久虛極而憊而且欬嗽不已則肺日因嗽而動擾矣吐痰不已則肺因痰而壅滯矣咯血發熱壯火食氣不特肌肉消瘦而且氣衰言微矣此為極證反非無情之草木所能治故用黑嘴白鴨一隻為君益以毛白者味較清而入肺嘴黑者骨亦黑而入腎取金水相生之義亦資異類有情之物以補之也最妙入京東二升取其甘溫以補胃平胃散一升取其消導以轉胃胃為五藏六府之本胃安則藏府俱安與保真湯佐以厚朴同義葉天士於此書亦參透其旨但其方隨證加入以致學徒刊刻草率用厚朴者於虛勞門止收一方意者中人以下不可以語上重其道而不輕傳歟修園則異於是

癸字補髓丹

久勞虛傷隨乾精竭血枯氣少服煎藥愈後服此藥

猪脊齊

一條 羊脊齊一條

圓魚一枚

烏雞一隻

四味製淨去骨存肉用酒一大碗於沙瓶內煮熟

擂細再用後藥

大山藥五條 蓮肉十斤

京東一枚一百

霜柿十個

四味修製淨用井花水一大瓶于沙盒內煮熟細

擂過前熟肉一處用慢火熬之却下

明膠四兩

黃蠟三兩

右二味逐漸下與前八味和一處研成膏子和平胃散末四君子湯末并知母黃

柏朮各一兩共一十兩搜和成劑如十分堅硬入白蜜同熬取起放青石上用水槌打如泥丸如梧桐子大每服一百丸不拘時候服湯下

猪羊脊齊雞圍魚煮擂且當去骨需霜柿十枚京東百建蓮八兩五條薯熟和前味熬文火黃蠟明膠漸入諸知柏四君子平胃散各加一兩製丸如

陳修園按久勞虛傷髓乾精竭等證服前藥愈後服此藥二十字是為虛勞既愈證籌一善後之計寶為虛勞窮極證竟一回春之路也虛勞至六極之候凡和解溫涼補潤之藥無不試初服聞或少效父之無不增劇名醫俱求手無策然藥以治病食以養人二語參透大有妙義蓋得病日久日在藥中未奏之腸改充雜草腸胃之所

惡者藥也若更以藥投之是重困之而不能堪矣先生用山藥蓮肉京果霜柿取日食之果菜以悅脾胃之性情用猪髓羊髓團魚烏雞牛膝日用之肉食以充脾胃之虛餒卽扁鵲所謂損其飲食內經所謂精不足者補之以味是也惟方中黃蠟一味俗醫見之無不驚駭本草備要謂服此物者於腸胃令人漏利不止而不知此物性潤宣能作瀉威喜丸用此鎔化為丸王晉二註云黃蠟性味緩澑續絕補髓之功專調斂喪之陽分理濶亂之精故為元陽虛微遺濁帶下之神品俗傳本草之害人往往如此況此丹儘屬骨肉有情之品溫養吾身之氣血與無情之草木懸殊葉天士用人乳粉秋石霜血餘灰之類引人身之膏脂以為繼續之計亦由此方悟出若紫河車云微有毒服之無不發熱減食豈非惑於以人補人之說心害理道以首戰也耶又按明昧是取嫩肥黃牛皮以河水製造為之或用牛肉煎汁去滓再熬成膏每斤入薑製半夏末二兩名為霞天膏治勞傷久嗽乾隆丁未余肄業龍溪書院孟叔菴師言其督學四川時患喉數月同吏制餽因素不食牛拜受而不敢嘗署中閱卷張友惠痰證二十餘載毒而嘗之脾疾成塊吐出甚多半月全愈身體立見壯健附志之以廣其傳 舊註人若色慾過度傷損精血必生陰虛火動之病睡中盜汗午夜發執冷呴放散倦怠無力飲食少進甚則痰涎泄血咯吐出血或欬血吐血衄血身熱脈沉數肌肉消瘦此名廢瘵最難治輕者用藥數十服重者期以歲年然必須病人惜命堅心定主絕房室息忘想戒惱勿節飲食以自培其根此謂內外交治可復全功 周氏總註予讀此十方俱出人意表其間次第緩急可為十百世法即不必十方並用要無能出其範圍者矣一方之中自得肯綮卽不必全用其藥亦可細推其理矣乃今日之治血證者輒用六味地黃增減其收功皆由醫貴入手而未嘗從神書體會者也彼之腎水衰則火炎為患壯水之主可鎮陽光孰知人之患此病者陰虛固多而他因者亦復不少假如從勞役飢飽而得者其傷在足太陰矣從憂患而得者其傷在手少陰矣從嗜飲而得者其傷在手太陰矣從憤怒而得者其傷又在足厥陰矣此足致吐血欬血咯血等證豈一壯水可以勝其任乎總之人身之血附氣而行者也一藏陽則氣必不調而血遂溢於外故逆則上出墜則下行滯則阻痛寒則凝熱則散此自然之勢也後之君子於診視之際聞問之餘斟酌而得其情否乎果能於此著眼覘其病之所傷在何處

脈之所傷在何部時之所值在何季患過半矣曾治一啞之人平日極勞每咯紫黑色俱成小塊者然必是飽食則多少食則少不食或少或無余以葷汁董便製大黃治之二服而安後以補中益氣湯加血藥而愈知者以為怪妄予謂極平常蓋實從神晝究心而置醫貫為談料者也

附平胃散方

厚朴姜汁
炒 陳皮五分各 苍术去皮米泔水浸炒八兩 炙甘草三兩 本方加入參茯苓各二兩即名參苓平胃散


四君子湯

人參

白朮

茯苓兩三

炙甘草一兩



經驗百病

内外

附急救異痧
奇方

