

第五四二冊

博物彙編

草木典

鬼臼部 鬼針部 王孫部 郎罷部
部 佛甲部 仙人部 鎮陽部
拳參部
附子部 側子部
天雄部 烏頭部
益母部 貝母部 知母部
女萎部 女青部 女苑部 蚤休
部 防己部
商陸部 決明部 連翹部 對廬
部
當歸部 百部部 三七部 列當
部 曲節部 由跋部 坐墊部
格注部 離禹部

(卷)

二三

二三

二五

二六

二七

二八

貫衆部 遠志部 漏蘆部 續斷

(卷)

二三

獨活部 及己部 飛廉部 吉利

部 都管部 橫目部 穀精部

夫王部 寇脫部

鉤吻部

景天部 雲實部 雷丸部 防風

部 積雪部 恒春部 半夏部

夏枯部

地黃部 地榆部

地膚部 地錦部 地筋部 地衣

部 山柰部 常山部

石松部 石韋部 石莖部 石斛

部 石帆部 石蕊部 絡石部

崖櫻部 秦朮部

二五

二六

二七

二八

二九

三〇

古今圖書集成

中華書局影印

Z 225

3

欽定古今圖書集成博物彙編草木典

第一百二十六卷目錄

鬼臼部彙考

鬼臼圖

鄭樵通志昆蟲草木略

本草綱目鬼臼

鬼臼部藝文一

羞寒花贊

鬼臼部藝文二詩

瓊芝軒

朱黃庭堅

鬼臼部雜錄

鬼針部彙考

本草綱目鬼針草

王孫部彙考

王孫圖

本草綱目王孫

王孫部紀事

王孫部雜錄

郎罷部彙考

郎罷圖

爾雅釋草

本草綱目狼把草

佛甲部彙考

佛甲草圖

本草綱目佛甲草

仙人部彙考

仙人草圖

本草綱目仙人草

仙人部藝文

仙人草贊

鎖陽部彙考

鎖陽圖

本草綱目鎖陽

鎖陽部雜錄

拳參部彙考

拳參圖

本草綱目拳參

朱謝惠連

草木典第一百二十六卷

鬼臼部彙考

釋名

鬼臼本經

天白訓錄

解毒別錄

馬目毒公本經

羞天花訓目

瓊田草訓目

九日本經

鬼葉訓目

爵犀本經

害母草圖經

水律草訓目

獨脚蓮土音本草

獨荷草土音本草

早荷訓目

唐婆鏡蘇頌詩集

羞寒花蘇頌詩集



鬼臼圖

鄭樵通志

昆蟲草木略

鬼臼曰雀犀曰馬目毒公曰九曰曰天白曰解毒葉如荷葉形似鳥掌年長一莖莖枯則根為一白服食家用之以九曰相連者為佳亦名八角盤以其葉然也

本草綱目

鬼臼釋名陶弘景曰鬼臼根如射干白而味甘九曰相連有毛

者良故名

李時珍曰此物有毒而曰如馬眼故名馬目毒公設蠱解毒故有犀名其葉如鏡如盤如荷而新苗生則舊苗死故有鏡盤荷運害母諸名蘇東坡詩集云瑞田草俗號唐婆鏡即本草鬼臼也歲生一白如黃精根而堅瘦可以辟穀宋祁劍南方物贊云羞天花蜀地處處有之依莖綴花蔽葉自隱俗名羞天予改爲羞寒花即本草鬼臼也贊云冒寒而茂莖修葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀別有羞花草與此不同即海芋也

集解

別錄曰鬼臼生九具山谷及冤句二月八月采根陶弘景曰鬼臼生山谷中八月采陰乾似射干木單又似鉤吻有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者大而味苦無叢毛力劣今馬目毒公狀如黃精根其白處似馬眼而柔潤今方家多用鬼臼而少用毒公不知此那復乖越如此蘇恭曰鬼臼生深山巖石之陰葉如蓖麻重樓輩生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯則爲一白假令生來二十年則有二十日豈惟九日耶根肉皮鬚並似射干今俗用多是射干而江南別送一物非真者今荊州當陽縣峽州遠安縣襄州荊山縣山中並貢之亦極難得

蘇頌曰今江寧府滁舒商齊杭裏峽州荆門軍亦有之並如蘇恭所說花生莖間赤色三月開後結實又一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如織旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花

紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未嘗見日一年生一莖既枯則爲一白及八九年則八九白矣然一年一白生而一白腐蓋陳新相易也故俗名害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之曰腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然日形淺薄與鬼臼大異鬼臼如八九箇南星側比相疊而色理正如射干用者當使人求苗采之市中不復有也

李時珍曰鬼臼根如天南星相疊之狀故市人通謂小者爲南星大者爲鬼臼殊爲謬誤按黃山谷集云唐婆鏡葉底開花俗名羞天花即鬼臼也歲生一白滿十二歲則可爲藥今方家乃以鬼燈檠爲鬼臼誤矣又鄭樵通志云鬼臼葉如小荷形如烏掌年長一莖莖枯則根爲一白亦名八角盤以其葉似之也據此二說則似是今人所謂獨腳蓮者也又名山荷葉獨荷草早荷葉八角鏡南方處處深山陰密處有之北方惟龍門山王屋山有一莖獨上莖生葉心而中空一莖七葉圓如初生小荷葉面青背紫採其葉作瓜李香開花在葉下亦有無花者其根全似蒼木紫河車丹爐家采根制三黃砂汞或云其葉八角者更靈或云其根與紫河車一樣但以白色者爲河車赤色者爲鬼臼恐亦不然而庚辛玉冊謂豨陽草早荷陰草亦有分別陶弘景以馬目毒公與鬼臼爲二物殊不知正是一物而有一種也又唐獨孤沼丹房鏡原云木律車有二種根皆似南星赤莖直上莖端生葉一種葉凡七瓣一種葉作數層葉似蓖麻面青背紫而有細毛葉下附莖開一花狀如鈴鐸倒垂

青白色黃藥中空結黃子風吹不動無風自搖可制砂汞按此即鬼臼之二種也其說形狀甚明

根氣味

辛溫有毒

別錄曰微溫

陶弘景曰甘溫有毒

甄權曰苦

徐之才曰畏垣衣

主治

本經曰殺蟲毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒別錄曰殺大毒療咳嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚醫不入湯

甄權曰主尸疰瘵瘵勞疾傳尸瘵疾

李時珍曰下死胎治邪瘵癰疽蛇毒射工毒

發明

蘇頌曰古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之

又曰今福州人三月采瑞田草根葉焙乾搗末蜜丸服治風疾

附方

子死腹中胞破不生此方累效救人歲萬數也鬼臼不拘多少黃色者去毛爲細末不用篩羅只撚之如粉爲度每服一錢無灰酒一盞同煎八分通口服立生如神名一字神散

方

射工中人寒熱發瘡鬼白葉一把苦酒漬攪取汁服一升日二次

黑黃急病黑黃面黑黃身如土色不妨食脈沈若青脈入口者死宜烙口中黑脈耳會玉泉章門心俞用

生鬼曰搗汁一小盞服乾者爲末水服三十六方

鬼臼部藝文一

羞寒花贊

宋宋祁

蜀地處處有之不爲人所愛根莖綴花蔽葉自隱
俗曰羞天花予易爲羞寒花按本草名曰鬼臼
冒寒而茂莖修葉廣附草作花葉蔽其上以其自蔽
若有羞狀

鬼臼部藝文二

瓊芝軒

宋黃庭堅

卓仙在時養瓊芝深根固蒂活人命憧憧來問此何
草但告渠是唐婆鏡

鬼臼部雜錄

山谷詩注子瞻詩所記胡道士玉芝一名瑯田草者
俗號其葉爲唐婆鏡葉底開花故號羞天花以予考
之其實本草之鬼臼也歲生一白如黃精而堅瘦滿
十二歲可爲藥就土中生根取一日勿令大本知也
黃芩如餽飽皮裏一白吞之數日不饑略三日可辟
穀也黃龍山老僧多採而斷食令人體羸而神王今
方家所用鬼臼乃鬼燈藥也如蜀人用鬼箭但用一
草根不知何物也鎮陽趙州開道傍叢生三羽者眞
鬼箭俗醫用藥如此而黃古方不治病可勝歎哉因
論玉芝故并記之

鬼針部彙考

釋名

鬼針草 拾遺

鬼釵 南方名

圖缺

本草綱目

鬼針草集解

陳藏器曰生池畔方莖葉有極子作釵腳著人衣如
針北人謂之鬼針南人謂之鬼釵

氣味

苦平無毒

主治

陳藏器曰蜘蛛蛇咬杵汁服并傳

李時珍曰塗蠟蠱傷

附方

割甲傷肉不愈鬼針草苗鼠粘子根搗汁和臘猪脂
塗之千金方

王孫部彙考

釋名

牡蒙 陶弘景

黃昏 別錄

長孫 齊名

白功草 吳名

王孫

黃孫 別錄

早藕 唐書

海孫 齊名

蔓延 吳名

王孫圖



本草綱目

王孫釋名

吳普曰楚名王孫齊名長孫又名海孫吳名白功草又名蔓延

李時珍曰紫參一名牡蒙木部合歡一名黃昏皆與此名同物異

集解

別錄曰王孫生海西川谷及汝南城郭垣下

吳普曰蔓延亦文整延相當

陶弘景曰今方家皆呼為黃昏云牡蒙市人少識者

蘇恭曰按陳延之小品方述本草牡蒙一名王孫徐之才藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣牡蒙葉似及己而大根長尺餘皮肉皆紫色

陳藏器曰早藕生太行山中狀如藕

李時珍曰王孫葉生顛頂似紫河車葉按神農吳普本草紫參一名牡蒙陶弘景亦曰今方家呼紫參為牡蒙其王孫並無牡蒙之名而陶氏於王孫下乃云又名牡蒙且無形狀唐蘇恭始以紫參牡蒙為二物

謂紫參葉似羊蹄王孫葉似及己但古方所用牡蒙皆為紫參後人所用牡蒙乃王孫非紫參也不可辨唐元宗時隱民妻撫上言終南山有早藕餌之延年狀類葛粉帝取作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠曰早藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之爾

據此牡蒙乃王孫也蓋紫參治血證積聚瘕癰而王孫主五臟邪氣辨痛療百病之文自可推也蘇恭引小品方牡蒙所主之證乃紫參非王孫故今移附紫參之下

根氣味

苦平無毒

吳普曰神農雷公苦無毒黃帝甘

陳藏器曰早藕甘平無毒

主治

本經曰五臟邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛

別錄曰療百病益氣

陳藏器曰早藕主長生不饑黑毛髮

王孫部紀事

唐書姜撫傳撫宋州人自言通仙人不死術隱居不出開元末太常卿韋縉祭名山因訪隱民還白撫已數百歲召至東都舍集賢院因言服常春藤使白髮還儼則長生可致藤生太湖最良終南往往有之不及也帝遣使者至太湖多取以賜中朝老臣因詔天下使自求之宰相裴耀卿奉觴上千萬歲壽帝悅御花萼樓宴羣臣出藤百盒徧賜之擢撫銀青光祿大夫號冲和先生撫又言終南山有早藕餌之延年狀類葛粉帝作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠能銘藥石曰常春者千歲藟也早藕牡蒙也方家久不用撫易名以神之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內慚悻請求藥牢山遂逃去
瑯嬛記孫真人有黃昏散夫妻反目服之必和又名合歡叔良製以為丸贈竊窺窺窺不服佩之裙裾香氣異常

王孫部雜錄

續博物志王孫一名黃孫一名黃昏孫思邈有黃昏散注云黃昏木或曰合歡合昏夜合花陳無已云探囊一試黃昏湯草部木部黃昏為二物郭璞曰守宮槐晝日蠶合而夜舒布也江東有木與此相反俗因名合昏古今注云合歡似梧桐枝葉互相結風來解使人不忘穢康種之於舍前

游宦紀聞後山贈二蘇公詩末云如大醫王治膏肓外證已解中尚強探囊一試黃昏湯一洗十年新學賜任子淵注云按圖經本草曰合歡夜合也一名合昏韋獨行方胃中甲錯是為肺癰黃昏湯治之取夜合皮掌大一枚水煮服之其說最為牽合無義沙隨先生云晚年因閱本草王孫味苦平無毒主五臟邪氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏生海西川谷蓋指當時瘴學為五臟邪氣耳取義精深如此

郎罷部彙考

釋名

櫻

烏杞

郎耶草

烏階

櫻

郎龍圖



爾雅

釋草

櫻音鳥階

注 郎鳥杷也子連相著狀如杷齒可以染皂櫻
一名鳥階郭云郎鳥杷也子連相著狀如杷齒可以染皂今俗謂之狼杷是也

本草綱目

狼杷釋名

李時珍曰此郎陳藏器本草郎耶草也閩人呼爺為郎罷則狼杷當作郎罷乃通又方士言此草即鼠尾草功用亦近之但無的據耳

集解

陳藏器曰狼杷草生山道旁與秋穗子並可染皂又曰郎耶草生山澤間高三四尺葉作鴈齒如鬼針苗鬼針即鬼釵也其葉有極如釵腳狀掌禹錫曰狼杷草出近道古方未見用者惟陳藏器言之而不詳文宗皇帝御書記其主療血痢甚為精至謹用書於本草圖經外類篇首

氣味

苦平無毒

主治

陳藏器曰黑人髮令人不老

又曰郎耶草主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖煮汁服

圖經曰狼杷草主丈夫血痢不療婦人根治積年疳

痢取草二觔搗絞取汁一小升納白麪半雞子許和勻空腹頓服極重者不過三服或收苗陰乾搗末蜜水半盞服一方寸匕

李時珍曰可染鬚髮治積年癰天陰即痒搔出黃水者搗末摻之

水半盞服一方寸匕

李時珍曰可染鬚髮治積年癰天陰即痒搔出黃水者搗末摻之

者搗末摻之


佛甲部彙考

釋名

佛甲草宋開經

佛指甲李時珍

佛甲圖



本草綱目

佛甲草集解

蘇頌曰佛甲草生筠州多附石向陽而生似馬齒莧而細小且長有花黃色不結實四季皆有

李時珍曰二月生苗成叢高四五寸莖葉細柔澤如馬齒莧尖長而小夏開黃花經霜則枯人多栽於石山瓦牆上呼為佛指甲救荒本草言高一二尺葉甚大者乃景天非此也

氣味

甘寒微毒

主治

蘇頌曰湯火灼瘡研貼之

蘇頌曰湯火灼瘡研貼之

蘇頌曰湯火灼瘡研貼之

蘇頌曰湯火灼瘡研貼之

仙人部彙考

釋名

仙人草 拾遺

仙人草圖



本草綱目

仙人草集解

陳藏器曰生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離隔草北地不生

主治

陳藏器曰小兒酢瘡頭小而硬者煮湯浴并搗傳丹毒入腹者必危可飲冷藥及用此洗之又按汁滴目明目去翳

仙人部藝文

仙人草贊

宋謝惠連

余之中園有仙人草焉春頡其苗夏秀其英秋有其實冬無彫色可謂貫四時而不改者既嘉其名而美其質染筆作詠庶以摯述云

園有嘉草名曰仙人燈煜燁燁莫莫臻臻頡發炎暑苗秀和春奇爾靈質乃植中林

鎮陽部彙考

釋名

鎮陽 補遺

鎮陽圖



本草綱目

鎮陽集解

李時珍曰鎮陽出肅州按陶九成輟耕錄云鎮陽生韃靼田地野馬或與蛟龍交遺精入地久之發起如笋上豐下儉鱗甲櫛比筋脈連絡絕類男陽即肉菰蓉之類或謂里之淫婦就而合之一得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切曬乾以充藥貨功力百倍於菰蓉也時珍疑此自有種類如肉菰蓉列當亦未必盡是遺精所生也

氣味

甘溫無毒

主治

朱震亨曰大補陰氣益精血利大便虛人大便燥結者啖之可代從容羹粥彌佳不燥結者勿用
李時珍曰潤燥養筋治痿弱

鎮陽部雜錄

癸辛雜識韃靼野地有野馬與蛟龍合所遺精於地遇春時則勃然如笋出地中老者如貓兒頭笋上豐下儉其形不典亦有鱗甲筋脈其名曰鎮陽即所謂肉菰蓉之類也或謂韃靼婦人之淫者亦從而好合之其物得陰氣則怒而長土人收之以薄刀去皮毛洗滌令淨日乾之為藥其力百倍於肉菰蓉其價亦百倍於常品也五峰云亦嘗得其少許
二酉委譚甘州多瑣陽肉菰蓉瑣陽形甚不雅草上

生

拳參部彙考

釋名

拳參
宋圖經

拳參圖



本草綱目

拳參集解

蘇頌曰生淄州田野葉如羊蹄根似海蝦黑色土人五月采之

主治

蘇頌曰爲末淋深腫氣

欽定古今圖書集成博物彙編草木典

第一百二十七卷目錄

附子部彙考

附子圖

張揖博雅釋草

本草綱目附子白附子

附子部藝文一

附子贊

彰明附子記

附子部藝文二詩

越州陶山附子圖

附子部紀事

附子部雜錄

側子部彙考

本草綱目側子

草木典第一百二十七卷

附子部彙考

釋名

發博雅

附子博雅


漏藍子彰明附子記

木鼈子雷敬

虎掌大明



附子圖



張揖博雅

釋草

發音 奚毒附子也一歲為前子二歲為烏喙三歲為

附子四歲為烏頭五歲為天雄

本草綱目

附子釋名

李時珍曰初種為烏頭象鳥之頭也附烏頭而生者為附子如子附母也烏頭如芋魁附子如芋子蓋一物也別有草烏頭白附子故俗呼此為黑附子川烏頭以別之諸家不分烏頭有川草兩種皆混雜註解今悉正之

集解

別錄曰附子生犍為山谷及廣漢冬月采為附子春月采為烏頭

陶弘景曰烏頭與附子同根附子八月采八角者良

烏頭四月采春時莖初生有腦頭如鳥鳥之頭故謂之烏頭有兩岐其蒂狀如牛角者名烏喙取汁煎為

射筒天雄似附子細而長乃至三四寸側子即附子

邊角之大者並是同根而本經附子出犍為天雄出少室烏頭出朗陵分生三處當各有所宜也今則無別矣

蘇恭曰天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳俱以八月采造餘處雖有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用

大明曰天雄大而長少角刺而實附子大而短有角平穩而實烏喙似天雄烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名為虎掌並是天雄一畜子母之類氣力乃有殊等即宿根與嫩者爾

雷敫曰烏頭少有莖苗身長而烏黑少有旁尖烏喙皮上蒼色有尖頭大者孕八九個周圍底陷黑如烏鐵天雄身全矮無尖周圍四面有附子孕十一個皮蒼色側子只是附子旁有小顆如棗核者木鼈子是喙附烏雄側中毗患者不入藥用

韓保昇曰正者為烏頭兩岐者為烏喙細長三四寸者為天雄根旁如芋散生者為附子旁連生者為側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍內及艾寇宗爽曰五者皆一物但依大小長短以象而名之耳

蘇頌曰五者今並出蜀土都是一種所產其種出於龍州冬至前將陸田耕五七遍以豬糞糞之然後布種逐月耘耔至大年八月後方成其苗高三四尺莖作四稜葉如艾其花紫碧色作穗其實細小如桑

葇狀黑色本只種附子一物至成熟後乃有四物以長二三寸者為天雄割削附子旁尖角為側子附子之絕小者亦名側子元種者為烏頭其餘大小者皆

爲附子以八角者爲上綿州彰明縣多種之惟赤水一鄉者最佳然收采時月與本草不同謹按本草冬采爲附子春采爲烏頭博物志言附子烏頭天雄一物也春夏秋冬采之各異而廣志云吳毒附子也一年爲側子二年爲烏喙三年爲附子四年爲烏頭五年爲天雄今一年種之便有此五物豈今人種時之法用力倍至故爾繁盛乎

李時珍曰烏頭有兩種出彰明者即附子之母今人謂之川烏頭是也春未生于故曰春采爲烏頭冬則生于已成故曰冬采爲附子其天雄烏喙側子皆是生子多者因象命名若生子少及獨頭者即無此數物也其產江左山南等處者乃本經所列烏頭今人謂之草烏頭者是也故曰其汁煎爲射菌陶弘景不知烏頭有二以附子之烏頭註射菌之烏頭遂致諸家疑貳而雷敫之說尤不近理宋人楊天惠著附子記甚悉今撮其要讀之可不辨而明矣其說云綿州乃故廣漢地領縣八惟彰明出附子彰明領鄉二十惟赤水廉水昌明會昌四鄉產附子而赤水爲多每歲以上田熟耕作壟取種於龍安龍州齊歸木門青絕小坪諸處十一月播種春月生苗其莖類野艾而澤其葉類地麻而厚其花紫瓣黃蕊長苞而圓七月采者謂之早水拳縮而小蓋未長成也九月采者乃佳其品凡七本同而末異其初種之小者爲烏頭附烏頭而旁生者爲附子又左右附而偶生者爲隔子附而長者爲天雄附而尖者爲天雄附而上出者爲側子附而散生者爲漏藍子皆脈絡連貫如于附母而附子以貴故專附名也凡種一而子六七以上則

皆小種一而子二三則稍大種一而子特生則特大附子之形以蹲坐正節角少者爲上有節多風乳者大之形不正而傷缺風皺者爲下本草言附子八角者爲良其角爲側子之說甚謬矣附子之色以花白者爲上鐵色者次之青綠者爲下天雄烏頭天雄皆以豐實盈握者爲勝漏藍側子則園人以乞役夫不足數也謹按此記所載漏藍即雷敫所謂木龍子大明所謂虎掌者也其鬍子即烏喙也天雄即天雄之類醫方亦無此名功用當相同爾

修治

韓保昇曰附子烏頭天雄側子烏喙采得以生熟湯浸半日勿令鹹氣出以白灰裏之數易使乾又法以米粥及糟麴等淹之並不及前法

蘇頌曰五物收時一處造釀其法先於六月內造大小麴糶未采前半月用大麥養成粥以麴造醋候熟去糟其醋不用太酸酸則以水解之將附子去根鬚於新甕內淹七日日攪一遍撈出以疎篩攤之令生白衣乃向慢風日中曬之百十日以透乾爲度若猛日則皺而皮不附肉

李時珍曰按附子記云此物最多不能常熟或種美而苗不茂或苗秀而根不充或已釀而腐或已曝而皴若有神物陰爲之者故園人常禱於神目爲藥妖其釀法用醋醃安密室中淹覆彌月乃發出曬乾方出曬時其大有如拳者已定輒不盈握故及一兩者極難得土人云但得半兩以上者皆良蜀人餌者少惟秦陝閩浙人宜之然秦人纔市其下者閩浙纔得其中者其上品則皆貴人得之矣

陶弘景曰凡用附子烏頭天雄皆熱灰微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子須甘草人參生薑相配者正制其毒故也

雷敫曰凡使烏頭宜文武火中炮令皺拆擊破用若用附子須底平有九角如鐵色一箇重一兩者即是氣全勿用雜木火只以柳木炭火中炮令皺拆以刀刮去上孕子并去底火壁破於屋下午地上掘一土坑安之一宿取出焙乾用若陰制者生去皮尖底薄切以東流水并黑豆浸五日夜漉出日中曬用

朱震亨曰凡烏附天雄須用童子小便浸透煮過以殺其毒并助下行之力入鹽少許尤好或以小便浸二七日揀去壞者以竹刀每個切作四片并水淘淨逐日換水再浸七日曬乾用

李時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用者須如陰制之法去皮臍入藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮臍乘熱切片再炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一箇用甘草二錢鹽水薑汁童便各半盞同煮熱出火毒一夜用之則毒去也

氣味

辛溫有大毒

別錄曰甘大熱

吳普曰神農辛岐伯雷公甘有毒李當之苦大溫有大毒

張元素曰大辛大熱氣厚味薄可升可降陽中之陰浮中沉無所不至爲諸經引用之藥

王好古曰入手少陰三焦命門之劑其性走而不守非若乾薑止而不行

趙嗣真曰熟附配麻黃發中有補仲景麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也生附配乾薑補中有發仲景乾薑附子湯通脈四逆湯是也

戴元禮曰附子無乾薑不熱得甘草則性緩得桂則補命門

李燾曰附子得生薑則能發散以熱攻熱又導虛熱下行以降冷病

徐之才曰地膽爲之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參黃耆

李時珍曰畏葦豆烏韭童漫犀角忌鼓汁得蜀椒食鹽下逆命門

主治

本經曰風寒欬逆邪氣寒濕膝痺拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血瘦金瘡

別錄曰腰脊風寒脚氣冷弱心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白溫中強陰堅肌骨又墮胎爲百藥長

張元素曰溫煖脾胃除脾胃寒補下焦之陽虛李杲曰除臟腑沉寒三陽厥逆濕淫腹痛胃寒蛇動

治經閉補虛散壅

王好古曰督脈爲病脊強而厥

李時珍曰治三陰傷寒陰毒寒疝中寒中風痰厥氣厥柔痊癰痢小兒慢驚風濕麻痺腫滿脚氣頭風腎

厥頭痛暴瀉脫陽久痢脾泄寒瘧瘴氣久病嘔噦反胃噎膈癰疽不斂久漏冷瘡合葱涕塞耳治聾

烏頭

張元素曰諸風風痺血痺半身不遂除寒冷溫養臟腑去心下堅痞感寒腹痛

李杲曰除寒濕行經散風邪破諸積冷毒

王好古曰補命門不足肝風虛

李時珍曰助陽退陰功同附子而稍緩

發明

寇宗奭曰補虛寒須用附子風家即多用天雄大略如此其烏頭烏喙附子則量其材而用之

李時珍曰按王氏究原方云附子性重溫脾逐寒川烏頭性輕疎溫脾去風若是寒疾即用附子風疾即用川烏頭一云凡人中風不可先用風藥及烏附

若先用氣藥後用烏附乃宜也又凡用烏附藥並宜冷服者熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以寒則陰氣益甚而病增治之以熱則拒格而不納熱

藥令飲下噤之後冷體既消熱性便發而病氣隨愈不違其性而致大益此反治之妙也昔張仲景治寒

疝內結用蜜煎烏頭近效方治喉痹用蜜炙附子含之嚙汁朱丹溪治疝氣用烏頭厄子並熱因寒用也

李東垣治馮翰林姪陰盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脈來七八至但按之則散用薑附湯加人參投

半斤服之得汗而愈此則神聖之妙也

吳綬曰附子乃陰證要藥凡傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖身大熱而脈沈者必用之或厥冷腹痛脈沈

細甚則腎背囊縮者急須用之有退陰回陽之力起死回生之功近世陰證傷寒往往疑似不敢用附子

直待陰極陽竭而用之已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰陽氣頗衰必須急用人參健脈以益其原佐以附

子溫經散寒捨此不用將何以救之
劉完素曰俗方治麻痺多用烏附其氣暴能衝開道

路故氣愈麻及藥氣盡而正氣行則麻痺愈矣
張元素曰附子以白朮爲佐乃除寒濕之聖藥溫藥宜少加之引經又益火之原以消陰翳則便溺有節烏附是也

虞搏曰附子稟雄壯之質有新開奪將之氣能引補氣藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥入血

分以滋養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表之風寒引溫煖藥達下焦以祛除在裏之冷濕

朱震亨曰氣虛熱甚者宜少用附子以行參耆肥人多濕亦宜少加烏附行經仲景八味丸用爲少陰嚮

導後世因以附子爲補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下之性以行地黃之滯可致遠爾烏頭天雄

皆氣壯形偉可爲下部藥之佐無人表其害人之禍相習用爲治風之藥及補藥殺人多矣

王履曰仲景八味丸爲陰火不足者設錢仲陽六味地黃丸爲陰虛者設附子乃補陽之藥非爲行滯也

王好古曰烏附非身涼而四肢厥者不可僭用服附子以補火必妨涸水

李時珍曰烏附毒藥非危病不用而補藥中少加引導其功甚捷有人纔服錢七即發燥不堪而昔人補

劑用爲常藥豈古今運氣不同耶荆府都昌王體瘦而冷無他病日以附子煎湯飲兼嚼硫黃如此數歲

斬州衛張百戶平生服鹿茸附子藥至八十餘康健倍常宋張杲醫說載趙知府耽酒色每日煎乾薑熟

附湯吞硫黃金液丹百粒乃能健啖否則倦弱不能支壽至九十他人服一粒即爲害若此數人皆其臟腑稟賦之偏服之有益無害不可以常理概論也又

瑣碎錄言滑臺風土極寒民啖附子如啖芋栗此則地氣使然爾

烏頭附子尖主治

李時珍曰爲末茶服五分吐風痰癰癩

發明

李時珍曰烏附用尖亦取其銳氣直達病所爾無他義也保幼大全云小兒慢脾驚風四肢厥逆用附子尖一箇硫黃棗大一箇蠅稍七箇爲末薑汁麪糊丸黃米大每服十九米飲下亦治久瀉疝氣凡用烏附不可執爲性熱審其手足冷者輕則用湯甚則用丸重者用膏候手足暖陽氣回卽爲佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非真慢脾風不可輒用故初虞世有金虎碧霞之戒

附方

少陰傷寒初得二三日脈微細但欲寐小便色白者麻黃附子甘草湯微發其汗麻黃去節二兩甘草炙二兩附子炮去皮一枚水七升先煮麻黃去沫納二味煮取三升分作二服取微汗傷寒論
少陰發熱少陰病始得反發熱脈沈者麻黃附子細辛湯發其汗麻黃去節二兩附子炮去皮一枚細辛三兩水一斗先煮麻黃去沫乃納二味同煮三升分二服上同
少陰下利少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯用大附子一箇去皮生破八片甘草炙二兩乾薑三兩水三升煮一升分溫再服其脈卽出者愈面赤加葱九莖腹痛加

芍藥二兩嘔加生薑二兩咽痛加桔梗一兩利止脈不出加人參二兩上同

陰病惡寒傷寒已發汗不解反惡寒者虛也芍藥甘草附子湯補之芍藥三兩甘草炙三兩附子炮去皮一枚水五升煮取一升五合分服上同

傷寒發躁傷寒下後又發其汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表証脈沈微身無大熱者乾薑附子湯溫之乾薑一兩生附子一枚去皮破作八片水三升煮取一升頓服傷寒

陰盛格陽傷寒陰盛格陽其人必躁熱而不飲水脈沈手足厥逆者是此証也薤白散用大附子一枚燒存性爲末蜜水調服通散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈口訣

熱病吐下及下利身冷脈微發躁不止者附子炮一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升煎半升溫服立效良方

陰毒傷寒孫兆口訣云房後受寒少腹疼痛頭疼腰重手足厥逆脈息沈細或作呃逆並宜退陰散用川烏頭乾薑等分切炒放冷爲散每服一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服得汗解 本事方王女散治陰毒心腹痛厥逆惡候川烏頭去皮臍冷水浸七日切曬紙裹收之遇有患者取爲末一錢入鹽八分水一盞煎八分服壓下陰毒如猪血相似再進一服 濟生回陽散治陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷一切冷氣大附子二枚炮裂去皮臍爲末每服三錢薑汁半盞冷酒半盞調服良久臍下如火暖爲度 續傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶急者用半兩重附子

一箇生破作四片生薑一大塊作三片糯米一撮以水一升煎六合溫服暖臥或汗出或不出候心定則以水解散之類解之不得與冷水如渴更煎滓服屢用多效

中風痰厥昏不知人口眼喎斜并體虛之人患瘧疾寒多者二生飲用生川烏頭生附子並去皮臍各半兩生南星一兩生木香二錢五分每服五錢生薑十片水二盞煎一盞溫服局方

中風氣厥痰壅昏不知人六脈沈伏生附子去皮生南星去皮生木香半兩每服四錢薑九片水二盞煎七分溫服之方

中風偏廢羌活湯用生附子一箇去皮臍羌活烏藥各一兩每服四錢生薑三片水一盞煎七分服王氏

半身不遂遂令瘳症用附子一兩以無灰酒一升浸一七日隔日飲一合延年

風病癱瘓手足痺曳口眼喎斜語言蹇澀步履不正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮臍五靈脂各五兩爲末入龍腦麝香五分清酒調服一日二服至五七九丸先以生薑汁研化暖酒調服一日二服至五七九丸便覺手攣移得步十九丸可以擡頭也方

風寒濕痹麻木不仁或手足不遂生川烏頭末每以香白米煮粥一盞入末四錢慢熬得所下薑汁一匙蜜三大匙空腹噉之或入薤白末二錢左傳云風淫末病謂四末也脾主四肢風淫客肝則侵脾而四肢病也此湯極有力予每授人良驗計學士

體虛有風外受寒濕身如在空中生附子生天南星

各二錢生薑十片水一盞半慢火煎服予會病此醫

傳張子發授此方二服愈方

口眼喎斜生烏頭青藥各等分爲末每用一字嚙入

鼻內取涕吐涎立效無比各通關散方

口辛噤瘖卒件停尸並用附子末吹入喉中瘖方

產後中風身如角弓反張口噤不語川烏頭五兩到

塊黑大豆半升同炒半黑以酒三升傾鍋內急攪以

絹濾取酒微溫服一小盞取汗若口不開拗開灌之

未效加烏雞養一合炒納酒中服以瘥爲度方

諸風血風烏頭丸治諸風縱緩言語蹇澀通身麻痛

皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目眩腸風賊毒下血不

止者服之尤效有痛風攀攣顛領不收者服六七服

即瘥也川烏頭炮去皮臍一兩荊芥穗二兩爲末醋

麪糊丸梧子大溫酒或熱水每服二十九方

婦人血風虛冷月候不勻或手脚心煩熱或頭面浮

腫頑麻用川烏頭一斤清油四兩鹽四兩鑊內同熬

令裂如桑甚色爲度去皮臍五靈脂四兩爲末搗勻

蒸餅丸如梧子大空心溫酒鹽湯下二十九亦治丈

夫風疾方

諸風癰疾生川烏頭去皮二錢五分五靈脂半兩爲

末猪心血丸梧子大每薑湯化服一丸

小兒慢驚搐搦涎壅厥逆川烏頭生去皮臍一兩全

蠟十箇去尾分作三服水一盞薑七片煎服方

小兒項軟乃肝腎虛風邪襲入用附子去皮臍天南

星各二錢爲末薑汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

小兒顛陷綿烏頭附子並生去皮臍二錢雄黃八分

能

能

爲末葱根搗和作餅貼陷處方

麻痺疼痛仙桃丸治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痹

痛或打撲傷損悶胸痛不可忍生川烏不去皮五靈

脂各四兩威靈仙五兩洗焙爲末酒糊丸梧子大每

服七九至十九鹽湯下忌茶此藥常服其效如神方

風痹肢痛營衛不行川烏頭炮去皮以大豆同炒至

汗出爲度去豆焙乾全蠍五分焙爲末醋熬糊丸

綠豆大每溫酒下七九日一服方

腰脚冷痺疼痛有風川烏頭三箇生去皮臍爲散醋

調塗昂上貼之須臾痛止方

大風諸癰瘰癧脹滿大附子半兩者一枚炮拆酒漬

之春冬五日夏秋三日每服一合以瘥爲度方

脚氣腿腫久不瘥者黑附子一箇生去皮臍爲散生

薑汁調如膏塗之藥乾再塗腫消爲度方

十指疼痛麻木不仁生附子去皮臍木香各等分生

薑五片水煎溫服方

搜風順氣烏附丸用川烏頭二十箇香附子半斤薑

汁淹一宿炒焙爲末酒糊丸梧子大每溫酒下十九

肌體肥壯有風疾者宜常服之方

頭風頭痛外臺祕要用臘月烏頭一升炒令黃末之

以絹袋盛浸三斗酒中逐日溫服孫兆口訣用附

子炮石膏煨等分爲末入腦麝少許每服五分茶酒

任下修真祕要用附子一枚生去皮臍綠豆一合

同入饅子內煮豆熟爲度去附子食綠豆立瘥每箇

可煮五次後爲未服之

風毒頭痛聖惠方治風毒攻注頭目痛不可忍大附

子一枚炮去皮爲末以生薑一兩大黑豆一合炒熟

同酒一盞煎七分調附末一錢溫服又方治二三十

年頭風不愈者用大川烏頭生去皮四兩天南星

炮一兩爲末每服二錢細茶三錢薄荷七葉鹽梅一

個水一盞煎七分臨臥溫服朱氏集驗方治頭痛

連購者生烏頭一錢白芷四錢爲末茶服一字仍以

未噉鼻有人用之得效

風寒頭痛十便良方治風寒客于頭中清淨項筋急

硬胃中寒痰嘔吐清水用大附子或大川烏頭二枚

去皮蒸過川芎麝生薑各一兩焙研以茶湯調服一

錢或剉片每用五錢水煎服隔三四日一服或加防

風一兩三因方必效散治風寒流注偏正頭痛年

久不愈最有神效用大附子一箇生切四片以生薑

汁一盞浸炙再浸再炙汁盡乃止高良薑等分爲末

每服一錢蠟茶清調下忌熱物少時

頭風摩散沐頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚

用大附子一箇炮食鹽等分爲末以方寸七摩額上

令藥力行或以油調稀亦可一日三上服方

年久頭痛川烏頭天南星等分爲末葱汁調塗太陽

穴方

頭風斧劈難忍川烏頭末燒烟熏盤內溫茶泡服之

方

痰厥頭痛如破厥氣上衝痰塞胃膈炮附子三分薑

墨四錢冷水調服方寸匕當吐即愈忌猪肉冷水

腎厥頭痛指南方用大附子一箇炮熟去皮生薑半

兩水一升半煎分三服經驗良方非根丸治元陽

虛頭痛如破服睛如錐刺大川烏頭去皮微炮全蠍

一枚炮去皮爲末以生薑一兩大黑豆一合炒熟

同酒一盞煎七分調附末一錢溫服又方治二三十

年頭風不愈者用大川烏頭生去皮四兩天南星

炮一兩爲末每服二錢細茶三錢薄荷七葉鹽梅一

個水一盞煎七分臨臥溫服朱氏集驗方治頭痛

連購者生烏頭一錢白芷四錢爲末茶服一字仍以

未噉鼻有人用之得效

風寒頭痛十便良方治風寒客于頭中清淨項筋急

硬胃中寒痰嘔吐清水用大附子或大川烏頭二枚

去皮蒸過川芎麝生薑各一兩焙研以茶湯調服一

錢或剉片每用五錢水煎服隔三四日一服或加防

以糯米炒過去米等分爲末韭根汁丸綠豆大每薄
荷茶下十五丸一日一服

氣虛頭痛氣虛上壅偏正頭痛不可忍者大附子一
枚去皮臍研末葱汁麪糊丸綠豆大每服十九茶清
下 僧繼洪瘡寮方蠟附丸云氣虛頭痛惟此方最
合造化之妙附子助陽扶虛鍾乳補陽鎮堅全蠍取
其鑽透葱涎取其通氣湯使用椒以達下鹽以引用
使虛氣下歸對證用之無不立效大附子一枚剉心
入全蠍去毒五枚在內以餘附末同鍾乳粉二錢半
白麪少許水和作劑包附煨熟去皮研末葱涎和丸
梧子大每椒鹽湯下五十丸

腎氣上攻頭項不能轉移椒附丸用大熟附子一枚
爲末每用二錢以椒二十粒用白麪填滿椒口水一
盞半薑七片煎七分去椒入鹽空心點服椒氣下達
以引逆氣歸經也

鼻淵腦泄生附子末葱涎和如泥塗涌泉穴
耳鳴不止無晝夜者烏頭燒作灰菖蒲等分爲末綿
裹塞之日再用取效

耳卒聾閉附子醋浸削尖插之或更於上灸二七壯
本單

聾耳膿血生附子爲末葱涕和灌耳中
喉癰腫塞附子去皮炮令折以蜜塗上炙之令蜜入
含之勿嚥汁已成者即膿出未成者即消散

久患口瘡生附子爲末醋調貼足心男左女右日
再換之

風蟲牙痛普濟方用附子二兩燒灰枯礬一分爲末
搗之 又方川烏頭川附子生研麪糊丸小豆大每

綿包一丸咬之 刪繁方用炮附子末納孔中乃止
眼暴赤腫疼痛不得開淚出不止制附子赤皮末如
蠶沙大著背中以定爲度

一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強力固精益
髓令人少病川烏頭一斤用五升大甕鉢子盛以童
子小便浸七日逐日添令溢出揀去壞者不用餘以
竹刀切作四片新汲水淘七次乃浸之日日換水日
足取焙爲末酒煮麪糊丸綠豆大每服十九空心鹽
湯下少粥飯壓之

升降諸氣暖則宜流熱附子一大箇分作二服水二
盞煎一盞入沈香汁溫服

中寒昏困薑附湯治體虛中寒昏不知人及臍腹冷
痛霍亂轉筋一切虛寒之病生附子一兩去皮臍乾
薑炮一兩每服三錢水二鍾煎一鍾溫服

心腹冷痛冷熱氣不和山厄子川烏頭等分生研爲
末酒糊丸梧子大每服十五丸生薑湯下小腸氣痛
加炒茴香葱酒下二十九

心痛痛氣濕熱因寒鬱而發用厄子降濕熱烏頭破
寒鬱烏頭爲厄子所引其性急速不留胃中也川烏
頭山厄子各一錢爲末順流水入薑汁一匙調下

寒厥心痛及小腸膀胱痛不可止者神砂一粒丹用
熟附子去皮鬱金橘紅各一兩爲末醋麪糊丸如酸
棗大朱砂爲衣每服一丸男子酒下女人醋湯下

寒疝腹痛遶臍手足厥冷自汗出脈弦而緊用大烏
頭煎主之大烏頭五枚去臍水三升煮取一升去滓

納蜜二升煎令水氣盡強人服七合弱人服五合不
瘥明日更服

寒疝身痛腹痛手足逆冷不仁或身痛不能服用烏
頭桂枝湯主之烏頭一味以蜜二斤煎減半入桂枝
湯五合解之得一分利服二合不知再服又不知加
至五合其知者如醉狀得吐爲中病也

寒疝引脇肋心腹皆痛諸藥不效者大烏頭五枚去
角四破以白蜜一斤煎令透取焙爲末別以熟蜜和
丸梧子大每服二十九冷鹽湯下永除

寒疝滑瀉腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍延胡
索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑七片
煎七分溫服

小腸諸痛倉卒散治寒疝腹痛小腸氣膀胱氣脾腎
諸痛擊急難忍汗出厥逆大附子炒去皮臍一枚山
厄子炒焦四兩每用三錢水一盞酒半盞煎七分入
鹽一捻溫服 宣明方治陰疝小腹腫痛加蒺藜子
等分 虛者加桂枝等分薑糊爲丸酒服五十丸

虛寒腰痛鹿茸去毛酥炙黃附子炮去皮臍各二
兩鹽花三分爲末棗肉和丸梧子大每服三十九空
心溫酒下 夷堅志云時康祖大夫病心胃一漏數
竅流汁已二十年又苦腰痛行則僂偻形神憔悴醫
不能治通判韓子溫爲檢聖惠方得此方令服旬餘
腰痛減久服遂瘥心漏亦瘥精力倍常步履輕捷此
方本治腰而效乃如此

元臟傷冷經驗方用附子炮去皮臍爲末以水二盞
入藥二錢鹽薑薑棗同煎取一盞空心服去積冷暖
下元肥腸益氣酒食無碍 梅師方二虎丸補元臟

第五四二冊 之〇七葉

進飲食壯筋骨用烏頭附子合四兩醋浸三宿切
作片子搗一小坑炭火燒赤以醋三升同藥傾入坑
內用盆合之一宿取出去砂土入青鹽四兩同炒赤
黃色爲末醋打糊丸如梧子大空心冷酒下十五
丸婦人亦宜

胃冷有痰脾弱嘔吐生附子半夏各二錢薑十片水
二盞煎七分空心溫服一方並炮熟加木香五分

方良

久冷反胃經驗方用大附子一箇生薑一片剉細同
煮研如麪糊每米飲化服一錢 衛生家寶方用薑
汁打糊和附子末爲丸大黃爲衣每溫水服十丸

斗門方用長大附子一箇坐於磚上四面著火漸逼
以生薑自然汁淬之依前再逼再淬約薑汁盡半盞
乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服癰或以猪
腰子切片炙熟蘸食 方便集用大附子一箇切下
頭子剉一窠安丁香四十九箇在內仍合定線扎入
砂銚內以薑汁浸過文火熬乾爲末每挑少許置掌
心舐吃日十數大忌毒物生冷

脾寒瘧疾濟生方云五臟氣虛陰陽相勝發爲瘧瘧
寒多熱少或但寒不熱宜七棗湯主之附子一枚炮
七次鹽湯浸七次去皮臍分作二服水一盞生薑七
片棗七枚煎七分露一宿發日空心溫服未久再進

一服王璽百一選方云瘧疾宜附子風痰宜烏頭各
用烏頭則寒多者火炮七次熱多者湯炮七次去皮
焙乾如上法用烏頭性熱炮多則熱散也 又果附
湯用熟附子去皮草蓂仁各二錢半水一盞薑七片
棗一枚煎七分發日早溫服 肘後方臨發時以醋

和附子塗於背上

寒熱瘧疾附子一枚重五錢者麝人參丹砂各一
錢爲末煉蜜丸梧子大每服二十九丸未發前連進三
服中病則吐或身體麻木未中病來日再服 瘧疾
瘧寒熱冷瘧寒熱往來頭痛身疼嘔痰或汗多引
飲或自利煩躁宜薑附湯主之大附子一枚四破每
以一片水一盞生薑十片煎七分溫服李待制云此
方極妙章保云嶺南以啞瘧爲危急不過一二日而
死醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈得并
以熱攻熱而發散寒邪手眞起死回生之藥也

方

衛生

小便虛閉兩尺脈沈微用利小水藥不效者乃虛寒
也附子一箇炮去皮臍鹽水浸良久澤瀉一兩每服
四錢水一盞半燈心七莖煎服即愈

普濟

腫疾喘滿大人小兒男女腫因積得既取積而腫再
作小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫
者到此多束手蓋中焦下焦氣不升降爲寒痞隔故
水凝而不通惟服沈附湯則小便自通喘滿自愈用
生附子一箇去皮臍切片生薑十片入沈香一錢磨
水同煎食前冷飲附子雖三五十枚亦無害小兒每
服三錢水煎服

朱氏集

方良

脾虛濕腫大附子五枚去皮四破以赤小豆半升藏
附子於中慢火煮熟去豆焙研末以薏苡仁粉打糊
丸梧子大每服十九丸蘿蔔湯下 瘧疾
陰水腫滿烏頭一升桑白皮五升水五升煮一升去
滓銅器盛之重湯煎至可丸九小豆大每服三五丸
取小便利爲佳忌油膩麪食魚肉 又方大附子草

便浸三日夜逐日換尿以布擦去皮搗如泥酒糊和
丸小豆大每服三十丸煎流氣飲送下

普濟

大腸冷秘附子一枚炮去皮取中心如棗大爲末二
錢蜜水空心服之

魏氏集

老人虛泄不禁熟附子一兩赤石脂一兩爲末醋糊
丸梧子大米飲下五十九丸

方良

冷氣洞泄生川烏頭一箇木香半兩爲末醋糊丸梧
子大每陳皮湯下二十九丸

本集

藏寒脾泄及老人中氣不足久泄不止肉豆蔻二兩
煨熟大附子去皮臍一兩五錢爲末粥丸梧子大每
服八十九丸蓮肉煎湯下 十便良方治脾胃虛冷大
腸滑泄米穀不化之方用大附子十兩連皮同大薑
二升於石器內以水煮一日常令水過兩指取出每
箇切作三片再同煮半日削去皮切焙爲末別以蠶
肉和丸梧子大每空心米飲服三四十丸

小兒吐泄注下小便少白龍丸用熟附子五錢白石
脂煨龍骨煨各二錢半爲末醋糊丸黍米大每米
飲量兒大小服

心聖

霍亂吐泄不止附子重七錢者炮去皮臍爲末每服
四錢水二盞鹽半錢煎一盞溫服立止

普濟

水泄久痢川烏頭二枚一生用一以黑豆半合同煮
熟研丸綠豆大每服五丸黃連湯下

普濟

久痢赤白獨聖丸用川烏頭一箇灰火燒烟盡取出
地上薑薑良久研末酒化蠟丸如大麻子大每服三
丸赤痢黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下白痢甘草黑
豆煎湯冷吞如瀉及肚痛以水吞下並空心服之忌
熱物

良方

久痢休息熱附子半兩研末雞子白二枚搗和丸梧子大傾入沸湯煮數沸漉出作兩服米飲下

下痢欬逆脉沈陰寒者退陰散主之陳自明云一人病此不止服此兩服而愈方見前陰毒傷寒下

下血虛寒日久腸冷者熟附子去皮枯白礬一兩爲末每服三錢米飲下 又方熟附子一枚去皮生薑

三錢五分水煎服或加黑豆一百粒 陽虛吐血生地黃一斤搗汁入酒少許以熟附子一

兩半去皮臍切片入汁內石器煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末以膏和搗丸梧子大每空心米飲

下三十九昔葛察判妻苦此疾百藥皆試得此而愈屢發屢效

漫數白濁熱附子爲末每服二錢薑三片水一盞煎六分溫服

虛火背熱虛火上行背內熱如火炙者附子末津調塗涌泉穴

經水不調血臟冷痛此方平易捷徑熟附子去皮當歸等分每服三錢水煎服

斷產下胎生附子爲末淳酒和塗右足心胎下去之折跪損傷卓氏膏用大附子四枚生切以猪脂一斤

三年苦醋同漬三宿取脂煎三上三下日摩傳之癰疽腫毒川烏頭炒黃藥炒各一兩爲末唾調塗之

留頭乾則以米泔潤之上癰疽久漏瘡口冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透切作大片厚三分安瘡口上以艾灸之隔數日

一灸灸至五七次仍服內托藥自然肌肉長滿研末作餅子亦可

癰疽瘡肉如眼不斂諸藥不治此法妙極附子削如棋子大以唾粘貼上用艾火灸之附子焦復唾濕再灸令熱氣徹內即瘥

癰疽肉突烏頭五枚濃醋三升漬三日洗之日夜三四度

丁瘡腫痛醋和附子末塗之乾再上

久生疥癬川烏頭生切以水煎洗按驗

手足凍裂附子去皮爲末以水煎調塗之

足釘怪疾兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘脛骨生碎孔髓流出身發寒顛惟思飲酒此是肝腎冷熱相

吞用炮川烏頭末傳之內服非于湯

風厥癰癩凡中風痰厥癰癩驚風痰涎上壅牙關緊急上視搖擗並宜碧霞丹主之烏頭尖附子尖蠟稍

各七十個石綠研九度飛過十兩爲末麪糊丸芡子大每用一丸薄荷汁半盞化下更服溫酒半合須臾

吐出痰涎爲妙小兒驚癇加白僵蠶等分

臍風撮口生川烏尖三箇全足蜈蚣半條酒浸炙磨香少許爲末以少許吹鼻得嚏乃以薄荷湯灌一字

木舌腫脹川烏尖巴豆研細醋調塗

牙痛難忍附子尖天雄尖全蠍各七箇生研爲末點之

不可多

割甲成瘡連年不愈川烏頭尖黃藥等分爲末洗了貼之以愈爲度

老幼口瘡烏頭尖一箇天南星一箇研末薑汁和塗足心男左女右不過二三次即愈

別錄曰白附子生蜀郡三月采陶弘景曰此物久絕無復真者

蘇恭曰本出高麗今出涼州以西蜀郡不復有生砂積下濕地獨莖似鳳尾草細葉周匝生於穗間根形似天雄

李珣曰徐表南州異物記云生東海新羅國及遼東苗與附子相似

李時珍曰根正如草烏頭之小者長寸許乾者皺文有節

氣味

辛甘大溫有小毒

韓保昇曰甘辛溫

大明曰無毒

李珣曰小毒入藥炮用

李杲曰純陽引藥勢上行

主治

別錄曰心痛血痹面上百病行藥勢

大明曰中風失音一切冷風氣面肝癰痲

李珣曰諸風冷氣足弱無力疥癬風瘡陰下濕癢頭面痕入面脂用

王好古曰補肝風虛

朱震亨曰風痰

發明

李時珍曰白附子乃陽明經藥因與附子相似故得此名實非附子類也按楚國先賢傳云孔休傷頗有癰王莽賜玉屑白附子香與之消癰

附方

中風口喎半身不遂牽正散用白附子白僵蠶全蠍並等分生研為末每服二錢熱酒調下蘇氏家藏方
小兒暑風暑毒入心痰塞心孔昏迷搐搦此乃危急之証非此丸生料服之刺不能伐之三生丸用白附子天南星半夏並去皮等分生研猪膽汁和丸黍米大量見大小以薄荷湯下令兒側臥喉出痰水即甦心機方

風痰眩運頭痛氣鬱胃膈不利白附子炮去皮臍半斤石膏煨紅半斤硃砂二兩二錢半龍腦一錢為末粟米飯丸小豆大每服三十九食後茶酒任下劉葉院方
偏正頭痛白附子白芷猪牙皂角去皮等分為末食後清茶服仰臥少頃普濟本方

痰厥頭痛白附子天南星半夏等分生研為末生薑自然汁浸蒸餅九綠豆大每服四十九食後薑湯下

方濟生

赤白汗斑白附子硫黃等分為末薑汁調稀茄蒂蘸擦日數次簡便方

面上疥瘡白附子為末臥時將水洗面以白蜜和塗紙上貼之久久自落衛生簡方

耳出膿水白附子炮羌活二兩為末猪羊腎各一箇每箇入末半錢濕紙炮煨熟五更食溫酒下聖濟方

喉痹腫痛白附子末枯礬等分研末塗舌上有涎吐出聖惠方

偏墜疝氣白附子一箇為末津調填臍上以艾灸三壯或五壯即愈醫方秘傳

小兒吐逆不定虛風喘急白附子藿香等分為末每米飲下半錢保幼大全方

慢痺驚風白附子半兩天南星半兩黑附子一錢並炮去皮為末每服二錢生薑五片水煎服亦治大人風虛止吐化痰宣和間真州李博士用治吳內翰女孫甚效康州陳侍郎病風虛極昏吳內翰令服三四服即愈醫方秘傳

附子部藝文一

附子贊

宋宋祁

生綿州彰明縣者最良有一子重及一兩者花色紫本草言附子無正種附烏頭而生然則與烏頭天雄附子共一物耳陶弘景以天雄烏頭附子皆出建平謂之三建唐人非之以綿隴二州所生為良則今彰明者佳

彰明附子記

楊天惠

綿州故廣漢地領縣八惟彰明出附子彰明領鄉二十惟赤水廉水會昌明宜附子總四鄉之地為田五百二十頃有奇然稅稻之田五菽粟之田三而附子之田止居其二焉合四鄉之產得附子一十六萬斤已上然赤水為多廉水次之而會昌明所出微甚凡上農夫歲以善田代處前期輒空田一再耕之蒔蕎麥若粟糜其中比苗稍壯并根葉耕覆土下後耕如初乃布種每畝用牛十耦用糞五十斛七寸為壟五寸為符終畝為符二千為壟千二百壟從無衡草為援以御短日其用工力比它田十倍然其歲獲亦倍稱成之凡四鄉度用種千斛以上出龍安及龍州齊歸木閣青提小平者良其播種以冬盡十一月止采擷以秋冬九月止其莖類野艾而澤其葉類地麻而厚其花紫葉黃長苞而圓其蓋其實之美惡視功之動盪以故富室之人常美貧者雖接畛或不盡然又有七月采者謂之早水拳縮而小蓋附子之未成者然此物謂畏惡農多不能常熟或種美而苗不茂或苗秀而不充或以釀而腐或以暴而斃若有物焉陰為之故園人將采常禱於神或目為藥妖釀法用醢醢安密室淹覆彌月乃發以時暴涼久乾定方出釀時其大有如拳者已定不輒盈握故及兩者極難得蓋附子之品有七實本同而未異其初種之小者為烏頭附烏頭而旁生者為附子又左右附而偶生者為鬲子又附而長者為天雄又附而尖者為天雞又附而上者為側子又附而散者為漏籃子皆