

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

熱入血室

臨證指南
申

R249.49

5-2

乾隆丁酉新馬

古吳葉天士先生著

續刻臨證指
南溫熱論

後附丁酉夏

吳年典

家世

雲精通岐黃術常存利濟心
人之心致不倦向慕吳門葉
士先生為當世之扁留心覓其
醫案約計盈萬分門逐刻共
十卷名曰臨證指南已遍

吳年典

賁甫

證指南醫案目

卷九

調經

淋帶


崩漏

胎前

產後

癥瘕

熱入血室



臨證指南醫案卷九

浙關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲仝較

姪旦王堂

調經

氣鬱氣
血結

張九經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不

生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而

脉絡間亦致間斷蒙痺例以通劑

川芎

當歸

肉桂

生艾

小茴

後期
鬱傷
久嗽
肺氣
虛

茯苓

生香附

南山查

益母膏丸

姚二

久嗽背寒晨汗右卧咳甚經事日遲脉如數而虛穀

減不欲食此情志鬱傷延成損怯非清寒肺藥所宜

黃芪

桂枝

白芍

炙草

南棗

飴糖

肺爲氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則咳嗽此則久嗽背寒晨汗全是肺氣受傷而經事日遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脉數虛火也虛則不可以清寒况穀減不欲食中氣之餒已甚可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣

肝犯胃

而桂枝白芍非斂陰和血之妙品乎

秦二氣衝心痛嘔涎氣墜小腹爲瀉經來後期其色或淡

或紫病在衝脉從厥陰陽明兩治

川連

小茴

川棟子

歸尾

炒半夏

茯苓

桂枝

橘紅

鬱傷肝

華二鬱傷肝脾是因懷抱不暢致氣血不和逍遙散減白

朮加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經來

日遲鬱痺宜通而氣弱不主統血況春深泄氣之候必

佐益氣之屬方爲合法歸脾湯

又向有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒少

腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此皆
肝木拂逆甚則爲厥夫肝臟相火內寄病來迅速皆動
極之徵爲肝用太過宜制其用前此芪朮守補不可用
矣安胃理中丸去黃柏細辛

錢

豚瀉腕悶減食經水來遲腹痛墜

柴胡

炒白芍

黃芩

鬱金

香附

茯苓

蘇梗

神麴

又

諸恙未減腹但痛不墜

逍遙散去白朮甘草加鬱

金香附神麴

許

十

經閉寒熱便澹腹痛

加味逍遙散去山梔

血絡鬱
熱腹痛

其 血虛內熱經不至 加味逍遙散去木

其 經遲腹痛風疹絡血不寧久鬱成熱法當通利肉桂

涼膈去芒硝加丹皮赤芍

奇脉至

孫二 奇脉下損經遲腹痛先用當歸建中湯續商八脉治

法 歸建中湯

又 久嗽遇勞寒熱 歸建中法薑

謝三 能食不運痰涎經事愆期少腹中乾澀而痛下焦寒

軍衝心電逆頭鳴心弦八脉奇經交病

王 人參

茯苓

艾葉

製香附

淡從蓉

淡骨脂

肉桂

當歸

鹿角霜

小茴香

紫石英

益母膏丸

王三脉右緩左清經水色淡後期嘔吐痰水食物畢咽三載餘不孕此久鬱痰滯氣務宜宣通從陽明厥陰立方

半夏

廣皮

茯苓

厚朴

茅朮

淡吳萸

小香附

山楂肉

薑汁法丸

又

三月中用辛溫宣鬱方痰瘀自下胸次寬嘔逆緩今

喜暖食惡寒經遲至五十餘日來必色淡且少議用溫

養衝任栽培生氣方法不入珍去木草地加小茴肉桂

斷艾香附紫石英河車膠丸

肝腎

朱二經水二月兩至或幾月不來五年來並不孕育下焦

肢體常冷是衝任脉損無有貯蓄煖益腎肝主之

人參 河車膠 熟地砂仁 歸身 白芍

川芎 香附 茯神 肉桂 艾炭

小茴 紫石英 益母膏丸

產後

程七十三三年不孕育其中幻病非一病人述經期遲至來

期預先三日周身筋骨脉絡牽掣痠楚不得舒展凡女

入月水諸絡之血必彙集血海而下血海者即衝脉也

男子藏精女子繫胞不孕經不調衝脉病也腹為陰陰

虛生熱肢背為陽陽虛生寒究竟全是產後不復之虛

損。或見病治病之悞。有終身不育。淹淹之累。肝血陰虛。木火內寄。古人溫養下焦。必佐涼肝堅陰。勿執經後期。爲氣滯。亂投破氣。剛藥劫陰。

河車膠

生地

枸杞

沙苑

生杜仲

白薇

山查

黃柏

白花益母草

肝腎
虛陰虛

朱

經云。陽維爲病。苦寒熱。緣上年冰雪甚少。冬失其藏。

春牛潮濕。地氣升泄。以肝腎血液久虧之質。春生力淺。

八脉隸乎肝腎。一身網維。八脉乏束固之司。陰弱內熱。

陽微外寒矣。脅脊常痛。經事愆期。血海漸涸。久延虛怯。

情景已露。局方逍遙散。固文科聖藥。大意重在肝脾二

經因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。佐柴胡
微升。以引少陽生氣。上中二焦之鬱勃。可使條暢。今則
入暮病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脉不為約
束。故熱無汗。至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當宗
仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。

炙甘草

阿膠

細生地

生白芍

麥冬

牡蠣

某 陰虧內熱。經事愆期。

雄烏骨雞

小生地

阿膠

白芍

枸杞

天冬

茯苓

羌活

黃芩

桂圓

痛經

血滯

傷氣

右寸味用青蒿汁童便醇酒熬膏加蜜丸

張四寒熱間日經來腹痛

小生地

丹皮

知母

花粉

生薑

澤蘭

某十二先腹痛而後經至氣滯為多是泄腹鳴亦脾胃之病

與不焦痕泄則異

川芎

當歸

香附

煨廣木香

查肉

茯苓

某六寒熱無汗經先腹痛喉中燥癢咳逆食物不思此鬱

傷氣血八脉主病姑先與澤蘭湯

歸身

薛蘭

丹參

白芍

柏子仁

茯神

周七室女經水不調。先後非一。來期必先腹痛。較之平日
爲重。飲食大減。始於初夏。入秋下焦常冷。腹鳴忽瀉。忽
結。究脉察色。是居室易於鬱怒。肝氣偏橫。胃先受戕。而
奇經衝任。竊維諸脉。皆肝胃屬隸。脉不循序流行。氣血
日加阻痺。失治必結。痼聚疰痞之累。

南山查

生香附

延胡

當歸

青皮

三稜

蓬朮

牛膝

川辣子

澤蘭

肉桂

炒小茴

蔥白汁丸

顧 經來筋掣腹痛。常有心痛乾嘔。此肝氣厥逆。循任督

病。務在宣通氣血。以調經。溫燥忌用。自可得效。

川棟 一錢 丹皮 三錢 炒查 二錢 胡蓮 八分

延胡 一錢 澤蘭 二錢 歸身 二錢 生白芍 二錢

又 柏子仁丸

吳 鬱傷絡脉。痛經。

川芎 當歸 香附 小茴

烏藥 茯苓 紅棗

費 經水紫黑。來時嘈雜。脉絡收引而痛。經過帶下不斷。

形瘦日減。脉來右大左弱。上部火升。下焦冷徹。骨中陰

陽乖違焉得孕育閱醫都以血瀉劑宜乎鮮效議通

陽攝陰法

鮑魚

生地

淡從蓉

天冬

當歸

柏子仁

炒山查

牛膝

茯苓

紅棗斷艾湯云丸

朱 脉數右肩痛經不調經水氣攻觸皆性躁氣分有

氣

細子苓

白芍

黑山梔

鈎藤

茯苓

當歸

香附

羌蔚子

桑枝

李 酸滴入裏氣血呆鈍痛自心腹脹及少腹昔經行

血虛 貧酸氣