



瘍科捷徑卷上目錄

癰疽原委論

癰疽治法歌

癰疽陽症歌

癰疽陰症歌

癰疽半陰半陽歌

癰疽五善七惡歌

治病則例歌

論病死生歌

腫瘍治法歌

潰瘍治法歌

頭部

百會疽

透腦疽

侵腦疽

佛頂疽

玉枕疽

額疽

鬚疽

天疽銳毒

耳後疽

耳根毒

油風

白屑風

禿瘡

肥瘡

蠟蛇癰

面部

顴瘍顴疽

顴疔

面發毒

痄癰

骨槽風

發頤

時毒

鳳眉疽

眉心疽

龍泉疽

虎鬚毒

項部

腦疽

天柱疽

纏頸風痰

鎖喉癰

瘰癧

石痰

失榮症

背部

上中下三發背

上搭手

中搭手

下搭手

卷一  
腰部

腎俞發

纏腰火丹

眼部

眼胞菌毒

眼丹

漏睛瘡

鼻部

鼻疔

鼻齰瘡

鼻渊

鼻痔

鼻衄

肺風粉刺

耳部

黑疔

耳痔菌挺

口部

大人口破

口糜

唇部

反唇鎖口疔

繭唇風

齒部

牙齦

鑽牙疳

牙疔

牙癰

走馬牙疳

爛牙疳

防風通聖芍將軍枳殼芎歸薄朮芩甘草荆防翹滑石  
石羔麻桔樸硝斟

防風 麻黃 芍藥 連翹 大黃 荆芥 石羔  
黃芩 桔梗 川芎 薄荷 白朮 當歸 枳殼  
滑石 朴硝 生草

潤肌膏

潤肌膏內用麻油紫草當歸一處投能擦禿瘡枯癥色  
加之黃蠟效應收

當歸 五錢 紫草 壹錢 黃占 五錢 麻油 四兩

右藥濃煎去渣漫熬臨好入黃占收膏頻擦患處

卷之三  
麥餳散

麥餳原搽白禿瘡硫黃白信要相當川椒生熟枯礬末配以烟膠一掃光

小麥麪壹斤 硫黃四兩 白砒壹兩 烟膠捌兩  
川椒參兩 生礬貳兩 枯礬貳兩

其爲細末麻油調敷搽藥蟲死風散白皮枯色不退以前方潤肌膏擦之

肥瘡

肥瘡風溼兩凝成淫癢滋蔓黃水頻外面宜敷青蛤散消風內服自開陳

消風散

消風散內地歸身蟬退荆防蒼苦參知母胡麻牛蒡子  
石膏甘草木通侵

地黃 防風 蟬退 知母 石羔 胡麻 荆芥  
牛蒡 苦參 木通 蒼朮 當歸 生草

青蛤散

肥瘡青蛤最神良蛤粉相兼青黛涼煅石羔同輕粉相  
香油猪胆共同方

青黛參錢蛤粉壹兩石羔壹兩輕粉五錢川柏五錢  
共爲細末猪胆麻油調敷

卷一  
一  
蠆  
蟇  
癧

蠆  
蟇  
癧是擅拱頭大小須分各有由胎毒膜多堅且小  
大而焮腫暑邪留

治法歌

擅拱頭 胎毒由宜將三品毒能瘳衣膜化淨生肌散  
八寶清涼功可收

蠆  
蟇  
癧 暑熱成清涼紅勝盡能平風邪鬱久難收歟  
宜用青銅散自輕

內服法 亦有方暑熱黃連消毒湯胎毒綿延經久者  
真珠七寶用之康

# 三品錠

三品錠子是神良白信雄礬又乳香研末共調爲錠子  
疗疽癰癰用之康

明礬

貳兩

白信

壹兩

雄黃

貳錢四分

乳香

壹錢參分

去油

砒礬二味爲末入罐煅紅俟白烟旋起爲度放地上  
涼一宿取出將乳香雄黃二味和勻前药共研極細  
麪漿爲條陰乾聽用治瘡瘍成管將條挿於患處膏  
蓋○然此药下之疼痛頗甚小兒及體弱者不宜輕  
用惟古方針頭散爲最妥

# 敗銅散

敗銅散治潰風傷騷癢侵淫滋水瘡舊罐化銅研細末  
麻油調用擦之強

化銅舊罐研細末香油調敷

輕乳生肌散

輕乳生肌治腐瘍石羔冰竭乳輕鑲若然有水加龍芷  
雞內金加收口良

石羔壹兩 血竭五錢 乳香五錢 輕粉五錢 冰片壹錢  
有水加真龍骨壹錢 白芷壹兩 不收口加雞內金壹錢  
炙爲末摻之

七寶丹

珍珠七寶用牛黃琥珀辰砂滴乳方冰片甘黃珠粉共  
胎元火毒盡消洋

珠粉

四分琥珀

貳錢

甘黃

壹錢

辰砂

五分

犀黃

叁分

冰片

叁分

滴乳石

叁錢

共研極細用藥三分加入白飛麪五分土茯苓湯送  
下

黃連消毒飲

黃連消毒飲連翹黃柏山梔芩草調內熱口乾煩燥甚  
更加牛勞自然消

川連

連翹

山梔

生草

川柏

牛勞

淡芩

玉紅膏 八寶丹 紅勝丹 清涼膏 見潰瘍

面部

顴瘍顴疽

顴瘍疽症似榴形風熱相凝致結成瘍起焮紅浮腫痛  
疽生堅硬木麻行

內外治法照腫潰瘍門

顴疔

顴疔初發似椒形病屬陽明火毒成堅硬木麻根散漫  
更兼寒熱癢疼行

犀角地黃湯 热極焦煩者用

犀角地黃湯芍藥更兼一味牡丹皮陽明積熱皆堪服  
止血還須用此醫

犀角 地黃 赤芍 丹皮

拔疔散

白降原來卽拔疔水銀月石火硝勺鹽礮礞阜皆堪用  
白信還須煅煉真

水銀 參錢 火硝 參錢 月石 參錢 食鹽 貳錢 阜礮 貳錢

白砒 貳錢 明礮 參錢 硗砂 貳錢

以上八味傾入陽城罐內微火結胎次用粗磁盆一  
只將陽城罐覆於盆上以鹽泥封固另用木桶一只

傾入涼水將磁盆磚襯安好再用粗瓦鉢一個中底鑿一圓孔套於陽城罐底以炭火架於鉢內煅煉三炷香爲度

桑丹清毒飲

加地丁草通用

靈寶丹

見鬚疽

如意散

見腫瘍

清涼膏

三仙丹

見潰瘍

面發毒

面發毒在頰車成初起滋延似豆生腫破焮疼黃水盛症由風熱客陽明

涼膈散

涼膈散用石羔芩梔薄連翹淡竹尋更入朴硝相共用

欲攻須用大黃欽

薄荷 連翹 大黃 石羔 淡芩 黑梔 朴硝 竹葉  
荆防敗毒散 在表者用之 見腫瘍 青蛤散 見肥瘡

痄癰

痄癰胃熱是其端初起焮疼熱復寒高腫色紅風與熱  
皆緣溼熱共摧殘

柴胡葛根湯

表實用

柴葛湯中花粉甘連翹牛蒡石羔參升麻桔梗黃芩共  
邪隙陽明此合含

柴胡 升麻 連翹 桔梗 生草 葛根 花粉