

時
病
機



瘡門集方卷之十一

吳門邵登瀛步青輯

曾孫炳揚香泉纂述

元孫

景康景堯謹校

白虎加桂枝湯

桂枝 石膏 知母 粳米 甘草

此方治瘡太陽陽明合病寒熱交爭寒作則必戰動
經曰熱勝則動也發熱則必汗泄經曰汗出不愈知
爲熱也陽盛陰虛之症此湯主之

蜀漆散

蜀漆 雲母 龍骨

四時病機 卷十一
爲散漿水服一錢

吐瘧乃心經之瘧邪氣結伏心下心陽鬱遏瘧發寒
多熱少蜀漆爲常山苗輒取輕揚入重陽之界引拔
其邪和漿水服吐其心下結伏之邪雲母在土中蒸
地氣上升而爲雲故能入陰分逐邪外出於表然逐
邪涌吐恐內擾心主而亂神明故佐龍骨鎮心甯神
則吐法轉爲和法矣

桂枝石膏湯

桂枝 石膏 知母 黃芩

仲景以但熱不寒邪藏於心肺者爲溫痺二瘧白虎

加桂枝方義原在心營肺衛白虎湯清營分熱邪加桂枝引領石膏知母上行至肺從衛分泄熱使邪之鬱於表者頃刻致和而瘥已

五苓散

方見濕溫

五苓散太陽裏之下藥也太陽風寒麻桂汗而發之太陽暑濕五苓引而竭之故濕瘥寒熱身重煩疼脹滿者宜之

不換金正氣散

方見濕溫

平胃以鋤胃土之墩阜而水濕行佐以藿香一身之
滯氣皆宣助以半夏滿腹之痰涎盡化正勝則邪不
驅而自除

達原飲

常山 草果 厚樸 檳榔 青皮 石菖蒲

黃芩 知母 甘草

煎露一宿發後溫服

瘧發間日內經言邪氣內薄五臟橫連膜原其道遠
其氣深稽古無瘧邪犯膜原之方惟吳又可治疫初
犯膜原以達原飲爲主余因博採改定以治間瘧蓋

瘧邪內薄則邪不在表非但隨經上下其必橫連於膜深入於原矣膜爲鬲間之膜原爲鬲盲之原經又言邪氣各於腸胃之間膜原之下則膜原又有屬於腸胃者治以常山滌鬲膜之痰檳榔達盲原之氣草果厚樸溫除腸胃之濁邪黃芩知母清理腸胃之熱邪複以菖蒲透膜青皮達下甘草和中而瘧自解

草果飲

草果 川芎 白芷 蘇葉 青皮 陳皮

良薑 生薑 甘草

瘧又名痞疾其症不一初得病勢正熾一二發間未

宜遽截不問寒熱多少且服此方

露薑飲

生薑

和皮搗汁一碗夜晚露至曉空心冷服

此治脾胃聚痰發爲瘧疾蓋薑汁能開痰故也

三化丸

大黃 厚樸 枳實 羌活

三化者使三焦通利復其傳化之利也加羌活者症本於風也然中風多虛氣上逆無用承氣之理非堅實之體不可輕投

小柴胡湯

柴胡 黃芩 人參 甘草 半夏 生薑

大棗

方中加大黃此少陽而兼陽明也用以滌腸胃之邪
除嵐瘴之氣正與大柴胡相發明云
進而從陽加薑桂退而從陰加芩連

木香丸

木香 檳榔 青皮 陳皮 枳殼 黃柏

黃連 三稜 莪朮 香附 大黃 芒硝

牽牛

一方加當歸

此方入手足陽明濕熱在三焦氣分木香香附行氣之藥能通三焦解六鬱陳皮理上焦肺氣青皮平下焦肝氣枳殼寬腸而利氣而黑丑檳榔下氣之品最速者也氣行則無痞滿之患矣瘴癘由於濕熱鬱積氣血不利黃柏黃連燥濕清熱之藥三稜能破血中氣滯莪朮能破氣中血滯大黃芒硝血分之藥能除血中伏熱通行積滯並爲摧堅化痞之峻品亦通因通用之意加當歸者潤燥以和其血也

半夏 烏梅 丁香 巴豆

各十枚右爲末薑汁糊和丸麻子大每五丸臨臥
冷水下

此方治瘴瘧有人於海角遇白夜人授之因名焉
補中益氣湯

黃芪 人參 白朮 甘草 陳皮 當歸

升麻 柴胡 生薑 大棗

立齋曰凡人久瘧諸藥不效以補中益氣加半夏用
人參一兩煨薑五錢此不截之截也一服卽愈

二陳湯

半夏 陳皮 茯苓 甘草

方中加人參調和營衛加豆蔻溫暖脾胃俾正勝則痰消邪盡則瘥止

此足太陰陽明藥也半夏辛溫體滑性燥行水利痰爲君痰因氣滯氣順則痰降故以陳皮利氣痰由濕生濕去則痰消故以茯苓滲濕爲臣中不和則痰涎聚又以甘草和中補土爲佐也

參薑飲

人參 生薑

煎露一宿服之如神

景岳治久瘕正虛諸藥不效用之神驗一以固元一以散邪

何人飲

首烏 人參 當歸 煨薑 陳皮

氣血大虛久瘕不止宜此截之如神

休瘕飲

人參 白朮 甘草 首烏 當歸

陰陽水煎露一宿溫服陽虛多寒加附子肉桂乾薑陰虛多熱加生地麥冬知母黃芩如腎陰虛再加熟地枸杞如邪有未盡加柴胡桂枝生薑細辛

此止瘡最妙之劑也凡汗散既多元氣不復或以衰
老弱質而瘡有不能止者宜此化暴善後

四獸飲

人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 陳皮

草果 烏梅 生薑 大棗

此方治五臟氣虛七情兼并結聚痰飲與衛氣相搏
發爲瘡疾

桂枝加桂湯

桂枝 芍藥 甘草 生薑 大棗

桂枝湯太陽經藥本爲解肌明非發汗也桂枝行陽

白芍行陰甘草和中佐以薑棗散表泄營爲和方之祖湯名加桂加其分兩非在外再加肉桂也

人參附桂理中湯

治陽虛寒者加人參附子氣統神攝

人參

附子

肉桂

白朮

乾薑

甘草

一方照前去肉桂名參附理中湯

陽虛癰疾脉豁大空虛且寒不成寒熱不成熱氣結神揚此元陽衰脫之候此得之內虛所感受傷在少陰腎宜大振陽氣以敵虛邪參附薑桂芪朮要不可缺

十棗湯

芫花 甘遂 大戟 大棗

攻飲湯劑每以大棗緩甘遂大戟之性者欲其循行經隧不欲其竟走腸胃也故不名其方而名法曰十棗湯芫花之辛輕清入肺直從至高之分去鬱陳莖以甘遂大戟之苦佐大棗甘而泄者緩攻之則從心及脇之飲皆從二便出矣

四物湯

川芎 當歸 地黃 芍藥

物類也四者相類而仍各具一性各建一功並行不悖也芎歸入少陽主升地芍入厥陰主降川芎鬱者

達之當歸虛者補之地黃急者緩之芍藥實者瀉之
能使肝膽血調陰陽氣暢非他藥所能及

8
驚甲煎丸

驚甲 柴胡 桂枝 人參 芍藥 厚樸

丹皮 半夏 蟪蛄 蜂房 廕蟲 鼠婦

葶藶 大黃 赤硝 桃仁 烏扇 紫葳

乾薑 黃芩 阿膠 石葦 瞿麥

煨竈下灰清酒浸取汁着驚甲於中煮爛絞汁納
諸藥煎爲丸如桐子大每服七丸日進三服

久瘡邪去營衛而着臟腑卽非瘡母而正虛邪着非

彙集氣血之藥攻補兼施未易奏功此方和表裏則
有柴胡桂枝調營衛則有人參白芍厚樸達原劫去
其邪丹皮入陰提出其熱石葦開上焦之水瞿麥滌
下焦之水半夏和胃而通陰陽竈灰性溫走氣清酒
性緩走血其餘多用異類靈動之物如蜣螂動而性
升蜂房毒可引下麝蟲破血鼠婦走氣葶藶泄氣閉
大黃泄血閉赤硝軟堅桃仁破結烏扇降厥陽相火
紫葳破厥陰血結乾薑和陽退寒黃芩退熱和陰鱉
甲爲君者恐諸蟲擾動神明故取之以入裏守神阿
膠以達表熄風其泄厥陰陽明破癥瘕之功有非草