

湯醫大全

瘡醫大全卷二十九

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

癰癤部

自蛇虱烏癩癬癰起至濕痰流注止皆彙於此部中以便檢閱參治

蛇虱門主論

王肯堂曰蛇虱遍身起如風癬疥丹之狀其色白不痛但癢搔抓之起白疔柑葉一味煎水洗內服蠟礬丸

金銀皂角丸準繩

心法曰白疔俗名蛇虱生於皮膚形如疹疥色白而癢搔起白皮由風邪客於皮膚血燥不能榮養所致用猪油苦杏仁等分搗勻絹包擦

烏白癩門主論

王肯堂曰夫癩疾皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變黑或淫浮苦癢如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如桃李癰癬亦黑手足頑麻針刺不覺痛脚下頑麻不得踏地凡食之時開口出氣而鳴語亦如是身體生瘡痛癢而時如蟲行或兩肘如繩縛此名烏癩又有黑癩凡二癩之證大同小異故不別錄也繩準又曰白癩者其語聲嘶啞目視不明四肢頑痛身體大熱心中懊惱手足緩縱背脊拘急內如針刺或生癰癬而起往往正白在皮肉鼻有瘰肉目生白珠擋於瞳子視無所見名曰白癩也

陳實功曰癩風乃陽明濕熱沸騰於肌表或受風寒侵襲而成其患初起水泡作癢成瘡破流脂水癢至徹骨久則成片延及遍身好治熱湯形如風癩上體者汗解外毒下體者疏瀉內毒為王正宗

清錢之柏東陽同校

陳達公曰人一身發癩皮厚生瘡血出如疥或痛或癢或濕或乾似蟲非蟲人以為濕熱留於皮膚誰知乃氣血不能週到滋潤乎世多以苦參煎湯或稀蒼白芷外治不能奏效正成於氣血虛也夫氣血足則經絡無閉塞之虞氣血旺則毛竅無枯乾之患且氣足血旺則熱散濕消何至癢滯不通結於皮膚之外哉治法以補氣血為主佐以消濕散熱雖十載沉疴尚可奏功矧目前近癩乎用掃癩丹黃耆三兩當歸金銀花各二兩白朮茯苓麥冬白芍熟地玄參各一兩山萸川芎各五錢生甘草荆芥花粉各三錢防風二錢水煎服皮色即潤二劑乾燥解十劑全愈

市注機勃勃林滿平疇而墜補之類自消於無形矣

沈紫亮十四種癩證歌訣

心經火癩蟋蟀連

肝經木癩風屬偏

脾經上狗癩併屬

肺經金癩麵白兼

腎經水癩兩烏共

胃經酒麻癩總言

夫癩之為害較之風證稍輕然其致害之患一也但癩愈而形可復瘋愈則元氣難復癩死者少瘋死者多然皆非善證耳醫學要則

辨六經癩形

心經 火癩如灼之瘡大小不一或形如癬裂斷皮膚愈而復發乃心臟受毒病深七年方盛其蟋

蟀癩亦乃心經毒也

肝經 木癩初起似蝕癬狀大小不同形色不一或遍身高低不定俗呼為綿花癬

脾經 土癩或先發熱嘔吐身發黃腫即現瀰塊大如雞卵小如彈丸或麻木不仁穿即成瘡膿氣

臭穢難聞

肺經 金癩初發如楊梅瘡上無殼內泛碎肉凸起紫赤潰爛真如楊梅毒入肺經眉睫毛落二年
鼻梁崩倒眼塌唇翻乃金癩之驗若蠹魚生肺腑致生麵白細蟲舉體文白斑駁週身如癬儼然
泥壁風之狀外用薰洗則能取效白癩乃風寒暑濕之氣邪毒湊聚彌滿肺竅久則蟲蠹食肺管
所致

腎經 水癩必先得水病而停蓄又為風濕觸激或生在陰莖蝕於陰囊兩傍發腫塊橫痃寒熱交
作腫痛難忍漸大而潰變成爛瘡一年病劇眉髮墮落水癩之毒在腎濕久生蟲流注遍身則生
青黑赤紫斑駁以致陰莖痿癩皮穿肉爛膿血臭穢烏癩乃邪毒入腎蟲食精髓下虛不救若在
胸肋腸腿臂肋之間生核如桃李之狀穿爛臭惡或似漏瘡或如癰疹手足頑癬針刺不知此種
之症宜大補氣血

胃經 酒癩因醉卧汗出迎風邪入於胃所致似赤非赤似白非白大者如錢小者如豈此證最為
難治麻癩由酒毒留滯胃腑遍發瘡毒狀如疥癬痛癢難忍或手足發黑白頑癬形如雁來鵝掌
風之狀或發內痔頭硬而碎形如鱗頭遍體皆然觸之則大痛冷汗一時即愈
瘋與癩大同小異但癩輕而瘋重治癩之法可於瘋證門中諸方酌用

瘡癩門主論

王肯堂曰夫人陽氣外虛則多汗汗出當風風氣搏於肌肉與熱氣併則生瘡癩狀如麻豈甚者漸
大搔之則成瘡也

準繩

心法曰瘡癩俗名鬼飯疙瘩由汗出受風或露卧乘涼風邪多中表虛之人初起皮膚作癢次發扁
疙瘩形如豈瓣堆疊成片日間癢甚者宜秦艽牛蒡湯夜間癢甚者宜當歸飲子外用燒酒浸百部

以藍布蘸酒搓之謹避風涼

癬門主論

陳實功曰癬乃風熱濕蟲四者而成風宜散熱宜清濕宜滲蟲宜殺總由血燥風毒起於脾肺二經耳註又曰風癬如雲朵皮膚嫩嬌抓之則起白屑不知痛癢又曰濕癬如蟲形搔之則有汁出

又曰頑癬抓之全不知痛又曰牛皮癬頑硬且堅抓之如朽木又曰馬皮癬微癢白點相連

又曰狗皮癬白斑相簇時作微癢

周文采曰乾癬搔之則出白屑索然彫枯隸

又曰刀癬則輪廓全無縱橫不定

申斗垣曰白殼瘡即癬也啓立

王肯堂曰面上風癬初起瘡癰或漸成細瘡時作痛癢發於春月名曰花癬女人多生之此皆肺經

蘊積風熱陽氣上升發於面部或生眉目之間久而不愈恐成風疾準繩

蔣示吉曰上半身為頑癬治之易多屬風熱約說又曰陰癬生在下半身治之最難多屬寒濕總之

血分受病以致皮膚不和也

癬門主方

浮萍散 治風癬疥癩 當歸 川芎 荊芥 赤芍藥 甘草 浮萍七月十五日採取陰乾各一錢五分 麻黃

七分五厘夏月只用三分 加葱白二根豆豉五六十粒水煎熱服取汗 手臂加桂枝 背加羌活 膝加

牛膝薄桂

遍身風癬 防風 金銀花 片芩 山梔仁 生地黄 木通 川黃連 當歸 苦參各一錢

飛滑石 升麻各三錢 荊芥穗 香白芷各七錢 桔梗 生甘草各五錢 蟬蛻 皂針 牛蒡子各八錢

生薑片穿山甲片四

水二鍾煎八分食遠服

未服藥先一日用茄子藤連根葉煎水薰洗將癬

擦透次日服藥三劑除根

濕熱生癬

乾淨淨而蒼耳子

蒼朮

苦參各一兩

黃芩錢五

香附米二錢五分

酒糊丸上身多食後

服下身多食前服白湯送下三錢

搗癬

土槿皮

兩斑貓二鷄心檳榔三個番木鱉四個

火酒半觔浸一伏時蘸搗癬上忌大蒜火酒

又方

硫黃

輕粉各等

研勻蜜調搗

又方

大棗一枚去核入白砒三分泥裏煨透冷定去泥

研細香油調搗

又方

土槿皮研細醋調搗

以

紙蓋之

又方

商陸根蘸蜜搽之

又方

土槿皮研細粗夏布色紫浸火酒一伏時搽之

又方

土槿皮研細醋調搗

以

又方

虎菜根蘸人乳搽之

又方

白降丹三錢輕粉六錢醋調搽之

又方

土槿皮研細醋調搽之

又方

土槿皮研細醋調搽之

又方

土槿皮研細醋調搽之

又方

土槿皮研細醋調搽之

梗

枯白礬飛水

共搗麻布包紫蘸醋搽之

又方

白砒

硫黃

罐口各等

入杓內化開

將地下挖一孔將藥傾入冷定取出米醋磨敷

又方

硫黃錢三枯礬錢三白芷錢三斑貓三個去

研勻抓破搽之

又方

為度取出研細抓破搽之

又方

牛舌草即土大黃白微

棟樹皮各一

冰片

甘草錢各一

輕粉

共研細用荔枝核將癬抓破真麻油調搽

又方

皂礬炒研猪胆汁

調搗

又方

生天南星生草烏各等分研細用土大黃汁調搗

之

又方

蛇床子

藁本

尖檳榔

硫黃

枯礬

白膠香

五梧子各等

研細乾癬香

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮三兩明雄黃

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮

三兩

明雄黃

水銀錢二

潮腦錢一

檳榔七個

麝香一分

研細乾癬香

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮三兩明雄黃

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮

三兩

明雄黃

水銀錢二

潮腦錢一

檳榔七個

麝香一分

研細乾癬香

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮三兩明雄黃

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮

三兩

明雄黃

水銀錢二

潮腦錢一

檳榔七個

麝香一分

研細乾癬香

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮三兩明雄黃

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮

三兩

明雄黃

水銀錢二

潮腦錢一

檳榔七個

麝香一分

研細乾癬香

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮三兩明雄黃

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮

三兩

明雄黃

水銀錢二

潮腦錢一

檳榔七個

麝香一分

研細乾癬香

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮三兩明雄黃

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮

三兩

明雄黃

水銀錢二

潮腦錢一

檳榔七個

麝香一分

研細乾癬香

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮三兩明雄黃

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮

三兩

明雄黃

水銀錢二

潮腦錢一

檳榔七個

麝香一分

研細乾癬香

油調搽濕癬乾癬頑癬醋調搽

又方

土槿皮三兩明雄黃

大楓子 斑猫 木鱉子各七枚 研細入火酒酌半封一七蘸搓

百部膏 治牛皮癬 百部 白癬皮 鶴虱 蓖麻仁 生地黃 黃柏 全當歸各一 蘇油

半觔入藥熬枯去渣復熬至滴水成珠再下黃蠟二兩試水不散為度拿起鍋入雄黃末和勻稍

冷傾入磁鉢中收貯退火氣聽用

三十五年頑癬 鐵線粉出廣西要對換 海金沙 冰片 麝香末各等 生薑蘸擦 又方 枯白礬七

分血丹三分研勻土大黃根同搗搓 又方 土槿皮三兩 公檳榔一兩 不見火曬乾磨細用好滴

醋調如薄糊隔水蒸一炷香取出敷患處棉紙蓋上二三次即愈 又方 生白朮三兩 土槿皮一兩

錢五 不見火曬乾為末滴醋調搓三次必愈 又方 先用生薑汁搓再用柏油搓

頑癬陰癬 土槿皮二兩 斑猫十四枚 明雄黃 硼砂各六錢 火酒二觔浸三日搓之

項上耳傍濕癬 蘆薈一兩 甘草五錢 研極細先將癬以溫水洗淨拭乾搓之

厚牛皮癬 全蝎卅粒 芭豆二十粒 斑猫十枚 蘇油一兩 黃蠟一錢 先將芭蝎斑猫入油熬黃焦色去藥取油

如油少可加麻油煉滾投蠟鎔化收貯擦之 又方 土地黃根搗爛和蜜擦癬

頑癬 大公蝦一個取蝦大爪扒破癬見血路為度即以蝦腦塗之二次即消

陰癬 生明礬 熟明礬各一錢 輕粉二錢 銀硝三錢 研細用土地黃根搗爛布包蘸藥末擦之

頭項以上癬 用傾過銀子的銀罐子大小二個盛硫黃一兩於大罐內以小罐覆住文武火煨俟

火焰高罐上一寸約一鍾茶時取出冷定取上覆罐研為細末用柏油猪骨髓調勻將癬用刀剝

破搓上一伏時愈 又方 早浮萍草生擦癬覺疼起泡挑破再擦三日不見水結疤永不再發

又方 硫黃細末拌生猪油熬熟將癬扒破搓擦自愈

治癬碧玉散 銅綠礬砂白礬各等分研勻香油調搗

岐天師神方秘錄 棟樹皮 大楓子 潮腦各三錢 水銀 硫黃 花椒 炒木鱉子 明雄黃 蟬

蛻 木通各二錢 全蝎二錢 土槿皮四錢 斑貓 公槿榔各七錢 皮硝五錢 用火酒三四觔浸十日擦之

又方 蘆薈 輕粉 雄黃各一錢 大黃 蛇床子 土槿皮各三錢 檳榔二錢 研末先將癬刮破以

米醋調搗

頭面荷葉癬 川槿皮研細醋調湯頓如膠將癬抓破搗之

白礬散 遍身生癬日久不愈延至頭面 獨莖羊蹄根渴細白礬研細以極酸米醋調抓破搗癬

隔日再搗不過兩次即愈 又方 紫蘇 潮腦 蒼耳草 浮萍 煎湯洗癬

牛皮血癬 舊銀罐一個露蜂房五錢 枯礬二錢 研細香油調搗

年久陰癬數日除根 土槿皮五錢 露水 鏡面燒酒各四錢 同浸七日抓破癬皮用新羊毛筆塗之

每日數次

千金方孫真人 以日午時立日光下人影有癬處著艾炙之點艾時念咒 呪曰癬中蟲毛戎戎

若欲治待日中 一氣唸三遍俟艾火過添火再唸再灸如此三遍三炷即愈

癬瘡延蔓東坡家藏 決明子研細 水銀 輕粉各少許 再和研不見水銀星為度刮破上藥立瘥

又方 銅青 雄黃 斑貓各等 研勻無根水調敷起泡刺破柏燭油搗潔淨不發 又方

杜黃連即羊蹄根一握洗淨搗濃汁 白梅數枚去核 同汁搗爛用穿山甲刮破搗數次即愈

荷葉癬古方 田螺一個開壓入信石二分待肉化水搗上即愈

牛皮癬及多年頑癬 紅粉霜五錢即明礬紅昇丹 杏仁去油 川槿皮各一錢 密陀僧三錢 共研細津調搗

一日三次三日全愈 又方 牛皮燒灰油調搗

牛皮血癬 古仙方 硫黃 硫黃分白硫黃分白硫黃分白 硫黃 硫黃分白硫黃分白 研細茶油調搗

頑癬 秘方 白砒 白砒分硫黃分白硫黃分白 研細茶油調搗

楊梅癬 枯白礬 硫黃 硫黃各一兩 雄黃 膽礬 輕粉 輕粉各一兩 川椒 川椒各一兩 研細用生豬板油去皮入藥

擦破數次其效如神

楊梅癬 硃砂 雄黃 沒藥 沒藥油乳香油免茶各一 杏仁 杏仁各一 大楓肉 大楓肉各一 搗爛絹包擦之

鵝掌瘋癬 秘錄 川烏 草烏 何首烏 花粉 赤芍藥 防風 荊芥 蒼朮 地丁 地丁各一

艾葉 艾葉各一 煎湯先薰後洗層層起皮痛癢自愈

圈子癬 集驗 穀樹皮剪如癬樣大小以毛背一面用唾貼癬上以手不時撲之即愈

癬方 硫黃 木炭灰 木炭灰各等 共為極細末將癬用穿山甲刮破擦上數次愈 又方 馬蹄決明

子一兩為末入水銀輕粉少許研不見水銀星為度將癬刮破擦上立愈 又方 馬蜂窩一個

仰放瓦上以枯礬填滿孔內炭火炙焦研末用蠟醋腳調塗即愈

陰癬 鮮旱蓮草揉成團用穿山甲將癬刮破擦癬上奇驗

渾身癬 羊蹄根搗汁入墨盆內將白芨磨濃汁搗之 又方 鉛一兩煎水日洗數次即愈

川槿皮錠 劉長 治一切癬如神 烏梅肉 烏梅肉半兩用羊蹄根汁浸一夜次日重湯燉一 加番打麻

兩海螵蛸 五錢 入烏梅肉又搗勻稱過每一兩加白降丹 白降丹各一 白砒 白砒各一 再搗勻入白芨細末一錢又

搗勻做成二三錢重的錠子陰乾收貯凡用以羊蹄根同醋磨濃搗之

癬方 胡繡粉 土荆皮 土荆皮三尖 檳榔 斑猫 斑猫去頭足 大楓子 木鱉子 木鱉子各七 巴豆仁 巴豆仁各五 雄黃 潮腦

川烏

白鮮皮

草烏

各二錢 麝香分

火酒二觔半同入小口瓶內封口浸七日將癬刮破搓之

頑癬

黑鉛一錢鎔化離火入水銀一錢研為極細末加真輕粉潮腦各一錢和勻再研細取牛舌

草根去土淨搗自然汁和勻再用穿山甲將癬刮破敷上出盡血水為度癢時則頻頻搓之搓時

微痛勿懼

頑癬 膝瘡及湯火傷

或惟章

真川鉛粉

銀硃

各五麝香分

右為末用鵝油搥和如泥用油紙

一長條將半段用針刺孔攤膏合轉來將光面貼癬絹帕縛緊二三日一換夏月早晚換

牛皮癬

穿舊牛皮靴鞋底上皮陰陽瓦煨存性研細將癬刮破擦之

癬

雞蛋一個開一小孔去白存黃入硫黃川椒末各三錢將濕紙封固灰火內煨熟為末先以藤

線將癬刮破用穀樹漿或羊蹄根汁調搓

又方 多年竹燈掛一個火上烤出汁如膠者另將

五倍子

炒去蟲

為末和勻用陳醋在火上溫熱調搓

頑癬

硫黃

火硝 白砒 各一

先將硫黃入銀罐內化開再入硝砒末攪勻傾入土內埋七日

搓三五次

癬

雷公藤

分五大楓肉

防風

各一錢

土槿皮

蚯蚓糞

牛舌草根

各三錢

共為末陳醋調搓

牛皮癬

桃樹根同膽礬搗爛敷

癬

生臉上如錢大抓之有白屑者

萊豆種碎以紙糊碗口上針戳多孔以碎豆鋪紙上放紅炭

一塊架豈上俟豈灼盡紙將焦去豆揭紙碗中有水取搓三五次

老癬

輕粉

雄黃

黃丹

銀硃

各等

研細用米醋浸大黃夏布包蘸藥擦之

陰癬

鹽內皂角擦之

燦癬 水銀 胡粉 研蛋清調搗 又方 雄雞冠血塗 又方 胡粉妙色醋調塗 又方

搗桃樹白皮醋和塗

濕癬 石硫黃研用三年陳醋調敷 又方 蛇床子 黃柏 黃連 胡粉各一 研細入水銀

一棗子大和猪油研勻塗之 又方 用粗碗一隻以皮紙用針戳眼糊碗口上以水潮紙上令

濕將杉木屑堆潮紙碗上用火點著俟杉木屑燒盡輕輕掃去屑灰揭開紙看碗中杉木油取搗

癬上必效

癩癬門王論

孫真人論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則為癢也所以有風疹癢癢皆由於此又有赤疹者忽然起如蚊蟲咬煩癢極者重抓疹起癢之逐手起又有白疹者發冷亦有赤疹蓋赤疹者發熱

王肯堂曰夫風癰疹者由邪氣客於皮膚復遇風寒相搏則為癰疹若赤疹者由冷濕搏於肌中風熱結成赤疹也遇熱則極若冷則瘥也白疹者由於風氣搏於肌中風冷結為白疹也遇冷則極或風中亦極得晴明則瘥著厚煖衣亦瘥也其脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏則為癰疹致

身體為癢也 準繩

朱丹溪曰疹屬熱與痰在肺宜清肺火降痰或解散出汗亦有可下也 心法

方論皆謂緣肌中有濕若涼熱之氣所折熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相搏則成白疹赤疹得熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱於內故惡熱宜冷白疹得陰雨則甚得晴則消蓋熱氣散釋於外故惡冷宜熱熱搏於血分其邪因併發於表則赤若風濕搏於氣分則氣脈不行因邪併發於表

則白夫如是然後於治法相應邪熱者故惡熱而喜涼邪濕者故惡雨而喜晴矣方論中又有風痞
癰者即內經所謂汗出見濕乃生痙痺又曰勞汗當風寒薄為鬱乃痙痺即癰疹屬也故痞癰類也
此皆謂外邪鬱肌肉玄府之熱者矣然則與內經言少陽少陰而君相二火客熱之勝為丹疹外發
者方論中則無有也故人氣君相二火鬱發而變者宜乎未之及耳若此條是人氣所變之一者也
故二火鬱發出血氣之表與外邪所鬱無異更有小兒發痘瘡之外必有出疹二次亦是君相二火
發出未盡之胎毒也 又曰癰疹入腹亦能殺人 宜用蠶砂煎濃湯洗之 又曰癰疹熱多則色赤風多則色
白甚者癢痛搔之則成瘡也

林氏曰或問斑疹因何而生屬陰屬陽屬虛屬實屬表屬裏可得聞其詳乎答曰斑疹之發有外感
風熱者有胃腑實熱為病者有傷寒失下者有傷寒陽明經證失汗發衄不衄則發頤不生頤則發
斑疹者總屬陽明胃與大腸之風熱亢盛已極內不得疎泄外不得透達怫鬱於皮毛腠理之間輕
則為疹重則為斑一如火乘金位金受火尅之故此乃陽毒屬表屬實之斑疹也有陰虛血熱者有
陽虛血熱者有氣血兩虛而虛熱鬱盛者此三焦無根之火乘氣血之虛而空發於上怫鬱於皮毛
血脈之中內不得清外不得散遂發斑疹乃陰虛屬裏之證也 活人錄 又曰或問何以為斑何以為

疹陰陽既別何者為重何者為輕答曰斑者成片不分顆粒一如雲朵拱起淡紅者輕紫紅者重黑
者凶輕者癢而重者痛疹者如痂瘡或類蚊跡蚤虱痕而不盛一日之中起伏隱現不常隱隱見於
肌膚之間不大起發者是大約陽證斑疹易看而易治陰證斑疹挾虛而發難看而難治苟不細審
則陰證誤以為陽立至危殆可不慎歟 又曰身熱無汗煩渴躁悶或痛或癢如雲若錦腹病胸滿
二便秘結六脈浮洪有力或浮數有力者係手陽明大腸足陽明胃二經風熱為病所謂陽斑也若

內熱自汗渴不欲飲心煩身躁胃弱脾泄喜濕惡熱色白而不紅但癢而不痛六脈遲緩微弱或虛數無力者手太陰肺足太陰脾手少陰心足少陰腎經之陰火內亢為病所謂陰斑也疹雖與斑異而致病之因受病之臟腑及所現之脈與形證無不同蓋斑有陰陽則疹亦有陰陽自在醫者審其證之陰陽虛實脈之無力有力可也 又曰兩陽合明其火自盛兼有食積致生積熱故斑疹之因必歸過於胃與大腸也火盛則血熱而金燥蓋心為火臟主血脈肺為金臟主皮毛火聚胸中肺受薰蒸心火愈熾或熱極反兼風化或客風鼓動內火其病發於心肺二經所謂陽斑陽疹必先清散風熱於表疎導積熱於內表裏和解以救炎炎之勢如二便秘結急宜利之若脾腎之陰虛火盛不能歸經固藏發越於上而心肺受其薰灼而病亦有因風致火或因熱極生風而發所謂陰斑陰疹初則亦宜清解使其透發寬其胸膈解其煩躁次則察脈之大小虛實脾胃之實與不實大便之結與不結或清補或溫補 又曰雖陰陽俱有斑疹而陽證發斑者多且多發於熱病之末陰證則發疹者多發於病之始蓋斑由積熱發之稍緩疹兼風火發之尤速發之速者禍輕發之緩者其禍反深則又天下事理必然之勢也至於時氣發疹由風熱之邪乘於肺經必兼鼻塞氣粗痰嗽餘熱不清遺於陽明大腸并其糟粕蘊積而為濕熱更成積滯自利甚至熱鬱化火火性急迫隨氣滯下而後重不舒者宜用辛涼升散之劑清其邪熱使鬱陷之氣透達外解不惟斑疹自消而濕熱亦散矣若痰嗽不清加以清火消痰之藥積滯有餘濕熱下迫加以分清利濁健運化導之劑如木香黃連山查神曲車前澤瀉之類更用枳殼寬胸開鬱升提鬱陷之邪 風濕鬱於腸胃風熱逆於肌表傷於血分則憎寒壯熱胸中嘈雜肚腹疼痛發為赤疹傷於氣分發為白疹俱令瘙癢無度一日三現三隱俗名風絡疹即此是也第一宜忌香油蝦鮮麵食並戒酸鹹倘不知禁戒輕則成瘡甚則不時

舉發致成終身之累治當疏風散熱托疹為主

癰疹門主方

通治陽證斑疹主方 活人錄

生地 三錢 防風 錢 荊芥 各五分 川黃連 錢 犀角屑 錢 牡丹皮 各五分 黃芩

桔梗 各一錢 甘草 三錢

水煎不拘時服 肺中伏火必先清涼血分以開鬱結犀角清心家之熱毒而丹皮佐之甘草連瀉心

荊防用以解散內外之風邪 外感重者加羌活一錢以開鬱結犀角清心家之熱毒而丹皮佐之甘草連瀉心

胃家熱毒煩躁熱渴無汗背寒斑疹黑紫色者連加石膏一兩連翹一錢五分去玄參一錢犀角五分

分去防風桔梗 傷寒邪熱入胃舌胎黃黑有刺二便不通諸語狂熱者加大黃五錢芒硝三錢

枳實二錢去生地 防風丹皮 傷寒陽明失表煩渴外熱半表半裏大便秘結下症者加乾葛

三錢牛蒡子二錢玄參一錢五分 薄荷一錢去生地丹皮黃連犀角

通治陰證斑疹主方 白朮 錢 白茯苓 各五分 人參 錢 炮薑 各一錢 陳皮 錢 炙甘草 錢 防風 各五分 肉桂 三錢

水煎早晚空心服 右方乃治陽虛血熱及氣熱血熱凡惡寒喜熱二便清利口不乾而反欲熱飲

有風熱之變也 六脈沉微細數或虛數無神者宜之此氣虛不能統運血脈致血久鬱生熱而

腎水不足龍火無制陡發越於上心肺受其薰逼而成斑疹者 八味地黃湯導火歸原兼服腎氣

丸 生地 三錢 製首烏 二錢 當歸 錢 乾葛 各五分 秦艽 錢 丹皮 錢 甘菊 錢 荊芥 各一錢 薄荷 五分 甘草 三錢

水煎午後臨睡服

遍身風疹作癢 生芝麻研碎擦之 又方 過年貼過掛絡擦之 又 鹽蒲包煎湯洗之

風疹不時舉發 真麻油 燒酒 各半杯 和勻燉熱發時服之再不發矣

葡萄疫門王論

陳實功曰葡萄疫乃小兒感受四時不正之氣鬱於皮膚不散結成大小青紫斑點色若葡萄發在偏體頭面乃為腑證自無表裏如邪毒傳胃牙根出血久則虛人斑方漸退初起宜服羚羊角湯清熱涼血久當滋益其內又有牙根腐爛者人中白散主之正宗
心法曰此證惟腿脛居多

葡萄疫門主方

羚羊角散正宗 羚羊角 防風 麥門冬 玄參 知母 牛蒡子 黃芩 枳殼 生甘草 淡竹

葉十片水二鍾煎六分食遠服

胃脾湯正宗 北五味 白朮 遠志肉 陳皮 沙參 麥門冬 茯苓 生甘草 水二鍾

煎六分食遠服 如虛弱自汗者去沙參加人參黃耆各五分

非瘡散 治葡萄疫攻牙腐爛 五倍子炒茶 人中白一兩 冰片四分 研細用米泔水漱淨吹

濕痰流注門主論

陳實功曰流者行也注者住也由其痰癰其形漫腫無頭皮色不變所發毋論穴道隨處可生皆緣榮氣不從逆於肉裏如風寒相中表證發散未盡者散之房慾之後陰虛外寒所侵者溫之惱怒傷肝鬱結傷脾者歸脾湯加青皮香附散之跌撲損傷瘀血凝滯者和血湯逐之產後惡露未盡流注經絡而成者木香流氣飲導之如不得內消者法當大養氣血培助脾胃溫煖經絡通行關節十全大補湯加熟附子香附主之如膿已成宜急開之正宗

王肯堂曰不串流者俗曰馬瘰 串流者名曰走散流注俗曰瓜藤馬瘰 遍身骨節內疼痛不能起坐無堆作熱不退者名曰啣骨馬瘰 若脊骨及髀骨上起堆或一二個或三五個名曰過脊馬

疽。若尾骶骨上起堆作熱者名曰殺腎馬疽。若髀骨下痛甚無堆但腫者名曰鎖腳馬疽。若骨相交接之處疼痛無堆微腫名曰接骨馬疽。此證因風熱走散四肢治當疎風散熱初起不可用火針烙之腫勢盛者只宜刺以稜針久熱者可火針烙之流注入股者死。綱又曰禁用寒涼剋伐內消等劑。

汪省之曰夫流者行也乃氣血之壯自無停息之機注者住也因氣血之衰有凝滯之患故行者由其自然住者由於瘀壅凡得此者多生於體虛之人勤勞之輩不慎調燮夏秋露臥縱意取涼熱體當風或中風邪發散未盡或慾後陰虛外寒所侵又或惱怒傷肝鬱結傷脾榮氣不從逆於肉裏又或跌打損傷瘀血凝滯或產後惡露未盡流縮經絡皆成斯疾也初起外以琥珀膏敷貼內服行氣活血之劑其中十可消其五六如不得內消者法當大養氣血培助脾胃溫煖經絡通行關節如木香流氣飲十全大補湯俱加熟附子香附培助根本原未成自消已成自潰已潰自斂不致殘敗破漏不斂之證且如有膿宜急開之忌用寒涼剋伐內消等藥犯此終致不救者多矣。理例

朱丹溪曰凡人身上中下有塊者是痰然痰在皮裏膜外則遍體遊行腫而色白滯而不痛宜導達疎利如痰因火動而走則體多小塊色紅痛甚流走無定宜解毒清火為主。又曰痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不能通痰在脇下非白芥子不能達白芥子亦能散皮裏膜外之痰氣竹瀝滑痰非薑汁不能行經絡痰在四肢非竹瀝不開。

申斗垣曰三陽經傷寒發汗不透則必痛腫久則腫腫久則必為熱熱久則破壞此名陽濕痰破瘡如三陰經失汗汗鬱成痰則痛腫久則皮色不變而腫至夜痛反甚其痛處冰冷脈亦沉細日久氣血凝注則肌死肌死則破壞腐臭名曰陰濕痰破瘡均宜灸熅。又曰冷流注多附骨硬不消骨

寒而痛筋縮不能伸屈庸俗誤用刀針又無膿血止有如屋漏汁或瘀黑血宜用回陽王龍膏如稍緩再加軍薑肉桂白芷草烏等分熱酒調敷則骨寒除而痛自止氣溫和而筋自伸肉亦軟而腫自消亦不可無石菖蒲以其性能破堅散腫最妙亦不可多多則解羣藥性也 又曰流注首尾數冲和膏最穩加乳香沒藥治流注筋不能伸敷之極效 又曰走散流注發因受寒凍凝滯血脈而成一名流注傷寒又名爪藤發背患生於背遍身皆有之經云傷寒流注尚猶可流注傷寒急如火醫者當察其寒熱虛實治之

胡公弼曰流注又曰走注狀似蠶形毒因風感而生熱氣因熱感而走散午前宜四君子湯加芎歸午後宜四物湯加參耆麥冬止五味斷不可用滲利流氣等藥黃青 又曰治流注大法鬱者開之怒者平之閃撲及產後瘀血者散之傷寒餘邪者調解之大要以固元氣為主佐以現證之藥 又曰流注一個要表汗一次如流注三個要表汗三次毒自消矣設治之不早深為大害 又曰如破潰成膿者先用降藥降去敗肉腐盡生肌可也

醫林集要云白虎飛尸留連週期或展轉數歲冷毒朽骨出盡自愈若附骨腐者可痊正骨腐者則為終身廢疾矣 又曰又有結核在項腋或兩乳傍或兩胯軟肉處名為瘰癧癰屬冷症也又有小兒疳積失導致結核於頸項臂膊胸背之處亦冷症也並宜熱藥敷貼

王西園曰流痰胸腹流於四肢者可治四肢流入胸腹者難治

心法曰流注新發漫腫無頭皮色不變凝結日久微熱漸痛透紅一點方是膿熟即宜用針開破若濕痰化成者膿色黏白若瘀血化成者膿色金黃黏水若風濕化成者膿色白稀如豈汁若汗後餘邪化成者膿色或黃或黑稀膿臭穢以上四證發於肉厚處可愈發在骨節及骨空處難痊若注慾