

右為未每服三茶匙黃酒調服

瓊花散

開陽花

洗淨焙乾

為未每服三五分黃酒調服隨飲

至醉為度蓋臥避風

接骨金丹 亦可代杖

土鱉

陰乾聽用另加

乳香

沒藥

龍骨

自然銅

煅醋碎七次等分

射香

少許

共為未每服三分取土鱉箇為未加入和勻黃

酒調服先須整骨而後服之否則骨接錯矣

一用土鱉

象房者佳

倒碓重

俱銀碓內炙各為末

每服用鱉未

古雪堂藏板

五厘虫末二厘共七厘和勻安舌下急以黃酒送下 一只用鱉末五七厘燒酒下

截血膏

敷傷處四圍能化血破瘀止痛消腫

天花粉

三兩

姜黃

赤芍

白芷

各一兩

右爲末用茶清調敷如傷頭面血出不止者藥塗頸上周圍傷手足者藥塗脛臂周圍傷餘處藥塗瘡口周圍能截其血不來 如金瘡着水

則瘡口如番花者用韭菜汁調敷瘡口四圍次以微火炙之又用旱稻煙薰之瘡口水出卽愈如無水出卽風襲也倍加南星和敷 如瘡口

肉硬不消者風裏之也加獨活用熱酒調敷如
不消風入深也加紫金皮和款自消

跌損瘀血淋漓者嚼三七罨之卽止青腫卽消

整骨麻藥 可以整骨可以開取箭頭

川烏 草烏 佛茄子 鬧楊花

麻黃 姜黃 等分

右爲末每服三分茶酒任下甘草湯解

又整骨方

蟬酥 川烏 花椒 胡椒 各一錢五分

草撥 一錢 鬧楊花 生半夏 各六分

爲末每服半分黃酒下 要開大加白酒藥一

丸塗患處亦佳

四物湯

四君子湯

六君子湯

十全大補湯

補中益氣湯

俱見首卷

加味逍遙散

見癰瘰

重者折骨傷筋脫臼必兼手法此則只有耑門故

不贅

金瘡

金瘡者失血症也如出血太多脉宜虛細爲症脉合

符故云脉沉小者生浮大者死宜八珍湯十全大

補湯補之甚者獨參湯素有熱者兼以涼血因於

怒者兼以清肝再煩渴昏瞶者補脾筋骨拘攣者

滋腎 初傷出血卽以自已小便淋洗之如傷久

欲換敷藥者亦以小便淋洗之功能止痛不潰卽

見水無碍次用碧螺散黃龍等散摻之如傷久潰

爛者七真膏貼之久爛生蛆者礬紅末摻之血出

作痛者活血定痛湯破傷風肢厥腹痛者古

方玉貞散

金瘡神効散

文蛤

降真香

俱炒焦
虛加

人參

等分

右爲末乾摻傷處須扎緊

雞兒王家刀瘡藥

龍骨

白芨

等分

爲末摻之乾用水調

碧螺散

絲瓜

取皮搭於石
灰牆上陰乾

爲末乾摻乾用水調如經風

見水傷處發腫者水調敷之其腫立消

二龍散

補缺唇救自刎血流如注者敷三時則合口

枯礬

七錢

乳香

三錢

共末名白龍散

枯礬

七錢

松香

三錢

共末名黃龍散

活血定痛湯

治血出作痛

紅花

乳香

各三錢

水酒煎加重便服

烏金丸

治四瘀爲患傷處赤腫或攻頭面四肢者

每用一丸煎紅花酒化服

敗弩筋散

治筋被弓弩傷不能屈伸者

敗弩筋

燒存性

秦艽

去苗

杜仲

熟地

續斷

各五錢

當歸

大附子

炮去皮臍各一兩

共為末每服二錢溫酒調服日三次

古方玉貞散

理刃傷并破傷風

生南星

防風

等分

為末每服一錢黃酒下

一童被牛傷腸出用桑皮線縫之黃龍散敷之

愈數日後肢厥腹痛服此散立驗

金瘡中風掣痛并手足不仁者用艾葉揉作團入瓦

器內點着上蓋留一孔以孔對患處薰之良久

自効

瘡口着水肉如番花者着風肉硬不消者用截

血膏敷之

見跌撲門

螻蛄散

治中矢在咽喉胸膈不出者鉛子入肉不出者針誤刺肉不出者

用螻蛄一箇焙爲末黃酒調服少時作痒自動自出再用螻蛄末香油調塗瘡口或煎濃汁滴患處如鮮者取腦塗之立出

衣針入腹入肉者用黃蠟靈磁石等分溶合撚如針大以涼水送下藥裹針自大便而下

酸棗核數十枚煎湯服針從原孔出外以雙仁

杏仁研如泥以車脂調塗傷處自出 綉針刺

足針以出而作痛者用黃泥罨之

砲刃等傷危重幾絕者急剖水牛腹將傷者入

腹中良久卽甦按此以氣血補氣血之良法也

業醫者守一定之方而治無窮之病愧矣

八珍湯

十全大補湯 見首卷

七真膏 見杖傷門

烏金丸

杖傷

杖傷形傷症也凡未杖之時用受杖丹等服之能令

血不攻心已杖後不問已破未破卽服瓊液散力

能化瘀除疔止痛消腫而不潰且易於結痂功勝
他藥多矣氣質弱者繼之大補以培其元使脾胃
健自能營達於下也外則未破者砭之已破者玄
珠膏塗之去瘀甚速次以瑩玉膏七真膏等生肌
如肉滿而不生皮者青黛珍珠散如刑重肉糜黯
腫昏憤者剥黑羊皮乘熱貼之熱童便灌之繼以
獨參湯補之

代杖散

野紅花

卽小薊
半觔

用燒酒四觔半浸之晒之以乾

爲度臨刑時絹句

二錢含口內嚙其汁任

刑不
知痛

代杖湯

臨刑時先服

土鱉

五箇焙

蘇木

乳香

沒藥

各二錢

木耳

川山甲

丹皮

枳殼

蒲黃

歸尾

木通

甘草

各二錢

酒水煎服

如不受杖服靛花水二鍾解之

代杖丹

治情不由已事出不虞受害一身重刑難

免當預服之受刑可忍能保血不攻心

乳香

沒藥

無名異

地龍

去土

木鱉子

丁香

丹皮

肉桂

自然銅

煨醋碎七次等分一

蘇木

右爲末煉蜜爲丸二錢重臨刑時預服一九黃

酒化下

椒鱉丸 初杖服之散血消腫輕者不用

胡椒二兩 土鱉三十箇 歸尾一兩五錢 木耳灰一兩五錢

乳香 沒藥 杏仁 桃仁

髮灰 血竭各三錢八分 自然銅醋碎七分

右爲末另用胡椒兩半煮汁打糊爲丸桐子大每

責十板服藥二錢熱酒送下

七真膏

乳香去油 沒藥去油 三七焙 輕粉

兒茶

各三錢

射香

四分

冰片

三分

右爲末確收聽用遇杖者勿經湯水用白蜜調敷疔自化瘰癧自散只此一敷不須再換

六真膏

治一切刑傷各樣癰疽

乳香

沒藥

血竭

三七

兒茶

各三錢

樟冰

三兩

猪脂

十二兩

碗盛水煮化入藥和勻攤敷

瑩玉膏

治杖傷消癰定痛亦治癰瘡

猪脂油

三兩

白蠟

一兩溶化
離火入

樟冰

一兩

輕粉

五錢

冰片

三分

射香

二分

銀硃

五錢

古雪堂藏板

爲末加入和勻收用

黃白散 洗杖瘡

大黃

白芷

各兩許

水煎濃汁搽洗傷處以痒至痛痛至痒瘀散見紅爲度拭乾貼藥

一用葱薑各四兩杵爛搽去血水次貼藥

瓊液散

見夾傷

青黛珍散

玄珠膏

俱見首卷

夾傷

夾傷者禁用敷藥膏藥及泥塗等法後必作腫成膿未受刑時預服代杖丹以護心已夾後隨用銀硃

或硃砂末用燒酒調敷傷處用一人以十指尖輕
啄患者脚底先覺痒次覺痛爲止再用一二人以
筆管於患者脚面上輕輕趕之助通血脉候傷處
凹者突起四圍腫大爲度卽服瓊液散隨飲至醉
爲度次日去敷藥只用洗藥日盪三二次次日再
服瓊液散則腫易消痛易止矣如復受重刑以至
破潰者貼瓊液膏服代杖湯弱者繼之大補使氣
血壯自能營達於下則易於收功生肌時易貼六
真膏甚捷

瓊液散

治夾傷撥傷杖傷跌傷并寒濕筋骨疼痛

開楊花

擇去梗蒂葢葉洗去灰沙曬乾砂鍋內微焙

爲末每服五分壯者七分先飲酒至半酣次服藥再飲至大醉爲度靜臥勿語語則發麻次日午時其麻方解消腫止疼其功甚捷連服三次全愈弱者間一日再服

洗杖傷方

夾傷腫痛用此洗之

透骨草

天門冬

天靈蓋

南星

地骨皮

陳皮

等分

象皮

切碎倍用

水煎浸洗日三二次

瓊液膏

夾撥所傷立能止疼活瘀