

醫學秘奧
四

蒼朮

米泔浸三夕七
夕瓦上炒紫色

黃柏

二夕三夕
汁炒乾

葱

白水煎服之或爲末作丸亦可

目疾

羊膽一枚割開入蜂蜜一錢線扎緊兩手揉

勻水煮一滾卽取出冷水浸半日后用点眼疾

羊胆

百草之精蜂蜜百花之
蘊此爲二百樣草頭方

耳聾

甘草一塊削豆大紅綿包甘遂一塊豆大白綿包

日夜輪換塞耳

又方

吸鐵石

一夕五夕

射香

二夕

研末化黃蠟爲丸豆

如指頭大綿包塞耳口內噙生鐵一塊牙咬緊此
方通神

心疼 胡椒七粒菜豆九粒研破燒酒下不止再服
卽止

冷肚痛 陳皮青皮官桂各一錢水一鍾半煎溫服

牙疼 巴豆花椒爲末同飯爲丸如米大入痛處

又方 土硃樟冰各等分爲末綿包扎緊咬痛處吐

涎

風牙 蜂房一個

川椒二十粒小麥一撮暗醋半碗煎

滾乘熱嗽之

婦人白帶 魚膠慢火炒爲末好酒送下

口臭 白芷 七片 甘草 一錢 爲末鹽水調飲再擦嗽

妙

魚口瘡 羝羊角燒灰末之每服一錢酒下左用左

右用右

絕產 紅花 肉桂 各一錢 射香 五分 煉蜜丸豆大

每服二十九牛膝煎湯送下永無產矣

乏乳 穿山甲瓦上焙乾爲末酒下

婦人血崩

烏鷄一口紫草一錢入肚內縫合白酒煮熟去草

將鷄肉并酒三五次熱服如神 貫仲炒末酒下

亦妙

老幼久嗽

杏仁三兩去皮尖胡桃肉四兩去皮研爛蜜丸彈
子大姜湯嚼下一丸

男子患白淋者

滑石 二月 粉草 五月 共燒爲末先吃好酒一鍾后

每服二錢冷茶送下白午前服紅午后服

頭疼 川芎石膏各一錢水煎臨睡服

腰疼 杜仲鹽炒去絲爲末腰子割破將末裝內扎

定飯上蒸熟食之

老人遺尿

薔薇根煎湯常服

又夜起多小便以

糯粉作糕炙黃食之

又方晚間少飲茶湯

火丹

煤查與青菜同搗如泥塗上

葱搗如泥塗

上

腳根裂破

白芨赤石脂末塞之五日不犯水

小兒遺尿

用紅紙剪馬四匹令小兒自安身下每

夜如之

諸骨哽

解開衣帶低頭視下部數次其骨不下行

則上出矣

一切虫入耳如在左耳以手緊閉右耳努氣至左耳其虫自出

兩眼腫如桃大 用猪鬃四根各掃攢竹精明四六擦之待睡一覺醒去之妙

一人頭風六月畏寒重裹綿絮三十年不愈予以蕎麥粉二升水調打餅二片更換合頭上微汗出卽愈

一人風痛數年余以七葉黃荊取根皮加接骨草五加皮酒煎服

去牙法 用草烏末略搽卽去用好鹽湯洗之

一人食肉生中毒掘地深三尺取下土三升以水五升煮數沸取青汁服一升而愈

食牛肉中毒 煮甘草濃汁飲卽解

食鳥獸肉毒者大豆汁或鹽汁服之

諸果中毒 猪骨燒灰冷水下一匙

食蟹毒 紫蘇煎湯服之

食花椒氣閉 新汲井水解之

水銀入人耳皆死以金銀着耳邊水銀卽吐出

一婦人患心痛數年用茶末一分信半分白湯調下吐瘀血一塊而愈

冷氣吐白沫良姜末三分燒酒調下

嘈雜吐清水上好廣皮去白爲末五更起坐床上安末五分於手心男左女右乾舐下而卧服三朝必効服此不好病難療也

翻胃 水澄螺螄泥晒乾爲末大酒下一錢

一人大病后身面俱黃四肢無力吐血成盆諸藥不効螺螄十一枚水漂去泥連殼搗爛夜露五更取澄清水服四次黃去血止而愈

九種心痛惡心吐水積聚氣滯是有虫也

乾漆四兩慢火燒煙盡醋糊爲丸葉豆大食後酒

醋熱下三十五丸不愈再加

腰痛曲而難伸 山查末三錢茶酒鹽湯隨下

赤鼻

枯凡

三夕

硫黃

三夕

臨時取三分于手心中唾調

以指塗鼻孔內睡醒再塗三日則變色七日全愈

乾嘔噦并手足厥者

陳皮

四兩

生姜

半斤

水煎服

胃反嘔吐者半夏二升不切人參三兩白蜜一升水

一斗二升和蜜搗之二百四十遍煎至四升溫服

一升餘再服

噦逆

橘皮竹茹湯又治噫氣五七日不止者

橘皮 二升 竹茹 二升 大棗 三十 生姜 半斤 甘草 五

人參 一升 水煎三四服

腰曲不伸重如帶石

赤茯苓 白朮 各四 炙草 三升 乾姜 炮二 每五錢

水煎

一人心痛徹背、痛徹心

赤石脂 胡椒 乾姜 各一 附子 五

烏頭 炮二 煉蜜丸每服一九酒下三服自愈

一女人悞吞針入腹用蠶豆煮熟同韭菜食之針從

大便出

一人悞吞銅錢胡桃肉食之自化葶薺亦可

一人開藥舖忽頭腫如斗大如錐刺諸藥不効用煎甘草湯熏之另煎甘草膏飲之卽愈 乃藥毒也

一人中惡卒死灸臍中百壯以皂角末吹鼻或韭汁

灌耳

一婦人膝冷至足湯火不能溫以附子治之不効用四物湯加黃柏知母四劑而愈

一婦人初足下強硬數月餘膝亦硬一年則手足骨節俱不能動卧床如癱又非風症知爲虛也以人參當歸附子煎膏盡二個而愈

小兒尿不禁 蜜一杯車前草汁和熬夜露清晨服之

婦人新久腹痛

玄胡蒼朮煨榔良姜各一錢茯苓肉桂丁皮乾姜各五分三稜蓬朮甘草青皮砂仁各八分連鬚葱白三根水煎服効如神

催生 魚膠八寸瓦上焙乾燒灰酒送下

產後兒枕痛 山查一兩搗碎水二鍾煎八分入砂

糖二匙痛立止

小便血 用病人頭髮燒灰酒下

水瀉腹中響如雷者軟石膏火煨老米飯爲丸如桐

子大飛過黃丹爲衣每服二十九米湯下卽効

噤口痢

蜂蜜砂糖并姜汁湯下

瀉用老米飲下

肚痛炒米湯下

九竅出血

清晨頭一吊水喫面卽止

牙冷痛

蒜半瓣巴荳肉一粒綿裹塞耳內

肚痛丸

雄黃

二多

巴荳仁

二多不去油

丸如芥子大每三粒白

湯下行利三四次痛卽止

小便出大便

五苓散加分利水谷之劑

過忍小便致轉胞 滑石末葱酒調下二錢

寸白虫 以黑龜一枚陳藏糟包裹火煨存性爲末
糊爲丸空心酒下三十丸

治五絕死

自縊死溺水死打撲跌槓木石壓死產後血迷暈
死中惡鬼擊死夜魘死凡心頭溫者皆可救治用
半夏湯泡七次爲末丸如豆大吹入鼻中噴嚏卽
活或用皂莢爲末吹入鼻中亦妙

又方

急於人中穴及兩腳尖母指甲離甲一韭葉許各

灸三五壯卽活膈中灸百壯亦効

救自縊

凡自縊高懸者徐、抱住解繩不得截斷上下安被卧之以一人用腳踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使緩縱一人以手按據胸上數磨動之一人摩將臂脰屈伸之若已強直但漸屈之并按其腹如此一頃雖得氣逆口出呼吸眼開仍引按不住須臾以少桂湯及粥清灌令喉潤漸、能嚥乃止更令兩人以芦管吹其兩耳無不活者自旦至暮雖冷亦可救自暮至旦陰氣盛爲難救耳

又法

以一人兩手掩其口鼻勿令透氣一人用手摩其頸痕兩時氣急則活

救溺水死

一宿者尚活用皂莢爲末綿裹塞糞門須臾出水卽活

又方 救起放大橈卧着脚後橈站起磚二塊却用鹽擦臍中待水自流出切不可倒提出水但心下溫者皆可救

又方 急解衣帶灸臍中仍令兩人以蘆管吹其