

卷三至卷六

衛生鴻寶

衛生鴻寶 卷三

幼科目錄

通治 保元湯 治氣虛血弱

活幼補腎地黄丸 治先天不足諸症

五福化毒丹 治蘊熱胎毒諸症

沆瀣

丹 治胎毒火

三仙丹 治食物過多

瀉青丸 治肝火鬱熱諸症

抱龍丸 治急驚內釣諸症

肥兒丸 治內

積熱蟲 解表通用方 治外感諸症

初生 拭口法 防驚法

封臍法 擦穴法 附揉乳法

挑泡法 治初生

通氣法 治悶臍生附

內合 撲粉法 治初生無皮

地黄膏 治目不開

葱白湯 治不乳便閉

硫黃散 治陰囊入腹

梨汁飲

治胎熱 驚散 治胎驚

胡桃飲 治胎毒

人中黃散 治胎毒遺毒

粉艾丹 治胎癰

蛇體浴

法 晶體摩法 螳螂子塗法

臍風 辰砂膏 治臍風

摻臍法 預防臍風馬牙

掩臍法

掐泡法

嚙鼻法

擦背法

灸筋

法 燈火焯法 治以上並風

外感痙症 桂枝葛根湯 治柔痙

桂枝加防風湯 治柔痙

防風當歸湯 治柔痙

瓜蒌根桂

枝湯 治剛痙

羚羊角散 治陽痙

附子散 治陰痙

當歸四逆湯 治虛痙

痙火閉症

通關散 治內火急驚

奪命散 治急驚痙潮

導赤散 治心旺發搐

清熱鎮驚湯 治急驚

加減涼膈散 治急驚

金粟丹 治慢驚

蒿蟲丸 治急驚

治驚簡便法

止驚神妙法

虛寒慢症

逐寒蕩驚湯 治慢驚

理中地黄湯 治陰慢驚

附子理中湯 治陽慢驚

溫中補

脾湯治慢脾

拔驚奇驗法

大驚猝恐

秘旨安神丸治血虛驚悸

七味安神丸治蘊熱驚悸

大釣內釣

鈎藤飲治天鈎

木香丸治內鈎

癰症 定癰丸

斷癰丸

疳積 集聖丸治疳主方

君雷散治疳積

疳積膏

疳疾丸

疳積方

雄黃解毒丸

治蟲痛

葱油飲治蟲積

傷食慰法

消癖法治乳癖

疳積膏藥

雜症 青果煎治稀症

蟬花散治夜啼

花火膏治夜啼

手摩丸治中寒腹痛

天麻丸治疳眼

消

疳散治口疳牙疳

小兒急黃

天哮

止嗽丸治百咳

杏蜜煎治逆咳

牛黃奪命散治馬治

草麻膏治肺脹鼻煽

手握丹治瘧疾附瘧母

金液丹

掩臍法治泄瀉

貼臍方治久泄

燒針丸治吐瀉

封臍法治痢疾

時羅散治小兒腸疳

倍礬散治脫肛

疎表法治發熱

清裏法治發熱

尿床方

外治法 納氣法治喘虛

通脉法治冷厥

疎表法治發熱

清裏法治發熱

解煩法治實熱

解煩法治實熱及麻疹

開閉法治風痰

引痰法治痰嗽

化痰法治寒痰

定痛法治臍腹痛

回生艾火治陰寒久病

衛生鴻寶 卷三

幼科

通治

保元湯

治氣虛血弱之總方

黃芪三錢

人參二錢

甘草一錢

肉桂

春夏二分 秋冬七分

水煎服。量兒加減。

柯韻伯曰

東垣以上三味能瀉火補金培土為除煩熱之聖藥。鎮小兒之驚效如桴鼓。魏桂岩以治痘家陽虛頂陷血虛漿清皮薄發瘡難灌難壓者始終用之。名曰保元少佐肉桂以扶陽托毒。又如宜升加升麻宜燥加白朮。宜潤加當歸。宜利加陳皮。宜收加白芍。宜散加川芎。表實去芪。裏實去參。中滿忌甘。內熱除桂。斯又當理會矣。

活幼補腎地黃丸

家秋治腎虛骨體枯渴頭暈一切先天不足等症。熟地九砂仁製山藥乳蒸。炙肉各五錢。丹皮炒。茯苓晒。澤瀉各一兩。鹿茸酒洗。牛膝酒洗。各五錢。

蜜丸

梧子大量兒大小空心溫水下

一胎方無鹿茸有川斷酒洗。萬密齋曰此方治仲陽以小兒純陽無補法。故因金匱八味丸減去桂附。凡胎怯先天不足。諸症用此以滋化源。萬氏又加鹿茸牛膝培元固本。庶無陰寒臍膈之弊。

五福化毒丹

正治小兒胎毒。諸瘡癰腫。夜睡不安。元參。桔梗。蘆。赤苓。各二錢。無用。川連。胆草。青黛。飛。牙硝。各一錢。甘草。五錢。冰片。五錢。朱砂。三錢。為末。煉蜜丸。芡實。大金箔。二十張。每一丸。薄荷。燈心。湯化服。痘疹後餘毒。上攻口齒。涎血臭。下亦可。準繩湯氏原方。

下亦可。準繩湯氏原方。

有麝香五分。無川連。胆草。原方。

沆瀣丹

集成治胎毒。胎熱。胎黃。面赤。目閉。驚口。口瘡。重舌。木舌。喉閉。喉蛾。渾身壯熱。大便。秘結。小便黃赤。麻疹。斑。癩。游風。癰。疥。疔。瘡。食風。熱。疳。腮。面腫。十種。火丹。諸般風。搐。川芎。洗。酒。大黃。酒。蒸。實苓。酒。炒。黃柏。酒。炒。各。赤芍。炒。黑丑。頭。取。滑石。飛。水。連翹。心。

川芎。洗。酒。大黃。酒。蒸。實苓。酒。炒。黃柏。酒。炒。各。赤芍。炒。黑丑。頭。取。滑石。飛。水。連翹。心。

沆瀣丹。集成治胎毒。胎熱。胎黃。面赤。目閉。驚口。口瘡。重舌。木舌。喉閉。喉蛾。渾身壯熱。大便。秘結。小便黃赤。麻疹。斑。癩。游風。癰。疥。疔。瘡。食風。熱。疳。腮。面腫。十種。火丹。諸般風。搐。

川芎。洗。酒。大黃。酒。蒸。實苓。酒。炒。黃柏。酒。炒。各。赤芍。炒。黑丑。頭。取。滑石。飛。水。連翹。心。

沆瀣丹。集成治胎毒。胎熱。胎黃。面赤。目閉。驚口。口瘡。重舌。木舌。喉閉。喉蛾。渾身壯熱。大便。秘結。小便黃赤。麻疹。斑。癩。游風。癰。疥。疔。瘡。食風。熱。疳。腮。面腫。十種。火丹。諸般風。搐。

川芎。洗。酒。大黃。酒。蒸。實苓。酒。炒。黃柏。酒。炒。各。赤芍。炒。黑丑。頭。取。滑石。飛。水。連翹。心。

沆瀣丹。集成治胎毒。胎熱。胎黃。面赤。目閉。驚口。口瘡。重舌。木舌。喉閉。喉蛾。渾身壯熱。大便。秘結。小便黃赤。麻疹。斑。癩。游風。癰。疥。疔。瘡。食風。熱。疳。腮。面腫。十種。火丹。諸般風。搐。

川芎。洗。酒。大黃。酒。蒸。實苓。酒。炒。黃柏。酒。炒。各。赤芍。炒。黑丑。頭。取。滑石。飛。水。連翹。心。

沆瀣丹。集成治胎毒。胎熱。胎黃。面赤。目閉。驚口。口瘡。重舌。木舌。喉閉。喉蛾。渾身壯熱。大便。秘結。小便黃赤。麻疹。斑。癩。游風。癰。疥。疔。瘡。食風。熱。疳。腮。面腫。十種。火丹。諸般風。搐。

川芎。洗。酒。大黃。酒。蒸。實苓。酒。炒。黃柏。酒。炒。各。赤芍。炒。黑丑。頭。取。滑石。飛。水。連翹。心。

沆瀣丹。集成治胎毒。胎熱。胎黃。面赤。目閉。驚口。口瘡。重舌。木舌。喉閉。喉蛾。渾身壯熱。大便。秘結。小便黃赤。麻疹。斑。癩。游風。癰。疥。疔。瘡。食風。熱。疳。腮。面腫。十種。火丹。諸般風。搐。

川芎。洗。酒。大黃。酒。蒸。實苓。酒。炒。黃柏。酒。炒。各。赤芍。炒。黑丑。頭。取。滑石。飛。水。連翹。心。

沆瀣丹。集成治胎毒。胎熱。胎黃。面赤。目閉。驚口。口瘡。重舌。木舌。喉閉。喉蛾。渾身壯熱。大便。秘結。小便黃赤。麻疹。斑。癩。游風。癰。疥。疔。瘡。食風。熱。疳。腮。面腫。十種。火丹。諸般風。搐。

衛生鴻寶

幼科通治

各六錢

枳殼炒

薄荷葉錢半

尖枳榔七錢半

為末。蜜九芡實大。月內兒一丸。稍大二

九茶湯化服

但微有泄瀉藥力行病即減矣重症日三服惟胎寒胎怯面青白者忌之。受毒或生後感邪遂爾中氣抑鬱則見以前諸症此方用治有餘邪熱應如得響。

主治蓋臟氣流通必不鬱滯或胎前

三仙丹

胃及痢疾用溫藥閉其濕熱。火中烘熟另以綿紙包。搗去油成粉名巴霜。

五靈脂二兩

南木香五錢

巴豆仁四十粒去殼皮

沈瀝丹同研茶清調服下後立愈。陳飛霞曰小兒縱口飲啖填塞腸胃脾氣抑鬱發熱不

研勻醋打麵糊為丸。菜豆大。朱砂為衣。晒乾。每五九或七九

與

瀉青丸。錢氏治肝火鬱熱目赤腫痛胎熱胎風肝。大黃水浸透。龍胆草甘草水。梔仁

瀉青丸

同服。如痢疾誤用溫藥比食物有形之塞胎而鎮之。百無一救。速以此丸與沈瀝丹

大黃水浸透

龍胆草甘草水

梔仁

浸炒

羌活當歸

防風

川芎等分

煉蜜丸。青黛為衣。黃豆大。每一二丸。茶清

化下。薛立齋曰此足厥陰經解散肌表。疎通內熱之藥也。大便秘結煩渴飲冷形病俱實

清心平肝。疎風涼血。凡小兒作熱不退。將成風。搖或已成者。但服此丸。其應如響。

抱龍丸

內計氏治急驚癇。痰涎壅盛。胎驚驚。飛一錢。麝香分一。為細末。另用麻黃。欵冬。花甘草。各五錢。煎湯去渣。慢火熬成膏。和末藥為

胆星九套

天竺黃五錢

辰砂水飛

雄黃水

飛一錢

麝香分一

為細末。另用麻黃。欵冬。花甘草。各五錢。煎湯去渣。慢火熬成膏。和末藥為

丸芡實大。每一丸。薄荷湯化下。

蔣仲芳曰鎮驚化痰安神開竅。製抱龍之義也。然恐病輕

麝香得麻黃之辛散。竅內之驚盡出。殊雄得甘草之緩。鎮驚之性和平。咳嗽痰喘。不治。悉愈。其方則同。其效遠勝矣。此方為計。元讓家秘。活人無算。予求數年始得之。

肥兒丸

肌肚腹痠痛內熱蟲積。

白朮炒

香附鹽水

陳皮

厚朴姜汁

枳實炒

枳實炒

檳榔 神麴 麥芽 澤瀉 萊菔子 查肉 茯苓 白芍 木香 不見火 災

草各二 為末。隨症加藥蜜丸。量兒大小服。內熱口渴。洪數小便。黃加連翹。黃連各二。

可加蘆薈一兩。胡連銀柴胡各三兩。醋炙。驚甲兩。桂枝七錢。○腹中脹。或有塊。痛。手不。

白六脉無力。倍木。芍加人參。山藥。苡仁。各四兩。瀉。不止。○泄瀉。少食。腹痛。手按。則減。面色。

渴。溺清。白。悠。悠。腹痛。喜就。暖處。或食。生。冷。即瀉。或臍下痛。屬虛寒。加炮姜。肉桂。各一兩。倍。

木芍。泄。加。肉。果。二。兩。虛。甚。加。人。參。山。藥。各。二。兩。○面。上。白。斑。腹。痛。口。出。清。水。或。吐。蟲。屬。蟲。

積。加。史。君。肉。貫。眾。各。二。兩。雷。丸。鶴。虱。各。一。兩。○蔣。仲。芳。曰。小。兒。稟。純。陽。之。體。乳。食。滋。補。則。

先天之氣。生。不。窮。所。患。者。飲。食。過。度。脾。胃。損。傷。成。疳。積。肌。肉。削。瘦。食。積。之。害。小。兒。猶。

蟲。物。之。害。草。木。蟲。物。去。則。草。木。自。長。食。積。去。則。元。氣。自。生。古。人。製。肥。兒。之。方。多。用。消。食。去。

積。之。品。欲。先。除。其。害。也。予。得。此。旨。隨。症。加。減。以。盡。寒。熱。虛。實。蟲。積。之。變。

解表通用方。治小兒風寒。淡豆豉二。製半夏。茯苓。陳皮。錢各一。甘草二。葱白連。

三。生。姜。三。水。煎。服。無。汗。加。羌。活。防。風。湯。加。葛。根。花。粉。惡。寒。加。桂。枝。痰。多。加。枳。實。竹。茹。喘。逆。加。

莖。蒼。木。香。腹。痛。加。小。香。赤。芍。延。胡。兼。驚。加。鉤。勾。薄。荷。左。石。菖。蒲。癰。癰。加。柴。胡。桂。枝。熱。心。有。汗。

茶。保。嬰。易。知。錄。○幼。科。指。南。小。兒。傷。寒。面。青。躁。而。惡。寒。左。石。菖。蒲。癰。癰。加。柴。胡。桂。枝。熱。心。有。汗。

面。色。青。紅。人。中。青。紋。時。發。驚。悸。小。兒。傷。寒。面。青。躁。而。惡。寒。左。石。菖。蒲。癰。癰。加。柴。胡。桂。枝。熱。心。有。汗。

腫。右。額。紋。青。頭。肚。俱。熱。胸。膈。不。寬。腹。脹。而。吐。此。傷。食。也。身。熱。不。常。飲。食。不。減。唇。紅。面。赤。脛。

汗。便。秘。亦。熱。也。發熱辨。筆花醫鏡。外熱與內熱不同。外熱者身終日發熱。或拘束肢冷。外有清涕。咳嗽。頭。

汗。自。愈。內。熱。者。如。夜。熱。潮。熱。晝。輕。夜。重。或。口。渴。或。腹。脹。或。盜。汗。其。症。有。因。傷。食。停。滯。伏。燥。

伏。火。陰。虛。陽。虛。等。異。此。內。解。之。症。也。不。可。用。表。藥。宜。按。症。分。別。而。治。此。等。熱。久。必。傷。陰。日。

漸。削。瘦。成。為。疳。癆。慎。勿。忽。視。○林。章。甫。曰。兒。在。母。腹。隨。母。呼。吸。漸。次。成。形。一。出。胞。胎。則。以。

可。已。呼。吸。為。生。外。風。得。以。襲。之。凡。初。生。諸。症。率。多。風。症。溫。補。涼。下。藥。皆。宜。審。而。後。用。之。不。

投。概。

初生下胎毒 防驚風 斷臍帶 初生輒死 悶臍生 肛門內合 初生無皮
毒胎目不開 蛇蟻子體 不乳便閉 陰囊入腹 胎熱胎赤 胎黃 胎驚 胎癰 胎毒遺

拭口法 即初出胎 甘草 淡豆豉 各三 入沸湯一碗 隔水煮以棉為乳 藥汁入兒口

吮之以盡為度 腹內有聲去胎糞數次 方飲乳 永無驚風 諸病 繆仲醇廣筆記 景岳法

口中使吮其汁 非 獨中 和且能養臟 非 防驚法 赤氣壯者宜之 甘草 生大黃 各二 硃砂 一分 研細 用黑糖 滾水化調 兒

落草後茶匙徐勻作兩日內溫溫灌完 永無驚風之患 日後出痘疹亦輕 倘未服此

封臍法 斷臍帶 龍骨 煨 枯礬 紅綿皮 當歸頭 各一 為細末 用少許摻臍內 堂精

乃剪宜留帶一尺二寸 摻藥末于臍窩中 紬絹縛定 天寒將草紙灼火于臍帶近臍處往

來微薰令溫煖之氣透入 臍中 然後扎好 俟其自脫 擦穴法 後用此 雞子白 粘擦前後心 手足心 兩肩井穴 各十數遍 見有黑絲 用尖鑷

拔出 以不見為度 王凝齋秋燈叢話 予遇異人授海上方可除一切胎毒驚風等症 出痘

汁以散為度 或初洗即將兩乳 頭各捻數把 可免腫毒之患 挑泡法 初生 視兒口中懸癰 前上腭有白泡 或赤 用銀器磨刮挑破 指裏軟絹 拭去惡血

即活 挑時須低覆兒頭 使血往外 勿令入咽 致生他疾 本千金法 嬰科輯要 初生胃寒

之暖氣入腹 能啼方可斷也 藥油點火于帶上 緩緩薰 包裏末可斷臍 且將胞衣剪落 用芒蔴扎緊 臍帶 撫大紙條

挑泡法 初生 視兒口中懸癰 前上腭有白泡 或赤 用銀器磨刮挑破 指裏軟絹 拭去惡血

即活 挑時須低覆兒頭 使血往外 勿令入咽 致生他疾 本千金法 嬰科輯要 初生胃寒

之暖氣入腹 能啼方可斷也 藥油點火于帶上 緩緩薰 包裏末可斷臍 且將胞衣剪落 用芒蔴扎緊 臍帶 撫大紙條

之暖氣入腹 能啼方可斷也 藥油點火于帶上 緩緩薰 包裏末可斷臍 且將胞衣剪落 用芒蔴扎緊 臍帶 撫大紙條

通氣法
兒氣不能出聲

以銀簪輕輕挑破。或不能挑。急以熱水浸其胞衣。寒天則以熱

氣入腹內鼓其膜自破聲而出。

以集成。金鑑兒初生肛門內合由脂膜遮隔無隙可通。先

合丸作囊核狀。納肛門內。令香氣透開可救。

以簪刺破脂膜。急用油紙揩插入。隔之不令再合。更用蘇

撲粉法。兒初生無皮

早稻白米。研細名。時時撲之。其皮漸生。不嫩赤者。由產母脾肺不足也。

發熱者。胎中火盛所致。黃柏石膏煨和米粉撲之。乾則猪胆汁調搽。夏月兒臥蕉葉上。○幼幼傳真。

地黃膏。準繩治胎受熱毒生下目不開

梔仁。萊豆粉。各兩。甘草。六錢。共。生地和蜜。各兩。銅銚中。

煎成膏入藥末和勻。丸芡實大。每一丸麥冬湯化服。

乳母亦可服。外以川連秦皮木賊。便易經驗。集月內外兩目紅腫不開。曲蟻泥塗。頤門紅。各五錢。水煎澄清。頻洗。目自開。

星醋調塗足心亦效。○幼科指南。初生血漬不開者。令母吸井水。喚之自開。

葱白湯。乳或二便閉

葱白。二根。人乳。半。同煎。一二沸。葱分作四次服。即吮乳。觸鼻風。

嘔吐。加生薑汁。傳真。初生不乳。肢冷。嘔吐。清水。面色青白者。屬胎寒。用木香炮姜水煎。

綿蘸滴與之。惡穢入腹。嘔吐。黃水者。屬胎熱。用川連大黃煎湯與之。○準繩。初生吃乳不

穩壯。熱色赤。鼻孔黃。恐作撮口。牙關有蟲。似蝸牛。用竹瀝半合。牛黃少許。服。或以猪肉拭口。蟲即出。

連大黃煎湯與之。○準繩。初生吃乳不

硫黃散。初生六七日後陰囊入腹受寒所致

硫黃。錢一。吳萸。錢三。為末。大蒜。研調塗臍下。再以蛇床子微炒。

烟熏之。聖惠方

吊包慰其囊。或燒

梨汁飲。治胎熱

秋白梨。一個。去核。取汁熬熱飲之。衛生要訣。外以葱涎入香油。抹兒五心。

濕熱。生下面體黃如金色。青瓜。萋焙研。每服錢半。水煎。

頂背等處。解毒涼肌。○普濟良方。胎受

嘔驚散。治胎驚

生半夏。錢一。皂角。分五。為末。吹少許入鼻中。得嚏即醒。保嬰易知錄。○準繩。

驚。驚

楊仁齋治胎驚初起

氣逆痰作目上視身反張啼聲不出耳後高骨間必有青紋紛
紛如線急不破令血出啼叫先得氣通為妙內以抱龍丸灌之
胡桃飲毒胎 胡桃肉三枚 橄欖核三枚 雄黃三分 甘草濃煎 生蜜數匙和勻攪

去滓時時溫服數匙 藥多熱毒者宜之若身面皆白胎稟虛寒本來少毒者服之反伐生
氣多致天枉當用此飲引 出腎經之毒出痘亦稀

人中黃散 治胎毒 粉甘草 研細用毛竹一段留節一頭鑽小孔取甘草灌滿 瓶貯每服

大兒一錢小兒三四分 涼水調服 毒並治痘疹黑陷風熱斑疹赤游丹毒惡瘡疔毒河純等
調服 正宗 胎毒遍身土茯苓湯調服尋常熱病入應病藥中

粉艾丹 治胎癰先用 官粉調塗碗 用艾熏至老黃色取下為末絹袋撲之種福堂方○

癰紫甘蕉皮炙灰銅綠少許白糖乾一撮麻油調搽立效○同毒錄胎毒桑樹日出時用刀
砍二三下漿出和蜜塗之並治臍風驚口重舌馬牙牙根腫脹不能食乳○村居急救方
內磚多年紅頭及身脫皮者尿缸
蛇體浴法 氣血開溢亦曰胎垢亦名蛇體 白姜蠶去絲 為末煎湯不時浴之一如蛇蛻

保幼 大全

晶體摩法 兒初生胸腹忽如水晶色 大蟾蜍六隻以四 以肚皮在晶處撫摩多次輪換

六隻其病即瘥或大如水晶破則流水蜜僧研細搽之

螳螂子塗法 亦名黃馬牙 代赭石 胭脂水磨外塗頰上數次即消一得山房經驗方症

出血用京墨塗搽即愈○全生集用生地大黃各五錢陳酒浸入麝二分塗兩足心絹包
好乾則易○徐靈胎曰自古無螳螂子之病小兒變蒸之候每有口內微腫惡乳之時名

曰妒乳不治自愈近日海濱妖婦造割螳螂子之法騙人取利強者幸愈弱者多死蓋小兒兩頰有內外皮兩層中空處有脂膜一塊人人皆然割去復生人見果有螳螂子者遂相信不疑死而悔深可憐憫

不悔深可憐憫

辰砂膏 類萃治臍風眼閉口噤

辰砂三錢 礞砂 馬牙硝各錢

元明粉二錢 全蝎去尾

真珠末 豆腐煮過 麝香一分

為末油紙包裹自然成膏每服一豆許 潮熱薄荷湯下

月內乳汁調塗乳頭令吮之○保嬰撮要撮口肚脹青筋吊腸卵疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疎利辰砂膏是也○傳真臍風總由胎毒所致忌用散風之藥當以此膏疎利之○劉瀛坡簡便方撮口穿山甲尾上甲三片羊油炙黃

蟬梢去勾七個為細末人乳調塗乳上兒吮之厚衣包裹汗出即愈

蟬梢法 預防臍風馬 枯礬二錢 礞砂五分 朱砂二分 冰片 麝香各五厘

為末兒下地

洗過即用此末 蟬膏眼上每換尿布必擦之○慈幼編擦完一料永無臍風等症 幼科摘甲刮薄貼腫處即消○聖惠方臍瘡出膿血要初生臍腫剗芥湯洗淨用葱白皮煨熟指盧怡亭信驗方臍瘡不乾大紅羯子燒灰或舊棉花灰亂髮灰並效

掩臍法 毒神方 上辰砂四分按日加用 麝香按日加用 小雞一隻足月者更好藥研細將雞背脊剖開去淨乘熱將藥末放雞脯子中間如酒大急合臍上以帕扎緊一炷香久解下看雞必有青黑毒氣拔出而愈普濟良方○一得山房方將桐油煎雞子餅

指泡法 兒患臍風吸去風毒週日換去即愈一方加生南星末一分此法驗過多人

用青黛點如粟米狀或舌下小泡或白以棉裹指蘸溫水輕輕擦破去其毒水開口即安

點以豬乳 以指甲指破出血可免臍風○準繩兒口內牙齦上有筋二條用葦刀輕輕割斷

喘鼻法

治喉蛾蛇一條去頭

蝎梢四尾

姜蠶七隻去嘴絲炙

瞿麥五分

研細吹鼻中候嚏

啼哭可醫

當屋尊生書○準繩用鬱金藜蘆瓜蒂等分末水調搗鼻中令出黃水

擦背法

治諸風及諸風

雞蛋取清

在兒腦後背脊梁骨第一節之下

許一寸指蘸清擦磨隨見白

沫從皮內出旋生黑毛如猪鬃

隨擦隨長有以不長為度出毛處均要擦到用軟絹將毛

縛好不可拔去避風微汗即愈

灸筋法

道上行至腹却開兩又自臍逆至心口難救

急用艾炷用香油燈草火於青筋

起處灸三壯

攻之路又於兩又頭上各灸三壯此筋即時縮下寸許又從縮下頭上灸之

筋消風息

一得山房方此法本準繩屢效○有嬰家秘臍風撮口足指甲上正

燈火焦法

易黃色初發吸乳較前稍鬆呼欠噴嚏兩眼角挨眉心忽有黃色治之最

火適中以麻油蘸按穴燋之風止黃退

蔡名莊曰臍風惟火最捷然集成全身燈火至

人中二穴亦不可輕用茲特列臍風秘授急

救神火共三十一燋并致正穴法詳列于後

臍風火穴

角孫

耳廓中問開口有穴以上耳

頤會

一名華蓋穴認頤

橫紋痕

天容

耳根下前

風池

耳後腦空下兩枕骨

尾即是

中衝

手甲中指端去

滑肉

兩乳直下排

指歧骨陷中大陷聳起

中衝

手甲中指端去

滑肉

兩乳直下排

節骨旁陷中低處便是

中衝

手甲中指端去

滑肉

兩乳直下排

肺俞

背脊第三椎下兩

腎俞

脊骨第十四椎下

陽強

動應手

用火次序

凡灸火無論男女皆先從左邊灸起○初從左角孫左風池各一燋

復從頤會四

各一燋先灸上

處是

用火次序

凡灸火無論男女皆先從左邊灸起○初從左角孫左風池各一燋

復從頤會四

各一燋先灸上

處是


用火次序

凡灸火無論男女皆先從左邊灸起○初從左角孫左風池各一燋

復從頤會四

各一燋先灸上


齊風火穴圖



次灸石次灸下。○次左天容左肩尖左曲池左合谷左中衝各一焦。○次右天容右肩尖
 右曲池右合谷右中衝各一焦。○次滑肉左右各一焦。○次陰交三焦先灸中平過離半
 寸先灸左次灸右。○次肺俞左右各一焦。○灸畢若得沉睡醒後吃乳如常風散病退矣若
 右陽強右崑崙各一焦。○灸畢若得沉睡醒後吃乳如常風散病退矣若陽強左崑崙各一焦
 巨指將兒外勞宮男左女右手背順揉三十六遍
 即覆掌心勞宮穴灸一焦無不速效。○醫書滙參

背圖

衛生寶鑑 卷三



驚風辨症 外感痙症 痰火閉症 虛寒慢症

外感痙症 喻嘉言曰驚風一門世入鑒空妄說受害者不知凡幾蓋小兒陰氣未足性稟

必先入太陽經陽致生熱熱盛則生風生風亦所恒有且湊理不密易感寒邪邪中人

深入臟腑中氣死不知筋脈牽強遂外感傷寒為多體脆神怯不耐壯熱多成痙病後世

四症入候之說實指痙病之頭搖手勁者為驚風之抽搐指痙病之口噤脚攣者為驚風

之以搖痙痙之背反張為角弓反張小兒剛痙少柔痙多世俗見其汗出不止神昏不醒

便以慢驚為名妄投參苓木附閉塞腠理熱邪不得外越亦為大害茲約通國共為厲禁

草除驚風二字不許出口凡小兒病發熱昏沈務審其本原虛實外邪重輕陰陽表裏擇傷

寒名家人經救治于以打破小兒病發熱昏沈務審其本原虛實外邪重輕陰陽表裏擇傷

人鬼關天共怪也○寓意草小兒病發熱昏沈務審其本原虛實外邪重輕陰陽表裏擇傷

桂枝葛根湯陽明用此方通其榮衛則外受之邪有出無入所全甚大 嫩桂枝 老生姜

炙草各一 白芍 葛根 大棗 枝水煎服 榮衛○本方去葛根加川芎防風各

一錢治發熱自汗柔痙凡小兒外感 初起發熱不論有汗無汗皆宜用之

柴胡加防風湯海藏治汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來寒熱此症太陽陽明已罷

人參分 製半夏 柴胡 黃芩 防風 炙草 加姜棗水煎服

防風當歸湯海藏治發汗過多發熱頭搖口噤背反張太陽 川芎 錢 水煎熱服 陳飛霞曰傷風有汗為柔痙初起發熱自汗口中氣熱呵欠頓悶

到病起幼科見其多汗昏沈候 瓜蒌根 桂枝湯金匱治太陽頭痛身熱無汗頸項俱強此先因傷風自汗 瓜蒌根 白芍

各錢 桂枝 生薑 炙草 大棗 枝水煎服 榮衛○本方去葛根加川芎防風各

加白蜜少許調和溫水服之。其藥自裹痰從大便出。

導赤散錢氏治心旺發搐目上視白生地木通生甘草淡竹葉水煎服。本方

葉加川連名瀉心導赤湯。○蔡名莊曰喻嘉言謂驚風之妄陳氏集成更為詳辨以瘳病

為候搐用海藏等方循經治療誠為有功。○然錢仲陽之治真搐亦曰內拔實熱外感

風邪心家受熱生驚肝家生風發搐惟用瀉青瀉心導赤等方亦未嘗用金

石鎮墜之藥蓋陳氏主風寒外感錢氏則主臟腑自病不可執此而遺彼也

清熱鎮驚湯晶氏治急驚身熱面赤搐搦上視連翹去心柴胡地骨皮龍胆草

甘草薄荷分二滑石末八燈心團一淡竹葉三水煎溫服。兒小者分

加減涼膈散服前方微熱未連翹片苓枳實炒前胡各五大黃酒炒

甘草薄荷分二水煎服。三歲以下者二三服之微利一二二次痰熱自退若已通利

也當服發散藥切勿發搐者此似驚非驚此陽症不可用艾灸燈火焯法。○又有欲出痘

金粟丹搗成散藥切勿發搐者此似驚非驚胆星二兩○製法用南星末半斤裝牛胆汁內天麻姜汁

附姜汁全蝎去尾足乳香去油代赭石煅紅七次姜蠶炒去絲麝香冰片各三

研細蜜丸兒子大金箔五十張為衣每一丸姜湯化服陳飛霞曰此方疎風化痰清火降

手搖或前醫用藥不當候而致搐昏沉不醒即以全身燈火醒之用此丸一服即痊此

龍金液保命至寶等方功倍十百惟虛寒之疾無根之氣絕脫之症不可用以其降令重也

萬蟲丸治急驚痰朱砂飛輕粉各五青蒿節內蟲後以足和藥為度生翅須秋分同

研丸麻子大晒乾每歲一丸人乳化服便痰即愈同丸不用輕粉以姜湯服之○種福堂

方急驚身熱面紅痰盛手足牽引啼聲不出目睛上視者是活蚌一隻滴入姜汁片時水出灌下立愈凡啞驚用石菖蒲汁雪梨汁老姜汁和勻灌下即醒

治驚簡便法以孩兒腹上先

雞自落兒即愈

雞自落兒即愈雞內安麝香豆許將雞合香臍上帛扎住一二時即活轉矣○陸晝村經

驗方

雞自落兒即愈雞內安麝香豆許將雞合香臍上帛扎住一二時即活轉矣○陸晝村經

方驗

止驚神妙法病發自肝

代赭石

研末醋調敷兩脚心以絹包好小腿上有紅斑出即

愈心摩擦輕重得宜漸漸吸出黑毛即用鉗拔出再出再拔至無毛為度其驚不藥自止

驗方

愈心摩擦輕重得宜漸漸吸出黑毛即用鉗拔出再出再拔至無毛為度其驚不藥自止

葉天士曰小兒倉卒驚搐古名陽癇從熱症治古人用涼膈散為主方宣通膈上邪熱乃

驗驚為七情內寄肝立方鉤藤連翹木通薄荷前胡枳殼桔梗加入表散消食多不效

黃取其苦寒直降鹹苦走下辛香通裏竅之秘也如牛黃後世至寶丹紫雪可選用

虛塞慢症脾即木侮土症○江筆花曰俗所稱慢驚風者脾虛生風也小兒或吐或瀉久則

促是中氣脫之非驚嚇也宜補其脾回其陽則土振

逐寒蕩驚湯莊氏此症不補必死而謬以驚風名之可乎屬陰虛陽越必成慢驚非感風寒可

伏龍肝三丁香十粒炮姜胡椒肉桂一錢研勻水煎一小杯灌下補土所以

敵木也一劑吐瀉

理中地黃湯固本之要藥熟地錢五白木當歸三四劑後泄

姜各錢災芪黨參用人參棗仁研補骨脂錢二災草肉桂各一胡桃肉