

大字
足本

陳修園醫書四十八種

三星書店發行

R2-51

34-2

婦科雜症

婦科雜症

男星瑞重校刊

萍鄉文 晟叔來輯

星輝同校

經候經非血也乃天一之水出自腎中是至陰之精而有至陽之氣故其色赤如血

而實非血所以謂之天癸從來以經為血沿誤已久尚果是血何以古聖賢不名曰血水而必創呼曰經水乎

先期經來甚多是腎中水大旺用地骨皮錢五丹皮錢五白芍酒炒熟地酒蒸青蒿錢三茯苓錢一黃柏鹽水

五分浸炒水煎服二劑而火自平又有先期經來只一二點者是腎中火旺而陰水虧也

元參大生地酒炒各一兩白芍酒炒麥冬去心各五錢阿膠地骨皮錢各三水煎服四劑而經調

矣

經水後期而來多是有血寒大熟地酒蒸白芍酒炒各一兩川芎酒洗白朮土炒各五錢紫胡肉桂去粗皮各

五分續斷錢一五味子分三水煎服三劑而經調矣又有後期而來少者是血寒不足前方加當

歸酒洗四錢阿膠人參錢各二服三四劑必效貧者用黨參四錢代人參二錢以下皆同

經水斷續或前或後無定期此肝氣鬱結用定經湯白芍酒炒當歸酒洗兔絲子酒炒各一兩大熟

地九蒸山藥五錢白茯苓錢三黑芥穗錢二柴胡分五水煎服二劑而經淨四劑而經調矣若

臨時或有外感者宜加紫蘇錢一羌活錢八有內傷飲食者宜加神麴錢二傷肉食者加查肉錢二

經水有數月一行者亦無先後多少之殊本屬無病不必妄用藥餌也或有因嗜欲虧損者用茯苓錢五白朮土炒陳

皮白芍酒炒山藥錢各三兔絲子酒炒杜仲炒黑甘草錢各一河水煎服四劑仍如其舊不必再服

婦科雜症

經候

年老經水復行

五十以外或六七十經水忽復行乃肝不藏血脾不統血之故也

人參

黃芪

生用熟地一兩各

白朮炒土

當歸

酒炒

山萸

五錢各

黑芥穗

阿膠

蛤粉炒

甘草

木耳炭

錢各一

香附

酒炒五分

水煎服

一劑減

二劑

至四劑尤減十劑愈

此方加貫仲炭一研細末以藥冲服尤妙

有經水忽來忽斷時疼時止寒熱往來者

是肝氣不舒

大熟地

九蒸一兩

白芍

酒炒

當歸

酒洗

白朮

土炒各五

錢

粉丹皮川芎

酒洗各三錢

元胡索

酒炒

甘草

柴胡

錢各一

水煎服

數劑效

此方加黑荆芥穗

錢一尤妙

有經前腹痛數日而後經水行者

其經來多是紫黑塊是熱極而火不化也

用宣鬱通經湯

丹皮

白芍

酒炒

當

歸

酒洗各五錢

梔子

炒三錢

白芥子

炒二錢

香附

酒炒

鬱金

醋炒

黃芩

酒炒

生甘草

柴胡

錢各一

水煎服連

四劑下月斷不先腹痛而行經矣

行經後少腹疼痛

人以為氣血之虛也誰知是腎氣之滯也

山藥

炒五錢

阿膠

龜炒

當歸

酒洗

山萸

白芍

酒炒各三錢

巴戟

鹽水浸一錢

甘草

錢服四五劑愈

經水不止單方

陳蓮蓬殼燒灰存性研末每服二錢熱酒下

經水過多

行後復行面色痿黃身體倦困之愈甚者是血虛不歸經也

用加減四物湯

熟地

九蒸一兩

當歸

酒洗

白朮

土炒各五

錢

白芍

酒洗各五

錢

黑芥穗

山萸

三錢

川芎

酒洗二錢

續斷

甘草

錢各一

水煎服

四劑而血歸經

十劑

之後加人參

錢三再服

十劑下月行經

適可而止

又膠艾湯

阿膠

炒珠半錢

川芎

炙草

各一

錢

艾葉

當歸

各錢半

熟地

白芍

炒各二錢

水煎服

年未老經水斷以血枯而非血枯乃肝用益經湯熟地九兩白朮一兩山藥炒當歸洗

錢各五白芍炒酒沙參生棗仁搗碎各三錢人參丹皮各二錢柴胡杜仲炒黑各一錢水煎連服八劑而

經通三十劑而經不再閉矣

經水不通單方 茶一碗入紅砂糖二錢亮紗蓋定露一宿服之 又方蠶砂四兩炒黃色

無灰酒一壺重湯煮熟去砂飲一鍾即通

經前腹痛吐血有經未行之前一二日忽然用順經湯丹皮錢二當歸洗酒大熟地九蒸各五錢

白芍酒炒白茯苓沙參黑芥穗錢各三水煎服一劑而吐血止二劑經順十劑不再發

婦人年壯吐血往往有之不可遽作勞症治致成痼疾必頻以前方加茜草牛膝各一錢如法服之必效

經前腹痛單方 紫蘇陰乾候經期如吐腹脹痛煎湯薰洗下部摩運小腹每經摩洗三

四日則經正痛止

經水將來三五日前臍下先疼痛狀如刀刺或寒熱交作所下如用溫臍化濕湯白朮

土炒一兩山藥炒巴戟肉鹽水浸各五錢白茯苓錢三扁豆炒搗各三錢白果搗碎十枚建蓮去心三枚水煎

服必須於經未來前服之四劑即效

經前洩水經水未來之前洩水三日而用健固湯白朮土炒一兩人參巴戟鹽水浸各五錢白茯苓

苡仁炒各錢三後行經是脾氣之虛也水煎連服十餘劑不再洩水矣

行經之前一日大便先流血是經流錯也當歸洗酒白芍炒酒白朮炒土麥冬去心大熟地九蒸各五錢黑

經候

芥穗山茱萸二錢各人參三錢巴戟肉一錢鹽水浸升麻四錢水煎服二劑大腸血止而經即由前

陰而行矣服三四劑經止兼可受孕經水錯入大腸初起必若非於行經之際大便下

血過多精神短少人愈消瘦此脾不宜用補血湯嫩黃芪各一兩熟當歸身四錢白

朮土炒焦白芍三錢杜仲炒斷絲黑荊芥錢二薑炭一錢引用貫仲炭研一錢冲服

四劑必愈愈後減半再服二三劑治吐血暨經血逆行上出口鼻病未深者韭菜搗

汁一盞入童便半盞頓溫服

女人經閉已久晚蠶砂四兩炒微黃色好黃酒二斤

治女子經閉形容枯槁杭州麥冬去心四斤熬成膏何首烏半斤黑豆拌九蒸九晒為末

當歸四兩酒洗鹿茸五錢每服三錢漸和勻入麥冬膏內再加煉

經閉乾血等症神方雄雞一隻煮熟去肉取全骨一副即嘴爪俱要不遺再用童便生薑

在骨上仍留汁一小半將骨打碎又用香附末一兩同再焙仍將三汁陸續酒在骨上

陳修園加味四物湯熟地當歸酒洗川芎白芍炒酒加香附半製錢茯神二錢炙草四錢少則此

女科要藥也經血先期而至加知柏黃芩熱則加黃連後期而至加姜桂艾葉實者加

參白朮大虛而枯者再加鹿角膠牛膝更佐以人參養榮湯經行而腹痛者加延胡

澤蘭並汁童便若腹中素有痞飲食滿悶者除地黃加枳實半夏以經色紫者風也加荊防

白芷黑者熱甚也加苓連丹皮半夏及秦艽防風蒼朮如豆汁者加苓連或帶黃濁者濕痰

也或成塊作片血不變者氣滯也加枳實陳皮元胡色變紫黑屬熱者多屬寒者亦有之宜

察脈審症此若惡寒發熱頭痛有汗加桂枝湯帶下帶下俱是濕症而以帶名者

或飲酒而顛狂以下各條俱見傳山女科而單方則從壽世集驗諸書撮入不注書名帶下因帶脈不固不能約束或行房而放

白帶終年累月流白物如涕如唾不能禁止甚則臭穢乃濕氣感而火衰肝鬱而氣弱則

脾直下而氣不能自禁治法宜大補此宜用完帶湯白朮炒土山藥一兩白芍五錢人參二

車前子酒炒蒼朮三錢甘草一錢陳皮黑芥穗分五柴胡六分水煎服二劑輕四劑止六劑白

帶全愈倘未全效必係經水過期少腹急迫則當服寬帶湯丹皮當歸酒洗各

熟地九錢白朮一兩人參三錢肉蓯蓉洗淨冬肉杜仲黑白芍酒炒各巴戟肉酒補骨脂

鹽水炒五味分三建蓮二十枚水煎服四劑少腹無緊迫之狀服一月可受胎又單方

用鱖魚即桂六七十寸長者先洗淨破去腸肚不必復洗用胡椒一歲一粒鹽一分煮食

即愈以後再食胡椒照上畧加鹽酒亦可二三次尤妙又方棉花子半斤性燒存柏子

存一兩燒共為末空心淡酒下三錢又方用隔年冬瓜子仁炒研每服五錢空心白滾湯

下又方白扁豆炒為末每服二錢米飲下

青帶帶下色青甚則緣如菜豆汁稠粘不斷其氣白芍酒炒生甘草茯苓錢五茵陳梔子各炒

三柴胡陳皮錢各一水煎服二劑而色淡四劑而青綠之色絕不必過劑矣

黃帶如黃茶濃汁其氣腥穢乃任山藥炒芡實打碎炒黃柏鹽水炒車前子酒炒白果十粒

碎水煎連服四劑無不全愈此方治黃帶甚驗即凡有帶病者均可治之

黑帶

帶下而色黑甚則如黑豆汁其氣亦腥乃大熱之極其症必腹中疼痛小便時如刀刺陰門必發腫面赤必發紅日久必黃瘦飲食必兼人口中必熱渴飲以凉水少覺

寬快此胃大與命門勝於三焦之用利火湯石膏煨白朮五錢各車前子炒茯苓大黃王

不留行黃連梔子炒

劉寄奴錢各三知母錢二

水煎服一劑小便便疼止而通利二劑黑

帶變為白三劑白亦少減再服二三劑全愈矣愈後當節飲食戒辛熱調養脾土不可

恃有此方病發而服致傷元氣

赤帶

致帶下而色紅似血非血淋漓不絕是肝經之鬱火內熾下剋脾土脾土不能運化以

力故濕熱之氣隨氣下陷同血俱下所以有似血非血之形象也世杭白芍醋全當歸

人以赤帶屬之心火誤矣治宜清肝火而扶脾氣方用清肝止淋湯

酒洗各生地炒五錢阿膠炒丹皮錢各三黃柏牛膝錢各二香附一錢紅棗十枚黑豆一

水煎服一劑少止二劑又少止四劑全愈十劑永斷

赤白帶下

臍腹疼痛極效單方

名曰白芷二乾姜錢三共為末每服三錢空心溫米湯

調下

若肝經鬱結血虛火盛者宜用當歸錢二白芍錢五黃芩錢二煎服

赤白帶下單方

槿樹皮二切細以白酒一碗半煎一碗空心服而白帶用紅酒甚妙

又方雞冠花煎酒服赤帶用白花白帶用紅花又方建蓮肉炒去心海螵蛸去硬殼煨

共為末熱酒服又方馬齒莧搗爛擠汁三合和雞子清二枚先溫令熱次下莧汁微

溫頓服之不過再服即愈

赤白帶下經行不止

白芷一兩海螵蛸煨去甲胎髮一兩煨存性共為末每服二錢溫酒調下

血崩昏暗婦人有血崩兩目黑暗昏倒在地不省人事者人莫不謂火或動血然此非實火乃虛火耳不可一味止瀝須於補陰之中折止崩之法方用固本止崩湯

大熟地九白朮各一兩生黃芪錢三人參錢三當歸五錢黑姜錢二水煎服一劑崩止十劑不

再發若血崩數日血下數斗六脈俱無鼻中僅有微息不可遽投此方恐氣將脫不能

受峻補也有力者用人參去蘆錢三水煎湯冲貫仲炭末錢一溫服之彼氣息微旺然後再

服此方仍加貫仲炭末錢一服無不見效無力者用黨參六錢煎湯一盃加無灰酒半盃

冲貫仲炭末三錢服之待其氣接神清始可服此方

年老血崩五十以外血崩者宜用加減當歸補血湯生黃芪酒洗各一兩當歸三錢桑葉十四片水煎服二劑

血少止四劑不發然必斷色慾以前方增入熟地一兩白朮錢五山藥錢四麥冬錢三北五味錢一

服至百劑乃除崩漏之根亦有婦人年老血崩係氣冲血室但於原方中加貫仲炭末三錢極效勿多服後方

少婦血崩少婦雨娠三月即便血崩而胎亦墜多因行房不慎方用固氣湯人參一兩

白朮炒土熟地九錢各當歸酒洗杜仲三錢白茯苓錢二山茱肉錢二遠志去心甘草錢一五味

子炒十粒水煎服一劑而血止連服十劑全愈此方可通治非僅治小產血崩

交感血出婦人有一交合流血不止者皆因經水未淨陽精遽入白朮炒土熟地九錢各人參

山茱肉五錢茯苓各一兩車前子酒炒各三錢黑姜錢一黃柏分五水煎連服四劑效十劑全愈然

必須慎房事百日愈後仍加調氣血節色慾方不至再發成癆

鬱結血崩婦人有懷抱甚鬱口乾舌渴嘔吐吞酸而血下白芍炒醋白朮炒土當歸酒洗各一錢丹

皮生地酒炒三七根研末各三錢甘草黑芥穗各二錢柴胡一錢水煎服一劑嘔吐止二劑乾渴除

四劑血崩愈此方入貫仲炭三錢更妙

閃跌血崩婦人有升墜落或閃挫受傷以致惡血下流有如血崩之狀者然必手按之而疼痛久之面色痿黃形容枯槁乃是瘀血作祟並非血崩可比切切不可用補

濕之藥方用生地酒炒一兩炒大黃赤芍龜板醋炙各三錢當歸枳殼炒各五錢丹皮一錢桃仁泡炒研

水煎服一劑痛輕二劑痛止三劑血亦全止不必再服凡跌打損傷致唾血嘔血皆

宜如此治法若血聚胃中宜加川厚朴錢姜汁炒

血海大熱血崩婦人有每一交合經水即來一如血崩人以為胞胎有傷觸之以動其血也誰知君相二火因交感而煽動子宮血海因火熱而不固乎治法必須

滋陰降火以清血海而和子宮則終身之病可半白朮炒土大熟地九蒸白芍炒清元參乾桑

年而除矣葉必絕總百日而後效方宜用清海丸葉各一丹皮十兩山茱蒸地骨皮石斛山藥炒麥冬肉沙參各一龍骨北五味炒各右藥

各為細末合一處煉蜜為丸桐子大早晚每服五錢白滾水送下半載全愈此方久服

能使子宮清涼血海自固若徒以髮灰白礬黃連炭五倍子等藥末外治其幽隱之處

恐愈澀而愈流終必至於敗亡也

婦人血崩不止單方五靈脂不拘多少炒令烟盡研末以當歸酒或童便調下三錢甚效

又方用陳棕舊棕箱整過棉花子等分燒灰存性每用二三錢黃酒送下即止又方

旱蓮草新鮮者佳用二兩半煮雞食之立效又方枯礬黃丹各五錢綿絹包裹麻油抹

絹面線扎一團用線穿竹筒上仰卧入陰戶內將竹筒退出一炷香久即止止後將線

掣出藥團可也。又採取雞冠花子。白者治紅崩。紅者治白崩。每服五錢。焙微枯。黃酒

送下。又方棉花子焙焦為末三錢。黃酒調服兩劑全愈。又方甜杏上黃皮晒乾研

末。每服一錢半。空心熱酒調下。又方大薊根葉搗汁約半升溫服。又方貫仲切片

六錢。好黃酒一碗。煎至半碗。服之發汗立止。

血崩久甚不愈。

真紫降香三錢為末。水二鍾煎至八分。露半夜至雞鳴時熱服。出汗即愈。

治紅白崩。筋骨疼痛方。

三白草根一兩。精猪肉四兩。煮食即愈。此方同雞羹服。可治婦

人筋骨疼痛。

婦人血崩并失血。鼻血便血。

阿膠

蛤粉炒珠

當歸

瓦上焙乾

蒲黃

炒

澤泄各一兩。共為末。煉蜜為

丸。每服三錢。

婦人小便不通。

杏仁

去皮尖

麴炒黃。研細末。水調三服即愈。

婦人大小便不通。

大麥桿燒灰。水調二錢。服之二三次即愈。

陰冷。蛇床子

炒研

白粉

錢一

調勻如棗大。每用一枚。綿裹納入陰內。自然溫暖。

婦人陰癢或生濕瘡。

蛇床子

一兩

艾葉明礬五倍子杏仁

打碎各五錢

川連錢三錢。煎水先薰後洗。

即愈。

又方桃仁

爛

用綿裹塞之。

又方鯽魚切片。以稀布裹納入陰戶內。其蟲自出。

盡入布眼。治二三次。以出盡不癢為度。再用蛇床子朴硝

各五錢

煎水

二碗洗瘡。拭乾。以

乳香沒藥

各錢半

研末

加枯礬

六錢

分擦之。尤效。

陰痛 以青布裏鹽熨之

雞眼痛 地骨皮紅花二味共研細末麻油調敷患處效如神如成瘡者乾數次日即結

蓋 又方生葱剖開取有葱沫一邊貼在雞眼上包好三日愈

陰戶并糞門生白蟲 蜂蜜煉過二甘草研末二味和勻敷瘡處蟲自出即效再以蛇床

子一朴硝煎湯頻洗更效

婦女脚了及足底彎曲處作癢 枯礬錢熟石膏輕粉黃丹各三錢共研末開水候溫洗淨

擦之即愈 如破爛有膿水者葱湯洗淨用海螵硝去硬殼人中白錢冰片分三共為末

每一錢搽之愈

女子小戶嫁痛 海螵硝炙黃去甲研末酒調服二錢三次

女子乾血癆 唇紅腮白似桃花色骨瘦如柴相思亦有此病用啄木蟲十數瓦焙存性為末每用五分上好黃酒

調勻服之不過十日即愈

婦女乾血癆 三奇方遇用白鴿子一隻去肝腸淨入血竭一年內者一兩二年內者二

兩三年者三兩以針線縫住用無灰酒煮數沸令病人吃下瘀血即行如心中慌亂者

食白煮精肉一塊即止 又方用全蝎足燒灰存性研二錢空心黃酒送下三五日見

效 又方用削猪子腸燒灰黃酒送下不過二三服全愈

婦人陰吹症 大便猪膏半斤亂髮如雞子大三團和勻煎至髮消藥成分二服病從便出

此方兼治黃病燥結

婦人顛狂失心 明礬錢六 鬱金一分 共為末米汁為丸如桐子大每服五十丸白湯下

數服即愈

婦人各種風病腹中刺痛 紅藍花一兩 酒一大升煮至六分頓服一半未止再服

婦人氣血不調腰膝疼痛手足搖搦等症 全當歸酒炒 白芍酒炒 熟地酒炒 各錢半 川芎八分 天麻錢半

丁皮五分 水煎服 血分滯者加宣木瓜錢半 氣分滯者加川續斷錢半 有濕者去熟地

傷寒未愈交感病男人傷寒未愈陰毒在內常有行房而女人受毒得病者其症似傷寒

之立愈如用女人病而男子受毒者即用女人穢褻煎服

婦人眼病并以疎肝解鬱之藥佐之 新定開瞽神方以下兩條陳氏女科要旨 充蔚子隔紙 元參酒浸

兩香附為末 柴胡酒拌 澤瀉酒拌 防風用黃芪 白菊花各三兩 共為末煉蜜為

丸如梧子每服三錢菊花湯送下 又方枸杞子一斤 去蒂并取羊膽十個 用冬蜜兩

山泉水斤一 攪勻將枸杞子浸一宿取出蒸半炷香曬乾又浸又蒸晒以汁乾為度收藏

密貯勿洩氣每早晚各吞三錢桑葉湯送下

療癰頭上項側結聚成核累累女于善懷每多憂鬱宜逍遙散加貝母夏枯草牡蠣瓜蒌

一次艾如大豆樣灸 蠟蠟皮上其熱氣透癰再灸別處 如如 瘰癧瘰癧皮焦移易灸之三 五日 夏

枯草三斤 長流水入 鯽魚腹中煨 存性蜜和醋調塗上無不應效 如已 腐爛外貼萬

全膏方見外科內服此方或間服加味道遙散自愈此
症切忌刀針及敷潰爛之藥餘與男人同治詳外科

乳頭腫硬腫用鹿角夫燒灰存性研細末酒調服二錢外用葱白搗爛敷之即愈若結乳
拘多少搗爛敷之立效又方
蚯蚓糞以陳醋調塗患處即愈

乳癰并乳腫此男婦人患同治青橘葉百片青皮五錢柴胡一錢水二碗煎一碗入好酒一杯熱服

被蓋出汗立愈 又方香附末兩一好麝香分三研蒲公英三兩和酒煎服渣敷患處即消

乳癰初起尚未成形用生蘿蔔連根帶泥搗爛敷熱即更易二

乳癰良方兼治各種大毒

大當歸錢八生黃耆錢五金銀花錢五炙甘草八錢桔梗一錢黃酒二碗煎八分半飢半飽服

又治乳癰方兼治乳癰鮮蒲公英兩一連根搗爛取汁冲酒服以渣敷患處即愈如無鮮者以乾

者三兩煎服并敷亦可 又方以豆腐桌下做豆腐淋下水一桶傾入鍋熬乾成膏布蘸

搽上乾時再搽乳上結塊自消五七次必愈神效

乳巖二方此病先因乳中一粒大如豆漸大如雞蛋七八年後方破破則難治宜急服此藥并貼太乙膏

生蟹壳置炒鍋內焙焦為末早晚每服二錢酒調下數十日漸消又間服加味道遙散又加味歸

脾湯效 又方大瓜萸個一半生半炒酒二鍾煎至一鍾食後服外貼太乙膏此方兼治乳癰乳癰俱效

乙膏見外科

乳巖已破二方

荷葉蒂

七個煖灰存性

研末酒下

又方貝母核桃楸金銀花連翹

各三錢

酒水煎服

外貼俱宜

太乙膏

此二方只可偶用總宜多服

乳縮症

乳頭收縮內此肝受寒氣飲不舒

用生黃芪

一當歸

酒洗二錢

白芷防風各錢半木通乾薑各一肉

桂

去粗皮

研五分水二碗酒一杯煎七分服

乳卸症

此乳頭拖下長一二寸肝經風熱發泄也

用小柴胡湯

柴胡四錢

人參黃芩炙甘草生薑各錢羌活防

風

各一主之

外用羌活防風白斂燒烟薰之仍以草麻子四十九粒麝香一分同研

爛塗頂心

俟乳收上急急洗去此是怪症女人盛怒者多得之

加味逍遙散

柴胡錢

茯苓白朮

炒當歸

酒洗白芍

煨薑錢

一炙草

薄荷

各五分

加丹皮

黑山桅各一

加味歸脾湯

人參黃芪白朮

炒

遠志

肉當歸

酒洗一錢

木香

炙草

各五分

加

柴胡山桅

各一錢

陰挺

或時醫名之曰瘡陰中突出一物如蛇或如拳如苗如茄如雞冠或血水不斷或乾枯或痛癢或頑麻不仁南人患此多係濕熱下注初起宜內服加味逍遙散外貼黃

九

加減或間以當歸蘆薈丸外用蛇床子五錢烏梅肉九個煎水薰洗又以猪油調黎

織

盡毒之氣乘虛內侵積久而成治以古方多不剋效庸醫且操刀而不割遲快一時必致漸積成癰死而後

已

傷哉陳修園於此服外初患此証五苓散料加蜀椒黃柏小茴附子沙參川芎之類蜜

綠

四錢五味子雄黃各五錢桃花椒苦參蒼朮槐花煎湯入砒硝薰洗又以飛簪六兩銅

類

隨證出入加減亦有愈者前又方一易努肉自入

乳症

鬼胎

室女未嫁。月經忽斷。腹大如妊。面色乍赤乍白。六脈乍大乍小。多係邪鬼憑身。正氣日弱。或因羞憤而亡。或成癆瘵而死。誠可悲也。治法宜先祛邪。而後補正。方用蕩邪

散。雷丸六錢。桃仁六十粒。當歸一兩。丹皮一兩。甘草四錢。陳皮明雄黃二錢。水煎服。必下惡

物。半桶。再服。調正。湯未愈。宜約兩桂香。時久。即散。肉桂去粗皮。麝香各一錢。研細末。開水為丸。

如刺。若大。用空。心。開。水。服。宜。約。兩。桂。香。時。久。即。散。肉。桂。去。粗。皮。麝。香。各。一。錢。研。細。末。開。水。為。丸。

妙。各。三。錢。厚。朴。姜。汁。炒。枳。實。土。炒。又。方。治。夢。與。鬼。交。用。鹿。角。屑。三。錢。溫。酒。調。服。鬼。不。精。必。惡。

物。次。日。再。服。厚。朴。姜。汁。炒。枳。實。土。炒。又。方。治。夢。與。鬼。交。用。鹿。角。屑。三。錢。溫。酒。調。服。鬼。不。精。必。惡。

出。二。錢。佩。又。方。邪。物。憑。攪。用。絳。囊。盛。丹。砂。一。兩。麝。香。

去私胎

方。大。熨。麵。五。升。漬。酒。一。斗。煮。二。三。沸。去。渣。分。五。次。服。大。熨。麵。五。升。漬。酒。一。斗。煮。二。三。沸。去。渣。分。五。次。服。

斷產法

服。大。熨。麵。五。升。漬。酒。一。斗。煮。二。三。沸。去。渣。分。五。次。服。大。熨。麵。五。升。漬。酒。一。斗。煮。二。三。沸。去。渣。分。五。次。服。

調經

逐。瘀。補。虛。益。母。丸。服。大。熨。麵。五。升。漬。酒。一。斗。煮。二。三。沸。去。渣。分。五。次。服。大。熨。麵。五。升。漬。酒。一。斗。煮。二。三。沸。去。渣。分。五。次。服。

益母草

一斤。并。子。大。生。地。六。兩。洗。當。歸。三。兩。洗。白。芍。三。兩。炒。川。芎。五。錢。烏。側。骨。四。兩。炒。澤。蘭。葉。洗。酒。

四。香。附。童。便。浸。醋。四。次。水。茲。將。益。母。膏。和。羣。藥。加。煉。蜜。為。丸。如。熱。加。丹。皮。黃。芩。各。兩。梔。

子。一。兩。去。川。芎。如。寒。加。肉。桂。一。兩。粗。皮。砂。仁。一。兩。生。地。換。熟。地。氣。虛。加。人。參。白。朮。二。兩。各。香。

附。減。半。有。痰。加。陳。皮。法。半。夏。各。一。兩。熱。痰。加。麥。冬。心。去。川。貝。心。各。一。兩。半。經。閉。不。通。加。

延。胡。索。酒。炒。一。兩。桃。仁。六。錢。紅。花。錢。四。詳。察。病。情。餘。可。類。推。

調經種子

治。婦。人。不。育。加。味。交。感。丸。香。附。去。毛。水。浸。一。晝。免。絲。子。半。斤。酒。製。各。當。歸。童。便。浸。茯。神。各。四。

兩。共。研。為。末。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。早。晚。各。服。三。錢。米。湯。下。二。三。月。即。效。又。方。經。淨。之。時。

雨。共。研。為。末。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。早。晚。各。服。三。錢。米。湯。下。二。三。月。即。效。又。方。經。淨。之。時。

雨。共。研。為。末。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。早。晚。各。服。三。錢。米。湯。下。二。三。月。即。效。又。方。經。淨。之。時。

雨。共。研。為。末。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。早。晚。各。服。三。錢。米。湯。下。二。三。月。即。效。又。方。經。淨。之。時。

雨。共。研。為。末。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。早。晚。各。服。三。錢。米。湯。下。二。三。月。即。效。又。方。經。淨。之。時。

雨。共。研。為。末。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。早。晚。各。服。三。錢。米。湯。下。二。三。月。即。效。又。方。經。淨。之。時。

雨。共。研。為。末。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。早。晚。各。服。三。錢。米。湯。下。二。三。月。即。效。又。方。經。淨。之。時。

卽用月月紅根一兩以上者劈碎將未生過蛋母雞一隻去毛與腸水二大碗入

瓦罐封緊細木炭火煮二個時辰加鹽五分取出食雞肉並飲其湯得效如次月再食

一隻卽可受孕又烏賊魚肉久食令人有子又方烏賊魚骨去甲半斤蘆茹一兩共

研末以雀蛋和為丸梧子大食前以鮑魚汁送下三十九丸或用阿膠三兩酒化為丸米湯

送下亦效又方八珍湯照原等加益母草去下半截三錢煎服有胸滿悶者再加香

附酒分水煎服脾虛有滯者加砂仁分或加重等分蜜丸梧子大每服五錢米湯下效

身瘦不孕大熟地一兩當歸酒洗白芍酒炒山茱肉五錢水煎服至三月自可受孕以下六條見

身肥胖不孕是痰多濕之故用二陳湯合補中益氣湯茯苓五錢半夏錢三陳皮六分柴胡甘草各一錢

黃耆人參各三錢白朮一兩當歸二錢水煎服八劑痰涎盡消再十劑子宮潤出易於受孕矣

下部冰冷不受孕下身冰冷非火不煖交感時陰中絕無溫熱之氣是胞胎寒極必須補心腎二火方用溫胞湯白朮土炒巴戟鹽水浸

人參杜仲炒兔絲子酒浸山藥炒芡實炒肉桂去粗皮補骨脂鹽水炒附子製三錢

水煎服一月而胞胎熱可受孕矣若胞熱者不可服若改湯加重為丸早晚服三錢尤效

少腹急迫不孕自覺有緊迫之狀急而不舒不能生育是帶脈之拘急也宜服寬帶湯白朮土炒大熟地蒸巴戟肉酒洗

錢人參麥冬心去杜仲炒肉苁蓉淨洗白芍酒炒當歸酒洗補骨脂鹽水炒五味子炒

建蓮開二十粒心水煎服四劑少腹無緊迫之狀一月可受孕矣

骨蒸夜熱不受孕骨蒸夜熱通體火焦口渴舌燥咳嗽吐沫人以為陰虛火動誰知是骨髓內熱用清骨滋腎湯地骨皮酒洗丹皮沙

骨蒸夜熱不受孕骨蒸夜熱通體火焦口渴舌燥咳嗽吐沫人以為陰虛火動誰知是骨髓內熱用清骨滋腎湯地骨皮酒洗丹皮沙