

濟陰綱目卷之十四

關中

武之望叔卿父著輯

武林

薛

芳汝楫父訂正

西陵

汪

淇瞻子箋評

天都

查

望于周父叅閱

○泄瀉

郭稽中曰產後腹痛及泄利者何答曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於膏膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞瀉腸鳴或下赤曰肱脇臙脹或痛走不定急服調中湯立愈若醫者以爲積滯取之禍不旋踵謹之謹之

陳無擇評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之旣云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜怒憂思還從內性况勞役饑

飽皆能致病若其洞泄可服調中湯赤白帶下非此能愈各隨門

類別有三方

此十一法須

體酌純熟然

只用八方加

減可未要而

約矣而八方

之中以六君

子加味者五

補中益氣者

一而益黃四

神八味腎氣

等藥或兼或

肝真切減當

於此得心其

他亦可變通

矣又何患方

之不廣用之

不神歟

薛氏曰產後瀉痢或因飲食傷損脾土或脾土虛不能消食當審

而治之若米食所傷用六君加穀蘖若麪食所傷用六君子加麥

蘖若肉食所傷用六君加山查神麴丸兼嘔吐皆加藿香若兼噯

酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木來侮脾土用六君加柴胡枳

薑若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下陷兼補中

益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾土真氣宜加木香肉果若

脾土虛寒當用六君子加木香薑桂若脾腎虛寒用補中益氣及

四神丸若屬命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小便

瀯滯肢體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸以補脾腎利水道若腎

氣虛弱而四肢浮腫治須補胃為主若久而不愈或非飲食所傷而致乃屬腎氣虧損益胞胎主於杠而繫於腎况九月十月乃腎與膀胱所養必用四神六味八味三藥以補腎若用分利導水之劑是虛其虛也

一產婦漏痢發熱作渴吐痰甚多肌體消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹墜年餘矣余以為脾胃瀉朝用二神丸夕用六君子三月餘而痊

一婦產後泄瀉兼嘔吐噦酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君子炮薑為主佐以越鞠丸而噦酸愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康

一產婦泄瀉年餘形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌糜爛日吐

六君加木香
薑桂而此止
加炮薑一味
為主是又不
必拘於一定
之法矣

此法據前條
止用補中四

神而此又加
一十全大補
可見須因在
用藥毋執泥
也

此症若只擬
前法而用六
君補中不用
升陽益胃使

痰三碗許脈洪大重按全無此命門火衰脾土虛寒而假熱也吐
痰者乃脾虛不能統攝歸源也用八味丸補火以生土用補中益
氣湯兼補肺金而脾胃健

一產婦腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不進與死為鄰此脾
腎俱虛用四神丸十全大補湯而愈但飲食難化肢體倦怠用補
中益氣而康

一婦人五月患痢日夜無度小腹墜痛發熱惡寒用六君子湯送
香連丸二服漸愈仍以前湯送四神丸四服全愈至七月終怠惰
嗜臥四肢不收體重節痛口舌乾燥飲食無味大便不實小便頻
數酒慄惡寒悽慄不樂此肺與脾胃俱虛而陽氣虛寒不沛也用
升陽益胃湯而痊

非范法故知
立言之中有
不言之妙所
謂言不盡意
也
丹溪云泄瀉
症最惡一切
湯飲石山亦
然所謂理無
二致也

汪石山治一婦產後滑泄勺水粒米弗容時即泄下如此半月餘
眾皆危之或用五苓散平胃散病益甚汪診之脉皆濡緩而弱曰
此產中勞力以傷其胃也若用湯藥愈滋胃濕非所宜也今以參
苓白朮散除砂仁加陳皮肉豆蔻煎薑棗調服旬餘而安

調中湯 治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛世瀉不止

良薑 當歸 肉桂 白芍 川芎
酒浸 火炒 不見火

附子 人參 甘草
炮去皮尖 各一兩 炙各半兩

右吹咀每服三錢水煎服

荳蔻理中丸 治產後元氣虛弱臍腹疼痛泄瀉不止又治男子

脾胃虛弱久泄不止

人參 白朮 乾薑 甘草 肉豆蔻
兩 兩 炮 炙各五錢 七錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四五十丸空心米飲下酒者

麪糊丸亦可

神効參香散 治產後脾胃虛寒泄瀉洞下及痢疾日久穢積已

盡滑瀉不止此收澀如神

人參

木香各二錢肉豆蔻煨

白茯苓

白扁豆各四錢

陳皮

罌粟殼去帶穢醋炙各一兩

右為細末每服一錢七清米飲調下食遠服

此收澀之劑陳皮與罌殼相等得處方之妙

萬歷己亥余官金陵內人十二月產難經宿始分娩越旬日洞瀉點水入口即下為人恐懼大哭自謂必死余偶有此藥用一錢以米飲調服纔下咽瀉即止真起死迴生之藥也

○痢疾

大全云產後痢瘕由產勞傷臟腑不足日月未滿虛之未復或

源未爲熱青
之爲素此古
人之論自河
間論出不分
五色物以爲
熱是古今不
同歟大槩始
於傷治久變
爲熱故熱者
多而寒者少
未可執以無
寒也必因症
求之爲當

勞動太早或誤食生冷若行起太早則小傷風食乘虛入於腸胃
若誤食生冷則難化之物傷於脾胃皆令洞泄小瀉甚者勢爲痢
也若血滲入大腸則爲血痢難治世謂之產子痢也得冷則白或
如魚腦得熱則赤黃或爲驟血若冷熱相搏則下痢赤白或膿血
相雜若下痢害色則極冷也若飲食不進便利無常日夜無度產
後本虛更加久痢不止無力瘦之愈見羸弱謂之虛羸下痢又有
產後氣血不順而下痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則
溫之冷熱相搏則調之滑者澀之虛羸者補之水穀不分者當利
小便若產婦情性執着不能寬解須當順其氣未有不安者也
薛氏曰前證白屬氣分而赤屬血分也其論詳見瀉利
一產婦食雞子腹中作痛面色青黃服平日二陳更下痢腹脹服

若果脉大無

力可不溫補

而乃用黃芩

芍藥湯者以

纏墜極痛之

症為積滯未

去也故從症

不從脉焉

凡理氣虛不

能致津液以

養臟腑而渴

者宜一味日

水煎湯伐茶

庶無水腫之

患

理尋愈

流氣飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木剋
侮所致用補中益氣加木香吳茱萸漸愈又用八珍大補兼服調

一婦產後痢未至月滿因食冷物及酒冷熱與血攻擊滯不純血

纏墜極痛其脉大無力口乾用黃芩芍藥湯三服而安

產後下痢作渴者水穀之精化為血氣津液以養臟腑臟腑虛燥

故痢而渴若引飲則難止反溢水氣脾胃既虛不能剋水水自流

溢浸漬皮膚則令人腫止其渴痢則自瘥

薛氏曰痢證若渴而不欲飲食屬胃氣虛不能生津液宜用七味

白朮者夜間發熱口渴常覺水弱而不能潤宜用六味丸並佐以

益氣湯以滋化源

此以因物湯
去用芍加艾

膠所以止血

也而歸甘各

用三兩為君

所以和氣血

而止腹痛耳

妙在甘以緩

之

一方一為氣

虛一為血虛

則前方妙在

於兩此方重

狂虛滑不然

麥木栗殼豈

吊試之味

口頭翁湯原

世景治協熱

要痢藥而脉

經加膠甘以

救急散 治產後赤白痢腹中絞痛

白芍 阿膠 艾葉 熟地黃各一兩 當歸

甘草各三兩

右吹咀水煎分二服空 心飲

加味四君子湯 治產後赤白痢神効

人參 白朮 白茯苓 甘草炙

黃蓍各一錢

瞿粟殼炙去蒂五分

右劉水煎

以上二方治虛滑

白頭翁加甘草阿膠湯 治產後下痢虛極脉經作熱痢重下新產虛極者

白頭翁 甘草炙 阿膠炒各二兩 黃連 黃蘗

治熱產極虛
然非熱痢
血其敢用乎

前以巨君栗
壳治氣虛而
滑此以四物
栗壳以治血
熱虛滑氣血
之分智者自
辨而止溢之
劑非滑勿投
慎之
此方以三葉
解毒為主非
真熱勿用辨
之

秦皮 去皮各三錢

石剉作二服水煎納膠令消盡溫服

槐連四物湯 治產後熱滑血痢臍腹疼痛

當歸

川芎

赤芍藥 炒

生地黄

槐花 炒

黃連 炒各一錢

御米穀 去蒂蜜炙五分

石剉水煎服

黃連丸 治產後熱滑赤白痢腹中攪痛不可忍

黃連 四兩

黃芩

黃栢 各二兩

梔子仁

阿膠

蒲黃 各一兩

當歸 二兩半

右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸米飲下日三夜一

以上三方治熱滑

以下山字
字真切不落
神効參香散
治痢疾日久
穢積已少
腹中不痛
或微痛不
寢

一左用此方
有須知集方
滑溜不止
乃收功之後
藥也

之心所謂無
妄之藥勿試
方見前泄瀉

一方 治產後血瀉不禁
餘血作痛
兼塊屬寒滑者

以血瀉而用
委桂人所難
信而謂寒滑
不禁又所當
增夫學道愛
入用方者宜
休認之
此方以神仙
感應為名必
非虛語然以
為食葷土而
致泄者腥虛
必薄故用參

右為末
空心酒調服
方寸七

以上二方
治寒滑

神仙感應丸
產後固無積痢
多有因食葷味
早亦作瀉痢者
百

無一生非此方
不能救之三三
服立止不然
荏苒日月致不
救

也如不因食葷
者不可服

神麴錢
一人參
枳殼
各一錢
赤石脂
熟地

而神藥為食之用也

佐之亦石固之似矣

熟地何為大抵賢者

之問產後虛氣不能

故用之歟食軍不食

可服不可之理自非

人所知治積方不

而此所集一用地黃

脂此用連好墨亦大

溫氣行氣也其他不

白朮各二錢

右為細末每服三錢空心米飲調下

連翹丸 治產後久病赤白痢益因脾胃不和氣滯積聚所致心

腹脹滿乾嘔酸心飲食不下胸膈噎塞脇肋疼痛危困者

連翹 陳皮去白 京三稜各錢半 肉桂不見火 檳榔

牽牛子取頭末 蓬朮 青皮去白名一錢 肉荳蔻麝裏煨 好墨各半兩

右為細末麝糊丸如桐子大每服三十丸米飲下或用水煎服

亦可

以上二方治積痢

三聖散 治產後下血痢不止

烏魚骨

燒綿灰

血餘灰

汗脂者各等分

右爲細末每服一錢煎石榴皮湯調下熱服

一方 治產後痢日五十行者

取木裏蠶糞炒黃急以水沃之令稀調得所服之卽愈

治產後諸痢雜方

取蒼耳葉搗汁半盞口三四溫服

一方煮薤白食之

一方羊腎脂炒薤白空心食之

一方敗龜板一枚米醋炙研爲末醋湯調下

治產後血痢雜方

一方用阿膠二兩以酒一升半煮二升頓服

一方用生馬齒莧搗汁二大合煮二沸下蜜二合調頓服

以上雜治方

必効方 療產後痢而渴飲無度數

清心生津

麥門冬三兩

烏梅二十箇

右細剉水一升煮取七合細呷

經効方 療產後久痢津液涸渴不止

龍骨十二分

厚朴

茯苓

黃耆

門冬

人參各八分

生薑

六分

大棗

十四枚

右細剉以水一大斗煮取七合空心分兩服

錄驗方 療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥

冬瓜一枚黃泥糊厚五寸煨爛熟去皮絞汁服之痊

七味白朮散 治產後痢津液竭渴不止

爲消渴所宜
故服之

大和脾胃以生津

方見前渴

以上治痢疾發渴

○大便秘澁

郭稽中曰產後大便秘澁者何答曰產後水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澁不通也若過五六日腹中悶脹者此乃燥屎在臟腑以其乾澁未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以爲有熱投之寒藥則陽消陰長變證百出性命危矣

薛氏曰前證因去血過多。大腸乾涸不可計其日期飲食數多而用藥通之。必待腹滿覺脹欲去不能者。乃結在直腸宜用猪膽汁潤之。若服若寒疎通之劑。反傷中氣。或愈加難通。或通而不止。或成痞證也。若去血過多者。用十全大補湯。若血虛火燥者。用加味

四物湯氣血俱虛者用八珍湯雖數日不通飲食如常腹中如故仍用八珍加桃仁杏仁治之若泥其日期飲食數多而通之則誤矣

一產婦大便不通七日矣飲食如常腹中如故余曰飲食所入雖倍余數腹不滿脹用八珍加桃仁杏仁至二十一日腹滿欲去用猪膽汁潤之先去乾糞五七塊後皆常糞而安

一產婦大便八日不通或用通利之藥中脘脹痛飲食甚少或云通則不痛痛則不通乃用蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾腎復傷用六君加吳茱萸肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然多致不起

一產婦大便秘結小腹脹痛用大黃等藥致吐瀉不食腹痛胸痞