

75 200

75 200

75 200

75 200

75 200

75 200

75

75 200

痘疹傳心錄卷之十八 附慈幼心傳

松江李林馥啟賢氏重校

瘦樵程永培校

脾胃

夫人以脾胃為主胃屬陽主氣脾屬陰主血胃司受納脾司運化胃為水穀之海飲食入胃脾乃化生精氣津液上升糟粕下降斯無誤矣至癸丑兒丸賴胃氣而生若脾胃失節則脾胃受傷胃傷則不能納脾傷則不能化脾胃俱傷納化皆難而臟腑俱失所養則病生矣故諸病先觀胃氣人生氣血臟腑百骸皆由胃氣而生也又云有胃氣則生無胃氣則死故東垣發脾胃之論使人常以調理脾胃為主若面色晄白血無精光口氣冷少食肌瘦此胃氣虛寒也用小異攻散六君子湯若便溏者兼脾虛也加炮薑藿香溫之中滿者脾不運也加木香開之若喜冷便秘面赤煩渴此胃氣實熱也用瀉黃散清之若命門火衰不能生土者用八味丸補之若稟賦胃氣不足用補中益氣湯八味丸益之若乳母乳汁清稀致兒肌瘦骨立大便溏瀉當易乳母得乳汁濃厚者為佳宜用小異攻加升麻麥芽主之否則胃氣有傷藥雖對症亦不能運化藥力以成功是以東垣以脾胃為主也凡治小兒之病當先審其胃氣至於脾胃泄瀉劉河間則為瀉屬溼惟用苦溫苦寒之藥苦寒瀉溼熱苦溫除溼寒泄止後脾胃虛弱方用參朮等甘溫之藥補之若初泄而便用參朮等藥則甘溫能

生溼熱而反助病邪世人不識往往多用此以為補誤人多矣

一兒十三歲嗜食食後飽脹難化此胃火旺脾陰虛也用人參白朮枳實芍藥石膏甘草黃連香附木香而愈

一兒泄瀉咸用六君子加澤瀉肉果不效余謂甘溫能生溼熱故不愈用甘草芍藥黃連茯苓陳皮柴胡甘寒之藥而瀉止但口渴面色青白此脾胃不足用小異攻散加升麻柴胡而愈

不寐多困

小兒不寐皆由胃氣不和血氣不從故不寐之症生矣治用六君子加遠志酸棗仁又歸脾湯肝腎虛熱者用六味丸心血不足振悸不得眠者真珠母丸精神短乏者人參安神丸胆虛者人參竹葉湯肝火不寧者加味小柴胡湯病後餘熱者當辨虛實治之有因他症不寐各當詳之又多睡者皆由脾氣虛弱健運之令不行而嗜卧也治當溫補其脾脾氣旺則臟腑清陽之氣升舉易於運行何困倦之有治用四君子加木香半夏白朮倍之若脾倦多驚者乃心血虛而火動也治宜安神養血為主若心脾氣虛有疾者用人參麥冬五味茯苓以補心氣當歸芍藥酸棗仁以養心血橘紅半夏以開痰若脾肺氣虛有疾者用補中益氣湯又胆星天竺丸若飲食停滯而然者四君子湯加山查麥芽神麴若脾虛好睡用歸芍六君子湯若乳母飲酒

致兒昏睡者用乾葛陳皮解之不應用四君子加葛根子母並服

人參竹葉湯

人參 竹葉 甘草 半夏 小麥 麥冬 粳米

生薑 水煎服

加味小柴胡湯

即小柴胡湯加山梔丹皮

膽星天竺丸

膽星二兩 半夏 白附銖五 天竺黃三錢 天麻 防風銖二 辰砂一錢

右為末甘草膏丸芡實大每一丸薄荷湯化下

人參安神丸

人參一錢 當歸三錢 麥冬三錢 黃連二錢 生地三錢 硃砂二錢 茯神二錢

棗仁二錢

右為末豬心血丸如芡實大硃砂為衣燈心湯化下

腫脹

小兒腫脹未有不因飲食內傷脾胃虧損而致者其症有二曰氣腫曰水腫氣腫者由脾胃虛弱脾主肌肉肺主皮膚土弱不能生金致虛氣上攻於肺行於面目遍身

浮腫也治法調脾行氣為主五子五皮飲水腫者因上焦煩渴引飲而脾虛不能約制其水水反侮土土隨水行上衝於肺流走於脾膚而光腫也治法實脾利水為主胃苓湯至於喘脹兩條須分先後節齋曰先喘而後脹主於肺先脹而後喘主於脾蓋小便之行由肺氣降下而輸化也若肺受邪而喘則生降下之令故小便短澀以致水溢皮膚而腫滿矣此喘為本而脹為標也治宜清金降氣而行水兼之脾土惡溼土能尅水若脾土受傷不能制水水既上溢則邪反侵肺氣不能降而生喘矣此脹為本而喘為標也治宜實脾行水而清金兼之苟肺病而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病而用清金之藥則脾得寒而脹益甚近世治喘脹但知實脾行水而不知分別脾肺二經誤矣又有脾胃虛弱溼熱積而為腫者用瀉黃散胃苓湯又有瀉後痢後瘧後痘後諸病後脾虛發腫者宜調補脾胃為主六君子湯補中益氣湯又有脾腎虛寒不能司攝而水泛行如蠱脹者用加減腎氣丸補命門火以生脾土間服六君子湯又有遍身膿瘡發腫治宜先去溼熱次用敗毒散以解表邪或問曰小兒水腫俗云河鯽用草藥煎洗又用雞子清口含吸臍并手足指頭前後心而愈者何也曰此內症已平但表受水溢浴洗則肌暢肌暢則微汗邪可散而愈也若內症不平浴洗雖愈未幾必復腫矣

一小兒遍身光腫余審其能食便調身熱脉浮謂曰內症平和此水氣在表宜解散

之用敗毒散去人參加紫蘇陳皮令汗出自漸消而愈總之斯症當辨經絡虛實標本先後而治不可拘泥

一小兒瘡後遍身浮腫咸謂脾虛用六君子湯加黃連芍藥木通腹皮鱉甲澤瀉木香煨薑不效發熱煩渴或謂土燥而又進以燥劑面目浮腫愈甚宜苦寒之劑潤之用芍藥花粉知母黃連柴胡生地茯苓木通漸愈

草藥方 浴洗水腫

河鱗草 車前子 野紅花根 芭蕉葉 枇杷葉 枸橘葉各一把 煎湯洗浴

稠柳餅 治水腫

稠柳子 梗葉似梅七八月採子曬乾

右為末每用之兩大米粉和作餅蒸熟食之弱和腫消愈

腹痛

小兒腹痛有飲食停滯而脹痛有積滯作痛有蟲痛有火痛有寒痛有虛痛有腸胃中生癰毒而痛有盤腸內吊痛不可不辨 飲食停滯而痛者皆由飲食不節或過餐堅硬之物脾弱不易剋化而腹脹痛也其候按之堅痛身熱惡食治宜消化之劑香砂丸消導二陳湯甚則以遇仙丹烏犀丸下之 積痛者皆由飲食自倍脾虛不運停滯中脘久而成積腹痛欲便便下酸臭便後痛減或閉澀其症面色痿黃身熱

不思乳食足冷嗜卧治宜遇仙丹下之下後以小異攻散和之若成癖痞治見癖條
蟲痛者有蛻蟲長尺許或五六寸居胃脘之間動則吐清涎撲身啼哭面黃唇白
時痛時止治宜安蟲飲烏梅丸又寸白蟲居腸胃之間動則傷人精氣又有一蟲形
若細絲或飲食中誤吞油髮所變亦居胃中動則腹中刺痛不可忍皆由恣食肥甘
煎燖濕熱鬱遏所致并用史君子丸又有血驚動則刺心而痛面黃肌瘦能食皆由
過食堅硬之物不化為血裏成形漸大而活久則殺人治宜追蟲取積散下之○火
痛者口中氣溫面赤壯熱飲冷治用瀉黃散利之○寒痛者口氣冷不思飲食嘔逆
泄瀉此寒水侮土也治用六君子加炮薑肉桂甚則加附子○虛痛者消導後其腹
尚痛按之不痛是也治用小異攻散補之若痛連兩脇乃肝木乘脾也用四君子加
柴胡芍藥主之○腸胃中生瘰毒而痛者皆由脾虛積熱氣血凝滯所致方論見外
科條 盤腸內吊痛論見前本條

一女子十五歲胃脘痛甚則號哭嘔吐清涎或半月或月餘而發患此數年醫藥不
效余用張義古文錢 三分同好核桃肉半個油核桃肉半個同研爛好酒調下
其痛反甚痛漸行下至小腹便行一二次即愈此芝田先生傳也若氣鬱食滯而
發者用傳心錄內治心氣痛藥一服利下即愈此僧徹空傳也

一兒歲餘號哭不已醫藥不效余謂色脈俱好審其仰身則哭甚合身稍止活幼曰

若嬰兒色脉俱好而病者必有他故細揣背上微紅腫以手按之大哭用針撥開
摘出乃竹刺也痛定即安

追蟲取積散 治蟲積

牽牛二兩 雷丸一兩 木香五錢 蕪荑五錢 蓬朮五錢 錫灰五錢 大黃二兩

史君子錢 檳榔一兩 乾漆五錢

右為末每用一錢好酒調下或麵糊丸麻子大天明猪肉湯送下大小加減

烏梅丸 治蛇蟲動痛

烏梅個三十 細辛 桂枝 黃柏 乾薑 黃連銖一 當歸

蜀椒

右為末酒浸烏梅一宿去核蒸之用水飯搗和丸桐子大每用二十九空心白滾
湯送下

諸熱

經曰陽勝則外熱陽虛則外寒陰勝則內寒陰虛則內熱陰陽相勝則寒熱往來又
曰陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒陰陽不歸其分則寒熱交爭也發熱治
法宜辨所因有因外感風寒而熱者有感疫毒之氣而熱者有中暑而熱者有注夏
而熱者有感溼而熱者有驚風而熱者有飲食停滯不化而熱者有疳積而熱者有

五臟之熱有氣虛發熱有血虛發熱有潮熱有骨蒸熱有表熱有裏熱有痘疹發熱有諸病後發熱有瘡瘍發熱有變蒸發熱○傷風而熱者頭疼鼻塞聲重喘嗽痰涎惡風手背熱治宜芎蘇散表散之○傷寒而熱者初發頭疼目痛身體拘急耳聾脇痛惡寒發熱治宜麻黃桂枝湯表之○疫厲而熱者皆由元氣不足感乖疹之氣治宜正氣散敗毒散十神湯五瘟丹截瘧丹方見十五卷○中暑而熱者長夏溼熱之令人感之則四肢困倦精神短少胸滿氣促乳食不思身熱頭疼自汗煩渴經曰靜而得之為中暑動而得之為中熱中暑者用清暑益氣湯中熱者黃連香薷飲十味香薷飲夾食者本方加消導藥暑瀉六和湯益元散○注夏而熱者皆由脾胃不足遇長夏潤溽之令則不能升舉清陽健運中氣又少陽相火之時熱傷元氣則肢體怠惰四肢痿弱嗜卧發熱精神疲倦飲食少思口中無味小便赤澁大便不調名曰注夏皆由稟元氣不足而然也治宜補中益氣湯去升麻加炒黑黃柏麥冬又生脉散主之○感溼而熱者經曰諸溼腫滿皆屬脾土夫溼之為病有從外感而得者或處卑溼之地而得者或逢遇風雨而得者或汗溼沾衣而得者或恣飲酒漿醴酪而得者或多食柑橘瓜菓之類而得者治宜滲濕湯茵陳五苓散羌活勝濕湯又曰溼在上宜微汗之在下宜利小便使上下分消其溼自除也故曰治溼不利小便非其治也○驚風而熱者論見驚風條○飲食停滯而熱者論見傷食條○疳積而熱者

論見疳症條○五臟之熱者心肝脾肺腎也心熱者額赤心煩手心熱或壯熱飲水噦惡巳午時益甚導赤散肝熱者左頰赤便難轉筋尋衣捻物多怒多驚寅卯時益甚瀉肝散脾熱者鼻赤倦怠嗜卧身熱飲水過夜益甚瀉黃散肺熱者右頰赤手指眉目喘咳日西熱甚瀉白散腎熱者頰赤足熱甚骨蒸如蟲蝕夜間益甚六味地黃丸○氣虛發熱者氣短不續面色青白自汗乳食少思手足指冷午前熱甚治宜小異攻散補中益氣湯○血虛發熱者發熱惡寒兩頰赤色唇口鮮紅四肢無力午後熱甚治宜四物湯又地黃丸滋肝腎○骨蒸熱者身體虛羸遇晚發熱微汗方止用補中益氣湯加地骨皮青蒿鱉甲又六味地黃丸主之○潮熱者如潮水之應期而至也有風寒疳積食痞之分陰陽虛實五臟之異各當詳辨○表熱者陽盛則外熱以手輕捫之則熱重按之不熱此皮膚血脈之熱熱在表也壯熱惡風寒為元氣不足表虛熱也壯熱不惡風寒為外邪客表表之實熱也○裏熱者以手按之筋骨分則熱輕手則不熱此筋骨之熱熱在裏也壯熱煩渴飲水溺赤便結裏實熱也壯熱飲水溺數裏虛寒也○痘疹發熱者呵欠悶瞋時發驚悸乍涼乍熱兩腮頰赤目淚汪汪噴嚏昏睡嘔噦搐搦耳聾俱冷也○諸病後發熱者當辨虛實經絡而治之○瘡瘍發熱者論見本條○又有乳母七情厚味飲食停滯遺熱於兒而發熱者或小兒恣食肥甘或衣衾過暖或頻浴熱湯積熱於內而發熱者各當詳之乳下嬰兒當兼

治其母又小兒未斷乳母復有孕兒飲其乳肌肉羸瘦髮黃壯熱大便不調名曰魃病有曰繼病令兒斷乳用消乳丸導之小異攻散補之有曰變蒸之熱輕則發熱微汗其狀如驚重則壯熱吐瀉煩渴啼哭此變蒸也不須用藥○凡治諸熱宜用溫平之藥和其裏則體熱自除但不可用大寒之劑攻之熱退則寒起變為他症慎之一兒感時氣身熱用發散之劑而熱不退余用甘草芍藥黃芩黃連防風知母花粉元參而愈

滲瀝湯

黃芩

黃連

山梔

防己

白朮

蒼朮

青皮

陳皮

赤茯苓

澤瀉

茵陳

猪苓

水煎服

羌活勝瀝湯

羌活

獨活

防風

川芎

藁本

甘草

黃柏

蔓荊子

蒼朮

水煎服

痘病

諸痘項強皆屬於瀝諸暴強直皆屬於風痘之為病瀝為本風為標然小兒痘病多因驚駭停食或乳母六淫七情飲食失宜所致更當審之兼治其母若面目赤色無汗惡寒牙關緊急肢體反張一身強硬痰涎壅甚小便赤澀終日不甦先諭語而發

者名剛瘧風性剛急故也若大便滑泄不語不渴有汗不惡寒先四肢厥冷而發者名柔瘧溼性柔和故也並以小續命湯剛瘧去附子柔瘧去麻黃若壯熱譫語口渴手足微冷大便溏泄此兼剛柔如無汗用葛根湯有汗用桂枝加葛根湯若痰壅氣盛用南星半夏茯苓以清痰枳實陳皮紫蘇以順氣熱輕者用敗毒散熱盛者用小柴胡湯剛瘧內熱便秘用大承氣湯下之大柴胡湯解之柔瘧用附子理中湯溫之六君子湯補中益氣補之若延綿則難治也又有大病後筋脈攣急而為角弓反張此血脫無以養筋不可作風治宜用黃耆當歸煎亦用四物湯加附子防風羌活

小續命湯

麻黃

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草

杏仁

防己

官桂

防風

附子

水煎服

敗毒散

柴胡

前胡

川芎

枳殼

羌活

獨活

茯苓

桔梗

人參

甘草

生薑

水煎服

葛根湯

治剛柔瘧無汗惡寒

葛根

麻黃

赤芍

豆豉

蔥白

水煎服或加羌活防風

桂枝加葛根湯 剛柔有汗

葛根

赤芍

甘草

桂枝

水煎服或加羌活防風

諸血

經曰肺朝百脉之氣肝通諸經之血又曰氣主煦之血主濡之蓋榮血者水穀之精氣也灌溉臟腑調和百脉若脾胃有傷榮衛虛弱行失常道故血妄行從胃上溢為吐血從胃上溢為吐血從肺上溢為衄血又吐咯血者出於腎也咳嗽血者出於肺也降下則便血溺血未有不因熱而得也然小兒或稟賦積熱或乳母六淫七情厚味積熱傳兒或兒恣食肥甘煎燂積熱而致或感殄厲之氣而血滲溢所致或居重輦暖閣火氣薰逼不令常見風日積溫成熱所致治法若氣虛者用四君子補之氣血兩虛者用四物加參朮腎虛者六味地黃丸肺胃熱者犀角地黃丸黃連解毒湯衄血者此脾胃傳熱於肺而不能統也宜用六君子加甘桔當歸山梔黃芩吐血者胃中積熱也麥門冬飲清胃湯犀角地黃丸若血去多煩燥脉洪大按之如絲尋衣撮空無氣以動乃血脫也經云血脫益氣宜用加減八味丸又獨參湯加附子便血者糞前見血為近血乃大腸積熱也用黃連解毒湯加炒槐花糞後見血者為遠血乃胃中積熱用清胃湯久不止者用補中益氣湯加黃連瀉血者如實熱用清心蓮子飲虛熱用六味地黃丸若稟父腎燥者用六味地黃丸乳母積熱者用加味清胃

散鬱怒者加味小柴胡湯憂思者加味歸脾湯俱加漏蘆子母並服○凡治失血當審氣血虛實病因隨經施治不可見其血盛以為熱劇過投涼藥使血受寒不能歸源而妄流其色紫黯而凝滯也

一兒痢後脾虛糞後有血久不愈用小異功散加升麻黃連愈

一兒十五歲便血身熱為腸風下血用生地芍藥丹皮荊芥苦參黃連條苓十劑愈
麥門冬飲 治吐血久不愈

五味 麥冬 黃耆 當歸 人參 生地 水煎服

清心蓮子飲

黃芩 麥冬 骨皮 車前子 甘草 茯苓 黃耆

石蓮肉 人參 柴胡 水煎服

歸脾湯 治脾虛健忘驚悸憂思

人參 茯苓 龍眼肉 黃耆 棗仁 白朮 當歸

遠志 木香 甘草 生薑 紅棗 水煎服

汗

夫汗者心之液內經主於心東垣主於胃蓋心為君火主熱胃為中土主溼溼熱相搏為汗明矣其自汗者無時而出動則為息屬陽虛胃氣之所司也盜汗者寢中通

身如浴覺而方知屬陰虛滯血之所主也自汗宜補陽調衛補中益氣湯加麻黃根浮小麥門冬盜汗宜補陰降火四物湯加黃耆小麥黃連蓋小兒氣血未充膚腠未密若厚衣溫暖薰蒸臟腑而生熱熱搏於心為邪所勝故液不能內藏薰出肌膚則為盜汗也又有傷於冷熱冷熱交爭陰陽不順亦令睡中汗出其間有虛有實不可不辨○又有脾虛泄瀉自汗身冷而出有時遇瀉則無瀉過則汗此症大虛治宜六君子湯附子理中湯主之○有肺虛自汗因久嗽肺氣虛上壅而汗出治宜補肺調脾為主○有慢驚自汗其冷如水最為惡候治同慢驚○有客冒風寒發熱汗出治見傷風條○有因傷風醫過表散致表虛自汗者宜保元湯主之

黃疸

內經曰諸溼腫滿皆屬脾土又曰黃色屬脾蓋小兒黃疸皆由飲食所傷又溼熱之氣蘊積於脾胃蒸發而成也其候面目指爪小便偏身著物皆黃是也治宜去脾家溼熱積滯且補散遇仙丹之類溼甚者茵陳湯利之又有爪目不黃而偏身皆黃弱赤者乃脾溼勝而為之黃病治宜瀉黃散等主之○有病後脾虛發黃肢體浮腫者宜六君子湯加茵陳主之

茯苓滲溼湯

治小兒食疸

四苓散合平胃散加黃連山梔仁茵陳山查麥芽枳殼

茵陳湯 治黃疸

茵陳 山梔

大黃

水煎服

瀉黃散 治脾經溼熱

黃連

茵陳

黃柏

黃芩

赤苓

山梔

澤瀉

水煎服

朴硝膏 治小兒大人黃疸

用朴硝四茶匙以雞子一個攪勻用井水和勻一碗每日空心服用七服為率

弱者間一日服

草藥方 治大人小兒黃疸

地蜈蚣草

四兩連根

挂山龍草

四兩連根

右剉用白酒連瓶煮熟空心服

小棗丸 治大人小兒黃疸

厚朴

四兩

蒼朮

八兩

陳皮

四兩

甘草

二兩

綠礬

四兩

透明者以黃

米粉四合同炒乾

右為末棗肉丸如桐子大每用五十丸空心清米湯送下

惡核癰癰

皆由風熱毒氣所干與氣血相搏鬱結成核如貫珠於耳項之間不消不潰若復客風熱搏於津液則潰化濃血此屬肝胆二經部分治宜滋腎水清肝火皂角子丸柴

胡清肝散若因疳積所致用疳積散六味肥兒丸若脾虛而肝木乘之面色清白用
小異攻散加蕪荑柴胡川芎白芍若潰而不斂乃氣血虛也用益氣養榮湯外用松
香海鯉鮪為末香油調搽

皂角子丸 治肝膽風熱癰瘰

皂角仁二兩連翹八錢當歸

柴胡

白芍藥

山梔

川芎

膽星

紫背天葵 各一兩

龍胆草

甘草

桔梗

錢各四

右為末米糊丸小豆大每用一錢白湯送下

皂角膏 貼惡核

大皂角

性去子燒存
八錢

糯米

一合炒
褐色

草烏

乾薑

赤芍

各一兩

南星 二兩

右為末蔥酒調塗日易二次

益氣養榮湯 治潰而不斂

參朮四物湯加柴胡貝母黃耆銀花桔梗皂角

刺夏枯草

水煎服

時毒

小兒時毒因感四時不正之氣致頭面耳項赤腫寒熱頭痛狀如傷寒若邪在表用
葛根甘草赤芍升麻牛蒡羌活柴胡防風荆芥薄荷邪在裏用大黃山梔牛蒡枳殼