

金壇王肯堂字泰甫輯

肺

錢肺主喘

實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者 虛則哽氣長

出氣

肺病悶亂哽氣長出氣氣短喘急

肺熱手搯眉目鼻面甘

枯湯主之

肺盛復有風冷冒滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後

散肺

散肺瀉白散大青膏主之肺只傷寒則不胸滿

肺虛熱

紅色治之散肺虛熱少服瀉白散

肺臟怯唇白色當補肺阿

散主之若悶亂氣麤喘促哽氣者難治肺虛損故也

脾肺病久

唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營故名曰怯肺主唇

白如枯骨者死

此以唇診肺之法也唇白色者肺臟怯也阿膠散主之若手尋玄領及亂捻物

者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者當搗

肺病見春金旺肺勝肝也當瀉

者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者當搗

肺主燥自病則喘嗽燥則潤之

實則喘而氣盛瀉白散主之

而少氣先益黃散後阿膠散主之

心乘肺賊邪熱而喘

肺輕

黃丸中導赤散後阿膠散主之

肝乘肺微邪惡風眩冒皆

九活膏主之

腎乘肺實邪增寒嗽清利百部丸主之

脾乘

肺虛邪體重吐痰泄瀉嗽人參白朮散主之

劉凡肺之得病必先

觀心脾二臟之虛實若心火燥金即當先抑心氣後吃肺藥若心氣

和即頓看脾脈若脾氣虛冷即不能相生而肺家生氣不足則風邪

易感或患肺寒者皆脾虛得之若脾氣盛實則亦痞隔中焦而大腸

與肺表裏不能相通夫中焦熱隔則肺與大腸不通其熱毒之氣必

上蒸於肺而生痰故患肺熱者多脾實得之心氣盛者瀉之脾氣虛

者益之脾氣實者通之然後隨其肺之寒熱以治之故有抑心氣益

脾氣通肺氣三藥若診其脈氣心脾兩臟俱和而肺自生疾則但察

肺氣虛實而治之

肺經鬱熱用瀉白散肺氣自虛用四君子湯外邪所乘用參蘇飲
心火炎燥用人參平肺散中焦實痞用大承氣湯脾不能生肺用異
功散夫肺氣盛者肺中之邪氣盛也其脈右寸必浮而有力宜用瀉
白散以瀉之若肺虛而有熱者執肺熱還傷肺之說而不用人參則
誤矣後參其證治之

海肺白氣上逆急食苦以瀉之訶子皮一作黃芩 肺欲收急食酸

以收之白芍藥 以酸補之五味子 以辛瀉之桑白皮 肺虛以

五味子補之如無他證錢氏補肺阿膠散主之虛則補其母脾乃肺

之母以甘草補脾

錢氏 又名補肺散 阿膠一兩半 黍粘子炒香 甘草炙各二錢半

元冷中兩 杏仁七箇去皮尖炒 糯米壹兩 右為末每服一二錢水一

盞至六分食後溫服 海杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門

冬之補也當以意消息之 薛前方乃通肺金之劑經云虛則

補其母若前藥未應宜用五味異功散以補肝

每市買以桑白皮瀉之如無他證以瀉白散主之實則瀉其子腎乃

之子以澤瀉瀉腎

散錢氏

又名瀉肺散

桑白皮

細剉炒黃

地骨皮

先去上焙各一兩

甘草

炒半

右件為末每服一二錢水一中盞入粳米百粒同煎至六分

食後溫服

海泊肺熱骨蒸自汗宜用此直瀉之用山梔黃芩方

能瀉肺但當以氣血分之

甘桔湯

方見咽喉

大青膏

羌活膏

俱見驚搐

四君子湯

方見雜病

虛勞

參蘇飲

雜病發熱

人參平肺散

雜病咳嗽

歸九

方見咳嗽

人參白朮散

咳嗽

內經曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也皮毛者肺之舍也皮毛先受

邪氣邪氣聽從其令也五臟之欬久乃移於六腑又病機式要云欬

謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰

也欬嗽謂有聲有痰也因傷肺氣動於脾濕故咳而嗽也又生氣通天論云秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣上衝而爲咳嗽甚則動於脾濕而爲痰也蓋風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒冷小兒多有之火乘肺者咳嗽上壅涕唾出血甚者七竅血溢燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡燥淫大便秘澀涕唾稠粘寒乘肺者或因形寒飲冷冬月坐卧濕地或受冷風春秋之氣或因外感夏是火氣炎上最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外來也宜各隨其證而治之

欬法

夫嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽者必實非久

也其證面赤痰盛身熱法當以葶藶丸下之若久者不可下也

十一月十二月嗽者乃傷風嗽也風從背脊第三椎肺俞穴入也當

十二月熱登面赤飲水涎熱咽喉不利者宜兼甘桔湯治

之五七日間其痰盛唾粘者以礪銀圓下之 有肺盛者

欬而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱以瀉白散瀉之 若

風咳嗽五七日無熱證而但嗽者亦葶藶圓下之後用下痰藥

虛者欬而哽氣時時長出氣喉中有聲此久病也以阿膠散補

之痰盛者先實脾後以礪銀圓微下之涎退即補肺補肺如上法

有嗽而吐水或青淥水者以百祥圓下之 有嗽而吐痰涎乳食者

白餅子下之 有嗽而咯膿血者乃肺熱食後服甘桔湯 久嗽者

肺亡涎液阿膠散補之 欬而痰實不甚喘而面赤時飲水者可礪

銀圓下之 治嗽大法盛即下之久即補之更量虛實以意增損

杜氏子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃外風寒

蓄入肺經冷肺病嗽而吐痰風在肺中故也宜以麻黃散葷發散後

用涼藥壓之即愈時醫與珠粉丸半夏丸礪銀丸諸法下之其肺即

虛而嗽甚至春三月間尚未愈召錢視之其候面青而光嗽而喘促

哽氣又時時長出氣錢口病困十已八九然所謂面青而光者肝氣
旺也春三月者肝之位肺衰之時也嗽者肺之病肺自十一月至三
月肺卽虛痿又數下之脾肺子母俱虛復爲肝所勝此爲逆也故嗽
而喘促哽氣長出氣也錢急與瀉青丸瀉之後與阿膠散實肺次日
面青而不光錢又用補肺而嗽如前又與瀉肝未已而又加肺虛唇
白如練錢曰此病必見不可治之何者肝大旺而肺虛絕肺病不得
時而肝勝之今三瀉肝而肝病症不退三補肺而肺病尤虛此不久
亡故言死也此證病於秋有十救三四春夏者十難救一果大喘而
死京東轉運使李公有孫八歲病嗽而胃滿短氣醫者言肺經有
熱用竹葉湯牛黃膏各二服治之三日加喘錢氏曰此肺氣不足復
寒卽使喘滿當補肺肺勿服涼藥李曰醫已用竹葉湯牛黃膏
錢曰何治也醫曰退熱退涎錢曰何熱所作曰肺經熱而生嗽嗽久
不止在涎錢曰本寒而氣寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而

蘇九歲病肺熱他醫以犀珠龍麝生牛黃治之一月不愈其證嗽喘

亂飲水不止全不能食錢氏用史君子九益黃散張曰本有熱何

又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尙無效錢曰涼藥久則寒不能

食小兒虛不能食當補脾候飲食如故卽瀉肺經病必愈矣服補脾

藥二日其子欲飲食錢以瀉白散瀉肺遂愈十分張曰何以不虛錢

曰先實其肝然後瀉肺故不虛也

潔古法肺之生病而成嗽大抵利肺則實春夏則虛更詳五臟兼

見之證以辨虛實若實則面赤飲水身熱痰涎盛涕唾稠粘咽乾不

利喘嗽面腫吐食皆當先補脾益黃散後瀉肝瀉青丸若咯膿血是

肺痿也用清肺散治之若虛則面白脫色氣少不語喉中有聲唾痰

清利法當阿膠散補之若亡津液用白朮散主之嗽而兩脇痛者

屬肝經用小柴胡湯發熱咳而嘔苦水者屬膽經用黃芩半夏生薑

湯咳而喉中如梗者屬心經用甘桔湯咳而失氣者屬小腸用芍藥
甘草湯咳而右脇痛者屬脾經用升麻湯咳而嘔出蟲者屬胃經用
烏梅丸咳而喘息吐血者屬肺經用麻黃湯咳而遺尿者屬大腸用
赤石脂湯咳而腰背痛甚則咳涎者屬腎經用麻黃附子細辛湯咳
而遺尿者屬膀胱用茯苓甘草湯咳而腹滿不欲食面腫氣逆者屬
三焦用異功散

吐瀉

曾氏法 咳嗽者固有數類但分冷熱虛實隨證踈解初中時未有
不因感冒而傷於肺內經曰肺之令人咳何也岐伯曰皮毛者肺之
合也皮毛先受邪氣邪氣得從其合故難經云形寒飲冷則傷肺使
氣上而不下逆而不收衝壅咽膈淫淫如痒習習如梗是令嗽也乍
脫着無熱遇風邪氣侵於皮膚肺先受之而為咳嗽若初得時面
赤唇紅氣麗發熱嗽來痰鳴此是傷風壅痰作嗽用清肺飲五拗湯
及 傷寒可解表次香木香湯陰 有小兒汗出未

瀉肺湯與之疎風化痰解利邪熱小柴胡湯亦可 若日久津液

耗肺經虛矣肺為諸臟華蓋卧開而坐合所以卧則氣促坐則稍

乃因攻肺下痰之過名為虛嗽聲連不斷喉中痰鳴氣息欲絕嗽

罷則吐白沫或乾嘔此肺虛而氣不順也面唇皆白而慘嗽過額上

多汗哽氣長出乳食減少致脾虛而胃亦虛宜其有吐投茯苓厚朴

湯吐及藿香飲食不乳次溫脾潤肺理中湯吐加杏仁北五味子水煎

服蓋此藥補脾而益肺藉土氣以生金則自愈矣或嗽而頰紅有紫

黯色於理中湯內再加乾薑為用亦良法也 有脾虛亦能作嗽當

投補劑用醒脾散慢茯苓厚朴湯吐令脾氣實然後間以清肺飲煎

服疎解肺經風寒及藿香飲助脾養胃亦救子益母之法也 有一

證咳嗽至極時頓嘔吐乳食與痰俱出盡方少定此名風痰壅盛肝

木尅脾土宜以白附飲吐投之即効

薛氏法 若咳嗽流涕外邪傷脾也先用參蘇飲喘嗽面赤心火刑肺也用人參平肺散及六味地黃丸腎嗽而吐青綠水肝木乘脾也用異功散加柴胡桔梗嗽而吐痰乳脾肺氣傷也用六君子加桔梗若嗽唾膿痰者熱蘊於肺而成肺癰也用桔梗湯見肺癰凡風邪外傷法當表散而實腠理其用下藥非邪傳於內及胃有實熱者不宜輕用面色白脉短濇者肺之本證也易治面色赤脉洪數者火刑金也

紫

發表麻黃湯

治太陽證頭疼發熱身痛惡風無汗喘滿脉浮緊八

九日不解當發汗汗已煩悶瞑目者必衄衄乃解所以然者陽氣

重故也

甘草

半兩

麻黃

去節一兩半

桂枝

一兩

杏仁

去皮三十五箇

右每

服三錢水煎

三拗湯

治感冒風邪鼻塞聲重語言不出或傷風頭疼目眩四肢

又痰喘氣短

麻黃

不去

杏仁

不去

甘草

生用

右各

生薑三片煎至六分去滓溫服取汗

為度一方加荊芥桔梗嗽甚加五味子細辛各減半又方麻黃去

節杏仁去皮尖甘草炙名三和湯治喘嗽尤妙加減在乎活法有

熱加前胡傷風加荊芥有痰加半夏

加減三拗湯 麻黃去根節三錢水 桂枝 二錢 杏仁米箇去皮尖炒

甘草炙 右為麤末入香膏拌勻每服一錢水六分煎至四分

去查溫服無時以汗出為度量大小加減若自汗者不宜服之

五拗湯 治感風濕及形寒飲冷痰嗽咳逆連聲不已 麻黃不去

杏仁不去皮尖 荊芥不去梗 桔梗金水拌炒 甘草 二錢 右每服二錢水

一盞煎七分無時溫服

百部丸 治小兒肺寒壅嗽微喘有痰 百部炒 麻黃去節各 杏仁

四十枚去皮尖微炒研入 右為末煮熟棗子九如皂子大溫水下二三丸無

時日三四服此本方也仲景加松子仁五十箇蜜丸更加胡桃肉

含化大妙一方加甘草二錢

九寶飲 治小兒嗽是肺臟感寒須表散却服嗽藥 麻黃去節

薄荷 大腹皮 紫蘇各半兩 陳皮 杏仁去皮尖 桑白皮炙 肉桂

枳殼各二錢半 甘草一錢半 右剉散每服二錢生薑烏梅煎服冷證去

薄荷熱證去陳皮桂

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩悶項背拘急聲重鼻塞頭

目昏眩痰氣不利 麻黃去節 紫蘇子隔紙炒 桑白皮蜜炙 杏仁去皮

尖赤茯苓去皮 陳橘皮去白各半兩 甘草炙二錢 右剉散每服二錢水

半盞煎至三分去滓量大小加減食後溫服

金沸草散 治傷風化痰頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢體煩疼

肩膈滿痰涎不利咳嗽喘滿涕唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

荆芥四兩 前胡去蘆 麻黃去節 旋覆花各三兩 甘草炙 半夏湯洗七次薑汁

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同

麥煎散 治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣促喘急面赤自

汗或狂語驚叫或不語無汗及癰疹遍身赤痒往來潮熱時行痢

疳疹子餘毒未盡渾身浮腫痰涎咳嗽或變急慢驚風手足搐搦

眼目上視及傷風頭疼並治之 滑石 地骨皮 赤芍藥

石膏 白茯苓 杏仁 知母 甘草 葶藶子炒 人參各半兩

麻黃去節兩半 右為末每服一錢麥子煎湯調下如初生牙兒感冒

風心鼻塞身熱噴嚏多啼每一字用麥子煎湯調下一方去地骨

皮滑石加羌活川芎薄荷煎湯調下

小毒龍湯 治傷寒表不解惡寒體熱水停心下乾嘔發熱而嗽或

渴或利小便不利或噎小腹滿喘 麻黃去節微和者去麻黃加羌活如彈子大炒令赤

色若壺者去麻黃加附子半錢炮若小便不利 赤芍藥 半夏泡

者加茯苓一兩若喘者去麻黃加杏仁去皮尖 肉桂去麝皮 甘草各七錢半 五味子五錢

右剉散每服三錢水一盞煎七分去滓加減服

清肺飲 治肺受風邪客熱嗽聲不斷氣促喘悶痰壅鼻塞流涕失

音及解時行疹毒豆瘡涎多咳嗽咽痛煩渴 柴胡淨洗二兩 人參去蘆

半兩 杏仁湯泡去皮尖 桔梗剉炒 赤芍藥 荆芥 枳殼去穢炒微黃 桑白皮

剉炒 北五味子 麻黃去節湯泡過剉焙 半夏湯煮透濾仍剉 旋覆花五錢

甘草一兩 右剉每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無時

溫服或入薄荷同煎

解表散 主傷風感冷咳嗽痰喘嘔吐瀉利驚悸有熱證在表裏並

宜可投 麻黃製法同上 杏仁湯泡去皮尖 赤茯苓去皮各一兩 川芎 防風去蘆

枳殼製法同上 甘草半生半炙七錢半 右剉每二錢水一盞薑二片蔥

白一莖煎七分溫服無時有熱入薄荷同煎

升解湯 治小兒四時感冒寒邪壯熱煩躁鼻塞多涕驚悸自汗肢

身已發未發皆可服 羌活 防風 人參 川芎

右到散每服三錢薑棗

煎服加荆芥無汗加麻黃咳嗽者加杏仁五味子桔梗

表錢氏葶藶丸 治乳食衝脾傷風咳嗽面赤痰盛身熱喘促

甜葶藶

去土隔布微炒

黑牽牛

微炒

杏仁

去皮尖炒漢防己

各一兩

右為

末研入杏膏拌勻蒸陳棗肉和再搗為劑丸如麻子大每服五丸至七丸淡生薑湯下乳食後或臨夜服量兒大小加減

潔人參荆芥散 治身熱痰嗽胸膈不利宜下痰去熱 人參 半兩

荆芥穗

一兩

大黃

二錢

右為細末水煎調檳榔木香細末五分

輕粉一字乳後服如身熱潮熱宜服清涼飲子去大黃三服之後

一二日却入大黃服之令疎利則愈不可便動臟腑

漏銀丸

治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘急

巴豆

去油膜皮心細

研半

水銀

五錢

黑鉛

二錢半同

麝香

另研五分

好墨

火燒醋炒

研八錢

右

將巴豆末并墨再研勻和入砂子麝香陳米粥和丸如棗大捻

福一歲兒一九二三歲二二九五歲已上五六九煎薄荷湯放冷
送下不得化破更量虛實加減並食後服虛人先以益黃散會解
後以此方下之下後補

原劑瀉肺湯 主傷風後五心煩熱咳嗽喘促唇紅頰赤發渴引飲

桑白皮劉炒 地骨皮淨洗焙乾 甘草炙三錢 右咬咀每服二錢水

一盞粳米百粒煎七分食後臨卧溫服或不拘時

聖惠天門冬散 治小兒心胸煩悶體熱咳嗽 天門冬去心焙 桑根

白皮劉 赤茯苓 柴胡去苗 百合 紫苑洗去苗 藍葉 甘草炙

赤劉已上各半兩 石件擣羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許

煎至五分去滓量兒大小以意分減溫服

聖惠百部散 治小兒欬嗽煩熱令乳母服 百部 貝母煨微

紫苑洗去苗 葛根劉各一兩 石膏二兩 石件擣羅為散每服三錢以水

煎至六分去滓每於食後服令兒飲乳甚