

黃帝內經目錄

第一卷

上古天真論一

四氣調神大論二

生氣通天論三

金匱真言論四

第二卷

陰陽應象大論五

陰陽離合論六

陰陽別論七

第三卷

靈蘭秘典論八

六節藏象論九

五藏生成論十

五藏別論十一

第四卷

異法方宜論十二

移精變氣論十三

湯液醪醴論十四

玉板論要篇十五

診要經終論十六

第五卷

脉要精微論十七

平人氣象論十八

第六卷

玉機真藏論十九

三部九候論二十

第七卷

經脉別論二十一

藏氣法時論二十二

宣明五氣篇二十三 血氣形志篇二十四

第八卷

寶命全形論二十五 八正神明論二十六

離合真邪論二十七 通評虛實論二十八

太陰陽明論二十九 陽明脈解三十

第九卷

熱論三十一 刺熱論三十二

評熱病論三十三 逆調論三十四

第十卷

瘧論三十五 刺瘧篇三十六

氣厥論三十七

欬論三十八

第十一卷

舉痛論三十九

腹中論四十

刺腰痛論四十一

第十二卷

風論四十二

痺論四十三

痿論四十四

厥論四十五

第十三卷

病能論四十六

奇病論四十七

大奇論四十八

脈解篇四十九

第十四卷

刺要論五十

刺齊論五十一

刺禁論五十二

刺志論五十三

鍼解五十四

長刺節論五十五

第十五卷

皮部論五十六

經絡論五十七

氣穴論五十八

氣府論五十九

第十六卷

骨空論六十

水熱穴論六十一

第十七卷

調經論六十二

第十八卷

繆刺論六十三

四時刺逆從論六十四

標本病傳論六十五

第十九卷

天元紀大論六十六

五運行大論六十七

六微旨大論六十八

第二十卷

氣交變大論六十九

五常政大論七十

第二十一卷

六元正紀大論七十一

刺法論七十二七

本病論七十三七

第二十二卷

至真要大論七十四

第二十三卷

著至教論七十五

示從容論七十六

疏五過論七十七

徵四失論七十八

第二十四卷

陰陽類論七十九

方盛衰論八十

解精微論八十一

重廣補注黃帝內經素問卷第十三

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

病能論

奇病論

大奇論

脈解篇

病能論篇第四十六

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰人病胃脘癰者診當何如歧伯對曰診此

者當候胃脈其脈當沉細沉細者氣逆

胃者水穀之海其血盛氣壯今反脈

沉細者是逆常平也

新校正云按

甲乙經沈細作沈瀆太素作沈細

逆者人迎甚盛甚盛則熱

沈細為寒寒氣格陽故人迎脈盛人迎者陽明

之脈故盛則熱也人迎謂結喉傍脈動應手者

人迎者胃脈也

胃脈循喉嚨而

人缺盆故云人

迎者胃脈也

逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為

癱也

血氣壯盛而熱內薄之兩氣合熱故結為癱也

帝曰善人有臥而有所不安者

何也歧伯曰藏有所傷及精有所之寄則安故人不

能懸其病也

五藏有所傷損及之水穀精氣有所之寄扶其下則臥安以傷及於藏故人不能懸其病處於空中也 新校正云

按甲乙經精有所之寄則安作情有所倚則臥不安太素作精有所倚則不安

帝曰人之不得偃臥者何

也

謂不得仰臥也

歧伯曰肺者藏之蓋也

居高布葉四藏下之故言肺者藏之蓋也

肺

氣盛則脉大脉大則不得偃臥

肺氣盛滿偃臥則氣促喘奔故不得偃臥也

論

在奇恒陰陽中

奇恒陰陽上古經篇名出本闕

帝曰有病厥者診右脉沉

而緊左脉浮而達不然病主安在

不然言不沉也 新校正云按甲乙經不然作不知

歧伯曰冬診之右脉固當沉緊此應四時左脉浮而

達此逆四時在左當主病在腎頗關在肺當腰痛也

以冬左脉浮而遲浮為肺脉故言頗關在肺也腰者腎之府故腎受病則腰中痛也

帝曰何以言之歧伯曰

少陰脉貫腎絡肺今得肺脉腎為之病故腎為腰痛

之病也

左脉浮遲非肺來見以左腎不足而脉不能沉故得肺脉腎為病也

帝曰善有病頸癰者

或石治之或鍼灸治之而皆已其真安在

言所攻則異所愈則同欲聞真

法何所往也

歧伯曰此同名異等者也

言雖同日頸癰然其皮中別異不一等也故下云

夫

癰氣之息者宜以鍼開除去之夫氣盛血聚者宜石

而寫之此所謂同病異治也

息瘳也死肉也石砭石也可以破大癰出膿今以銆鍼代之

帝

曰有病怒狂者

新校正云按太素怒狂作善怒

此病安生歧伯曰生於陽

也帝曰陽何以使人狂

怒不慮禍故謂之狂

歧伯曰陽氣者因暴

折而難決故善怒也病名曰陽厥

言陽氣被折鬱不散也此人多怒亦曾因暴折而心

不疏暢故爾如是者皆陽逆躁極所生故病名陽厥

帝曰何以知之歧伯曰陽明者常

動巨陽少陽不動不動而動大疾此其侯也

言頸項之脉皆動不

止也陽明常動者動於結喉傍是謂人迎氣舍之分位也若以少陽之動動於曲頰下是謂天窓天牖之分位也若巨陽之動動於項兩傍大筋前陷者中是謂天柱天容之分位也不應常動而反動甚者動當病也 新校正云詳王注以天窓為少陽之分位天容為太陽之分位按甲乙經天窓乃太陽脉氣所發天容乃少陽脉氣所發二位交互當以甲乙經為正也 帝曰治之柰何歧伯曰奪其食即

已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已

食少則氣衰故節去其食即病

自止 新校正云按甲乙經奪作衰太素何也

使之服以生鐵洛為飲

新校正云按甲乙經鐵洛作鐵落為

飲作為後飯

夫生鐵洛者下氣疾也

之或為人傳文誤也鐵洛味辛微温平主治下氣方俗或呼為鐵漿

非是生鐵液也

帝曰善有病身熱解墮汗出如浴惡風少氣此

為何病歧伯曰病名曰酒風

飲酒中風者也風論曰飲酒中風則為漏風是亦名漏風也夫極飲

者陽氣盛而腠理踈玄府開發陽盛則筋痿弱故身體解墮也腠理踈則風內攻玄府發則氣外泄故汗出如浴也風氣外薄膚腠復開汗多內虛痺熱熏肺故惡風少氣也因酒而病故曰酒風 帝曰治之柰何岐伯曰以澤瀉朮各十

分麩銜五分合以三指撮為後飯

朮味苦溫平主治大風止汗麩銜味苦寒平主治風

濕筋痿澤瀉味甘寒平主治風濕益氣由此功用方故先之飯後藥先謂之後飯

所謂深之細者其中手

如鍼也摩之切之聚者堅也博者大也上經者言氣

之通天也下經者言病之變化也金匱者決死生也

揆度者切度之也奇恒者言奇病也所謂奇者使奇

病不得以四時死也恒者得以四時死也

新校正云按楊上善云得病傳

之至於勝時而死此為恒中生喜怒哀病次傳者此為奇

所謂揆者方切求之也言切求

其脉理也度者得其病處以四時度之也

凡言所謂者皆釋未了義今此

所謂尋前後經文悉不與此篇義相接似今數句少成文義者終是別釋經文世本既闕第七二篇應彼闕經錯簡文也古文斷裂繆續於此

奇病論篇第四十七

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰人有重身九月而瘖此為何也

重身謂身中有身則懷妊者也

瘖謂不得言語也妊娠九月足少陰脉養胎約氣斷則瘖不能言也

岐伯對曰胞之絡脉絕也

絕謂

脉斷絕而不通流而不能言非天真之氣斷絕也

帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫

於腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言

少陰腎脉也氣不營養故舌不能言

帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

十月胎去胞絡復通腎脉

上營故復舊而言也

刺法曰無損不足益有餘以成其疹

疹謂久病也反法而

治則胎死不去遂成久固之疹病也

然後調之

新校正云按甲乙經及太素無此四字按全元起注云所謂不治者其身九月而瘖

身重不得為治須十月滿生後復如常也然後調之則此四字本全元起注文誤書於此當刪去之

所謂無損不足者

身羸瘦無用鑱石也

妊娠九月筋骨瘦勞力少身重又拒於穀故身形羸瘦不可以鑱石傷也

無益

其有餘者腹中有形而泄之泄之則精出而病獨擅

中故曰疹成也

胎約胞絡腎氣不通因而泄之腎精隨出精液內竭胎則不全胎死腹中著而不去由此獨擅故疹成焉

帝

曰病脇下滿氣逆二三歲不已是為何病歧伯曰病

名曰息積此不妨於食不可灸刺積為導引服藥藥

不能獨治也

腹中無形脇下逆滿頻歲不愈息且形之氣逆息難故名息積也氣不在胃故不妨於食也灸之則火熱內燥氣化

為風刺之則必寫其經轉成虛敗故不可灸刺是可積為導引使氣流行久以藥攻內消瘵積則可矣若獨憑其藥而不積為導引則藥亦不能獨治之

也 帝曰人有身體髀股胛皆腫環齊而痛是為何病

歧伯曰病名曰伏梁

以衝脉病故名曰伏梁然衝脉者與足少陰之絡起於腎下出於氣街循陰股內廉斜入膈中

循胛骨內廉並足少陰經下入內踝之後入足下其上行者出齊下同身寸之三寸關元之分俠齊直上循腹各行會於咽喉故身體髀皆腫環齊而痛名曰

伏梁環謂圓繞如環也

此風根也其氣溢於大腸而著於育育之原

在齊下故環齊而痛也

大腸廣腸也經說大腸當言迴腸也何者靈樞經曰迴腸當齊右環迴周葉積

而下廣腸附脊以受迴腸左環葉積上下辟大尋此則是迴腸非應言大腸也然大腸迴腸俱與肺合從合而命故通曰大腸也

不可動

之動之為水溺瀦之病也

以衝脉起於腎下出於氣街其上行者起於胞中上出齊下關元之分故動之

則為水而溺瀦也動謂齊其毒藥而擊動之使其大下也此一問荅之義與腹中論同以為奇病故重出於此

帝曰人有尺脉

數甚筋急而見此為何病

筋急謂掌後尺中兩筋急也脉要精微論曰尺外以候腎尺裏以候腹中今尺

脉數急脉數為熱熱當筋緩反尺中筋急而見腹中筋當急故問為病乎靈樞經曰熱即筋緩寒則筋急

岐伯曰此所謂

疹筋是人腹必急白色黑色見則病甚

腹急謂俠齊豎筋俱急以尺裏候腹

中故見尺中筋急則必腹中拘急矣色見謂見於面部也夫相五色者白為寒黑為寒故二色見病彌甚也

帝曰人有病頭

痛以數歲不已此安得之名為何病

頭痛之疾不當踰月數年不愈故怪而問之也

歧伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦

逆故令頭痛齒亦痛

夫腦為髓主齒是骨餘腦逆反寒骨亦寒入故令頭痛齒亦痛

病名曰厥

逆帝曰善

全注人先生於腦緣有腦則有骨髓齒者骨之本也

帝曰有病口甘者病名

為何何以得之歧伯曰此五氣之溢也名曰脾瘴

謂瘴

熱也脾熱則四藏同稟故五氣上溢也生因脾熱故曰脾瘴

夫五味入口藏於胃脾為之行

其精氣津液在脾故令人口甘也

脾熱內滲津液在脾胃穀化餘精氣隨溢口通脾氣

故口甘津液在脾是脾之濕

此肥美之所發也

新校正云按太素發作致

此人必數食

甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其

氣上溢轉為消渴

食肥則腠理密陽氣不得外泄故肥令人內熱甘者性氣和緩而發散逆故甘令人中滿然內熱則

陽氣炎上炎上則欲飲而隘乾中滿則陳氣有餘有餘則脾氣上溢故曰其氣上溢轉為消渴也陰陽應象大論曰辛甘發散為陽靈樞經曰甘多食之令人