

卷十 外科

背癱 肺癱 肝癱 大腸癱 小腸癱
 無名腫毒 對口癰 腦疽 囊癰 臂癱
 乳癰 肚癰 多骨癰 惡疽 疔瘡
 楊梅瘡 腰疽 疔瘡 疔瘡
 瘰癧 痔漏 頑瘡 接骨 金瘡
 九龍神針 物傷 癩 刑杖
 小兒科 驚疳 吐瀉 便蟲 疰瘡 疹證
 契泥 胎毒

辨證奇聞

辨證奇聞目錄

卷一

傷寒門

中寒門

卷二

中風門

痺證門

脇痛門

頭痛門

腰痛門

六陳散

卷三

咽喉痛門

牙齒痛門

目痛門

耳痛門附耳聾

血症門

徧身骨痛門

卷四

五鬱門

咳嗽門

怔忡門

驚悸門

心痛門

腹痛門

鼻淵門

口舌門

白膏藥

喘門

虛煩門

不寐門
狂病門

卷五

關格門
臑脹門

卷六

火熱症門
痿証門

卷七

痙瘓門
大瀉門

八仙藥酒方

卷八

大便閉結門

健忘門
呆病門

中滿門

厥症門

暑症門

消渴門

汗症門

痢疾門

癰疽門
呃逆門

翻胃門

春溫門

燥症門

五癰門

癰疽門

即痞塊也

小便不通門

內傷門

疝氣門

痰症門

卷九 婦人科

帶門

調經門

安胎門

難產門

產後諸病門

卷十 外科

背癰門

大腸癰門

對口癰門

臂癰門

多骨癰門

奔豚門

血枯門

受妊門

小產門

血暈門

下乳門

肺癰門

小腸癰門

腦疽門

乳癰門

惡疽門

陰痿門

血崩門

妊娠惡阻門

鬼胎門

胞衣不下門

肝癰門

無名腫毒門

囊癰門

肚癰門

疔瘡門

楊梅瘡門

脚疽門

療癰門

接骨門

物傷門

小兒科

驚疳吐瀉門

疹證門

腰疽門

鬢疽門

痔漏門

金瘡門

癩門

便蟲門

喫泥門

掌疽門

唇疔門

頑瘡門

九龍神針

刑杖門

痘瘡門

胎毒門

辨證奇聞卷十

太醫院院使鏡湖張氏

外科

背癰門

人有背心間先發紅瘰。後漸漸紅腫。此發背之兆也。最為可畏。古人云外大如豆。內大如拳。外大如拳。內大如盤。言其外小而內實大也。然而癰疽等毒。必須辨其陰陽。有先陰而變陽者。有先陽而變陰者。有前後俱陽者。有前後俱陰者。陽症雖重。而實輕。陰症雖輕。而實重。先陰而變陽者。生先陽而變陰者。死。病既殊。而何以辨之也。陽症之形。必高突而腫起。陰症之形。必低平而陷下。陽症之色。必純紅。陰症之色。必帶黑。陽症之初起。必疼。陰症之初起。必癢。陽症之潰爛。必多其膿。陰症之潰爛。必多其血。陽症之收口。身必輕爽。陰症之收口。身必沉重。至於變陰變陽。亦以此消息斷不差也。倘見紅腫而高突。乃陽症之癰也。乘其內毒初發。內猶未化。急以散毒之藥治之。可隨手而解也。發背而至於橫決者。皆因循失治。以致於破敗而不可救。陽變陰者多矣。救癰如救火。宜一時撲滅。否則沿燒屋廬。不盡不止。切勿見為陽症無妨。而輕緩治之也。方用急消湯。忍冬藤二兩。茜草三

辛金

背癰

錢
紫花地丁 一兩 甘菊花 三錢 貝母 二錢 黃栢 一錢 天花粉 三錢 桔梗 三錢 生甘草 三錢

水煎服一劑輕二劑又輕三劑全消不必四劑也。此方消陽毒之初起最神。既無迅烈之虞。大有和解之妙。世人不知治法。謂陽毒易於祛除。孟浪用狼虎之藥。雖毒幸消散。而真氣耗散於無形。往往變成別病。乃醫者成之也。何若此方。王霸並施。有益無損之為妙哉。人有背心發癩瘡甚。已而背如山重。隱隱發紅暈如盤之大。此陰癰初起之形象也。最為可畏。尤非前症陽癰可比。乃一生罪孽。鬼祟憑身。必然讖語胡言。將夙昔欺心之事。盡情宣揚。如見此等症候。本不可救。然而人心善惡。成於一念之遷悔。苟肯悔過求生。而刀圭無術。亦見醫道之無奇矣。蓋陽症有可死之條。而陰症豈無可生之理。亦在救之得法耳。大約陰癰之症。雖成如鬼祟之纏身。然必正氣大虛。邪得而入之也。設正氣不虛。邪將安入。故救陰癰之症。必須大用補氣血之藥。而佐之散毒散毒之品。則正旺而邪自散矣。方用變陽湯。人參 二錢 金銀花 半斤 附子 一錢 荆芥炒黑 三錢 柴胡 二錢 白芍 二兩 天花粉 五錢 生甘草 五錢 水十餘碗。煎汁二碗。先服一碗。後再服一碗。服後陰必變陽。而作痛。再用一劑。而痛亦消。再服一劑。而全愈。竟消滅於無形也。然而世人不至皮破血出。斷不肯信。誰能先用此等之藥。以治發背之陰癰乎。毋論病人不肯服。即醫生亦不肯用。尚醫

生知用此治療而病人之家亦不肯信。往往決裂潰爛。瘡口至如碗之大而不可收拾。始追悔參芪之遲用晚矣。余所以既論此症而又多戒辭。勸人早服此方。萬不可觀望狐疑。以喪人性命。蓋陽毒可用攻毒之劑。而陰毒必須用補正之味。方用人參黃芪以補氣者。氣旺則幽陰之毒不敢入心肺之間。而金銀花性補善解陰毒。得參芪而其功益大。然非得附子則不能直入陰毒之中。而又出於陰毒之外。毒深者害深。又益之生甘草以解其餘毒。然而毒結於背者。以氣血之壅也。壅極者鬱極也。故加柴胡荆芥白芍天花之類。消其痰而通其滯。開其鬱而引其經。自然氣宣而血活。痰散而毒消也。機論方用人參黃芪云云而方內無

人有背癰潰爛。洞見肺腑。瘡口黑陷。身不能卧。口渴思飲。人以為陽症之敗壞也。誰知是陰虛而不能變陽乎。夫背癰雖有陰陽之分。及至潰膿之後。宜補內而不宜消。則陰陽之症一也。潰爛而至於肺腑之皆見。此從前失補之故。使毒過於沿燒。將好肉盡化為淤肉。耳肉淤自必成腐肉。腐自必洞。見底裏。見此等症候。亦九死一生之兆也。倘胃氣健而能食者。猶可救療。倘見食則惡者。斷無生理。雖然能用參芪歸地。亦往往有生者。正不可棄之而不救也。方用轉敗湯以救之人參一錢。黃芪一兩。熟地二兩。肉桂三錢。白朮四兩。當歸一兩。金銀花四兩。麥冬二兩。山茱萸一兩。遠志三錢。北五味子一錢。茯苓三錢。水煎服。

詳登... 卷十... 背癰

一劑而胃氣大開者。斷可轉敗為功也。倘飲之而少能健飯。亦必可救。惟恐飲之而全無應驗者。是胃氣將絕也。不必再治之矣。或飲之而飽悶少頃。而少安者。亦有生機。此方補其氣血。而更補其肺腎之陰。蓋陰生則陽長。陰陽生長。則有根易於接續。而後以金銀花解其餘毒。則毒散而血生。血生而肉長。肉長而皮合。必至之勢也。倘日以解毒為事。絕不去補氣血之陰陽。則陰毒不能變陽。有死而已矣。不重可悲悼乎。

人有背癰將愈。而瘡口不收。百藥敷之。絕無一驗。人以為餘毒之未淨也。孰知是陰虛而不能濟陽乎。夫癰疽初起。則毒盛。變膿則毒衰。膿淨則毒化矣。瘡口不收。乃陰氣之虛。而非毒氣之旺。世人不知治法。尚以敗毒之藥攻之。是已虛而益虛也。欲其肌肉之長。何可得乎。然而世亦有用補法。而仍然未效者。但用陽分之品。以補其陽。而不用陰分之味。以補其陰也。蓋獨陰不長。而獨陽亦不生。癰疽致膿。血已盡。則陰必大虛。止補其陽。則陽旺陰虛。不能交於陽矣。雖陽有濟陰之心。而陰無濟陽之力。所以愈補陽而陰愈虛。陰愈虛而瘡口愈難合也。治之法。必須大補其陰。使陰精盛滿。自能灌注於瘡口之中。不必用生肌外傳之藥。而瘡口之肉內生矣。方用生膚散。麥冬一兩。熟地二兩。山茱萸一兩。人參一錢。肉桂一錢。當歸一兩。忍冬藤一兩。白朮五錢。水煎服。二劑而肉肉自長。又二劑而外

口自平。又二劑全愈。此方補陰之藥。多於補陽。使陰勝於陽也。然而補陽之藥。仍是補陰之助。以其能入於陰之中。以交於陽之內也。忍冬藤非恃其解餘剩之毒。取其能領諸藥。至於瘡口之間也。

人有背疽長肉。瘡口已平。忽然開裂流水。人以為瘡口之肉未堅也。誰知是色慾惱怒之不慎乎。大凡瘡癰之症。最忌者色慾。其次忌惱怒也。犯惱怒者。新肉有開裂之虞。犯色慾者。新肉有流水之害。然此猶些小之瘡癰也。其在背癰犯惱怒者。不過疾病。而犯色慾者。多致死亡。其瘡口開裂之處。必然色變紫黑。而流水之處。必然肉變敗壞矣。當此之時。必須急補氣血。萬不可仍治其毒。蓋前毒未淨。斷難收口。既經收口。復至腐壞。實新肉不堅。而自求決裂也。况發背新愈之後。其精神氣血。盡是空虛。所以一交合泄精。遂至變出非常。舍補氣血。又安求再活乎。然而即補氣血。以此些小之劑。欲收危亂之功。大厦傾頽。豈一木能支哉。故又必須大劑救之。而後可。方用定變回生湯。人參一錢。黃芪三兩。當歸二兩。北五味二錢。麥冬二兩。肉桂三錢。白朮二兩。山茱萸五錢。忍冬藤二兩。茯苓一兩。水煎服。一劑而肉不腐矣。二劑而肉自生矣。三劑而皮仍合矣。四劑而平復。切戒再犯。再犯無不死者。即再服此方。無益也。可不慎乎。此方實救瘡瘍壞症之仙丹。不止瘡發背愈後犯

色之敗腐也。人疑泄精以至決裂，宜用熟地以大補之。何故反置而不用，以熟地補陰最緩而症犯實急，所以舍熟地而多用氣血之藥救其垂危，非熟地之不可用而輕置之也。此方服數劑之後，正宜減半，而多加熟地以為善後之計耳。

人有夏月生背癰，瘡口不起，脉大而無力，發熱作渴，自汗盜汗，用參芪大補之劑，益加手足逆冷，大便不實，喘促嘔吐，以為火毒大盛也。誰知是元氣太虛，補不足以濟之乎。夫癰分陰陽，瘡口不起，乃陰症而非陽症也。脉大似乎陽症，大而無力，非陰而何。發熱作渴，此水不足以濟火，故隨飲隨汗也。既是陰症似陽，用參芪陽藥以助其陽，正足以祛陰以返陽矣。何以愈補而反作逆冷嘔吐之狀。此陰寒之氣甚盛，而微陽之品力不能勝耳。非助之以附子辛熱之品，又何能斬關入陣，以祛蕩其陰邪哉。方用助陽消毒湯。人參一兩黃芪一斤當歸四兩白朮四兩陳皮一兩附子五錢水煎膏，作二服。諸症頓退，連服數劑，瘡起而潰，乃減半。又用數劑而愈。此非治癰之法也。然以治癰之法而輕治此等之症，鮮不立亡。可見治癰不可執之，大約陽癰可以消毒化癰之藥治之，而陰癰之病萬不可用消毒化癰之藥。舍癰從症實治癰之變法。醫者不可不知也。

人有背生癰疽，潰膿之後，或發熱或惡寒，或作痛，或膿多，或流清水，自汗盜汗，膿成而不

潰口爛而不收。人以為毒氣之未淨也。誰知五藏虧損。血氣大虛之故也。凡人氣血壯盛。陰陽和平。何能生毒。惟其臟腑內損。而後毒氣得以內藏。久之外泄。及至癰疽發出。其毒自不留內。然而臟腑原虛。又加流膿流血。則已虛益虛。觀其外而瘡口未斂。似乎有餘。審其內而氣血未生。實為不足。法當全補。而不必偏補。夫一臟致有偏勝之虞也。方用十全大補湯最妙。以其合氣血而兩補之耳。然而用之往往不效者。非方之不佳。乃用方之不得其法耳。夫背癰何等之症。豈尋常細小之劑所能補之乎。必須多加其分兩。大劑煎飲。始克有濟。余因酌定一方。以請正於同人也。用 人參 一錢 黃芪 二兩 白芍 五錢 肉桂 二錢 川芎 三錢 熟地 二兩 當歸 一兩 白朮 五錢 茯苓 五錢 生甘草 三錢 水煎服。自然用一劑有一劑之效也。世疑此方絕不敗毒。如何毒化而生肉也。不知癰疽未潰之前。以化毒為先。癰疽已潰之後。以補正為亟。縱有餘毒未淨。不必敗毒也。蓋敗毒之藥。非寒涼之品。即消耗之味也。消耗則損人真氣。寒涼則傷人胃氣。真氣損則邪氣反盛。胃氣傷則穀氣全無。又何能生肌長肉哉。惟十全大補湯專去助真氣。以益胃氣。故能收全效耳。且此方不特治背癰之已潰也。凡瘡瘍已潰者。皆宜用之。惜世人未知也。

人有胸膈之間作痛咳嗽之時更加痛極。手按痛處尤增氣急。人以為肺經生癰也。誰知是肺熱以成癰乎。夫肺為嬌藏。藥食之所不到者也。故治肺其難。肝熱害肺。既已成癰。將何法以療之乎。療之法似宜瀉火以救肺。肺藥不可入。而肺之母為脾。脾經未嘗不受藥也。肺之仇為肝。肝之敵為心。二經又未嘗不受藥也。補其脾經之士。則土能生金也。平其肝經之木。則金不能尅木也。清其心經之火。則火不來刑金也。三經皆有益於肺。而無損於金。則肺氣得養。而後以消毒之品。直解肺中之邪。何癰之不散乎。方用全肺湯。玄參三兩。生甘草五錢。金銀花五兩。天花粉三錢。茯苓三錢。白芍三錢。麥冬二兩。水煎服。一劑而痛減。再劑而內消矣。大凡肺癰之症。必須內消。而不可令其出毒。內消之法。總不能外脾。肝心三經治法。而別求消癰之道也。或曰。肺之子腎也。獨不可治腎以消乎。然而肺癰之成。雖成於火燥。肺金之液實因肺氣之自虛也。補腎雖亦能使肺氣之不來生腎。惟是肺腎相通。補腎之水。恐肺氣下降。而火毒轉不肯遽散。不若止治三經。使肺氣得養。自化其毒。不遺於腎之為妙也。

人有胸膈作痛咳嗽吐痰。更加疼甚。手按痛處疼不可忍。咽喉之間。先聞腥臭之氣。隨吐膿血。此肺癰不獨已成。而且已破矣。夫肺癰未破者易乎消。而已破者難於治。以膿血未

能遠淨耳。雖然得其法正不難也。蓋肺之所以生癰者。因肺之火不散也。然肺火之來。因肺氣之虛也。肺虛而後火留於肺。火盛而後結為癰。不補虛以散火。而未成形者。何以消。已成形者。何以散。既潰破者。又何以愈哉。是虛不可不補。而補虛者。補何臟乎。必須補肺氣之虛。而肺不能直補其氣。補胃氣之虛。則肺氣自旺也。今癰已破矣。多吐膿血。則肺氣尤虛。雖毒氣猶存。不可純瀉其毒。於補氣之中。而行其攻散之法。則毒易化。而正氣無傷。方用完肺散。人參一錢。玄參二兩。蒲公英五錢。金銀花二兩。天花粉三錢。生甘草三錢。桔梗三錢。黃芩一錢。水煎服。一劑而膿必多。二劑而膿又少。三劑而疼輕。四劑疼痛又輕。五劑而疼痛止。膿血亦止也。六劑竟奏全功。此方補胃中之氣。而即瀉胃中之火。胃氣旺。而肺氣自不能衰。胃火衰。肺火自不能旺。所以既能敗毒。而又能生肉耳。雖諸藥亦能入肺。不單走於胃。然而入胃者十之八。而入肺者十之二。仍是治胃益肺也。或問肺癰已破。病已入裏。似不宜升提。肺氣南昌喻嘉言謂宜引之從胃入腸。而先生仍用桔梗以開提。肺氣恐不可為訓。嗟乎。余所用之藥。無非治胃之藥。入於胃。有不下。引入腸者乎。然而肺氣困頓。清肅之令不行。用桔梗以清肺上氣。通而下行。更速。然則上之開提。正下之迅速。也。

人有久嗽之後。肺管損傷。皮膚黃瘦。咽嗑。自汗盜汗。眠卧不得。口吐稠痰。腥臭難聞。而毛悴色焦。嗽之時必忍氣須臾。輕輕吐痰。始覺喘不痛。否則必大痛不已。氣息淹淹。全無振興之氣。人以為肺中生癰也。誰知是肺生瘡乎。此等之症。本是難救。然治之得法。調理又善。亦有得生者。夫肺癰與肺痿不同。肺癰生於火毒。治之宜速。肺痿成於勞傷。治之宜緩。火毒宜補中用瀉。勞傷宜補中帶清。瀉與清不同。而補同也。惟是瀉中用補。可用大劑。清中用補。當用小劑。勿忘勿助。若有若無。始能奏功也。當用養肺去痰湯。金銀花三錢。生甘草五分。生地二錢。麥冬三錢。紫苑五分。百部五分。百合二錢。款冬花三分。天門冬一錢。貝母三錢。白薇三分。水煎服。服十劑而膈上痛少。輕者便有生機矣。再服十劑而更輕。再服十劑而漸愈。前後共服六十劑。而始全愈也。是方不寒不熱。養肺氣於垂絕之時。保肺葉於將萎之頃。實有奇功也。倘捷效於一旦。必至輕喪於須臾。甯忍耐以全生。切勿欲速而送死也。

世有膏粱子弟。多食厚味。燻熬烹炙煎炒之物。時時吞嚙。或美醞香醪。乘興酣飲。遂致咽乾舌燥。吐痰唾血。喘急膈痛。不得安卧。人以為肺經火熾也。誰知是肺癰已成乎。夫肺為五臟之蓋。喜清氣之熏蒸。最惡燥氣之炎逼。今所飲所食。無非辛熱之物。則五臟之中。全是

是一團火氣。火性炎上。而肺金在上。安得不獨受其害乎。肺既受刑。不能下生腎水。腎水無源。則腎益加燥。勢必取資於肺金。而肺金又病。能不已。虛而益虛。已燥而更燥。况各經紛然求逼。火烈金刑。肺乾生癰。必至之勢也。治之法。化毒之中。益之養肺之法。降火之內。濟之補腎之方。庶幾已成者可痊。未成者可散也。方用扶桑清肺丹。桑藥五錢。紫苑二錢。犀角屑五分。生甘草二錢。欵冬花一錢。百合三錢。杏仁七粒。阿膠三錢。貝母三錢。金銀花一兩。熟地一兩。人參三錢。水煎。調犀角末服。數劑可奏功也。此方肺腎同治。全不降火。蓋五臟之火。因飲食而旺。乃虛火而非實火也。故補其水。而金氣堅。補其水。而虛火息。况補中帶散。則補非呆補。而火毒又容易解也。

肝癰門

人有素多惱怒。容易動氣。一旦兩脇脹滿。發寒發熱。已而脇痛之極。手按痛不可忍。人以為肝火之盛也。誰知是肝葉生癰乎。世人但知五臟中惟肺生癰。不知肝亦能生癰也。且靈素諸書。亦未言及。得毋創論以驚世乎。余實聞異人言。謂脇痛手不可按者。肝葉生癰也。靈素一經不談者。肝經生癰也。世不常有。古人未有此症。所以畧而不言。但古今之氣運不同。而癰毒之生長不一。肝實能生癰。烏可缺而不論乎。况肝之生癰。未常無理也。

肝一惱怒則肝葉開張肝氣即逆大怒之後肝葉空脹未易平復使時加惱怒是肝葉竟不得安且怒後必然動火怒愈多而火愈盛火盛必燠肝乾肝血燠乾則肝氣大燥無血養肝更易發怒怒氣頻傷欲不鬱結而成癱焉可得乎然而癱生於內何從而見然內不可見而外則可辨也凡生癱者脇在左而不在右左脇之皮必現紅紫之色而舌必現青色也以此辨症斷斷無差而治之法必以平肝為主而佐之瀉火去毒之藥萬不可因循時日令其潰膿而不可救也方用化肝消毒湯白芍三兩當歸三兩炒梔子五錢甘草三錢金銀花五兩水煎汁一碗飲之一劑而痛輕二劑而痛又輕三劑而痛如失減半再飲數劑全愈此方用當歸芍藥直入肝中以滋肝血則肝血驟生易解肝血之燥又得甘草以緩其急梔子清其火金銀花解毒安得不取效之捷哉惟是火毒既盛肝血大虧用此方而不如此大劑煎飲亦自徒然倘執以為肝火之旺而非是肝癱之成單用歸芍以治脇痛斷不能取效也

人有左脇之間疼痛非常手按之更甚人以為脇痛而不知非脇痛也此乃肝經之癱耳夫肝經生癱多得之腦怒為多余前條已暢論之矣然而肝癱不止惱怒能生而憂鬱亦未嘗不生癱也惟是因惱怒而得之者其痛驟因憂鬱而得之者其痛緩當其初痛之時