

木 白雲閣藏本
刻 版

傷寒雜病論

(二)

傷寒雜病論卷四

漢長沙太守南陽張機仲景述

長安黃維翰竹齋校

溫病脈證并治

溫病有三曰春溫曰秋溫曰冬溫此皆發於伏氣
夏則病暑而不病溫

冬傷於寒其氣伏於少陰至春發為溫病名曰春
溫

夏傷於溼其氣伏於太陰至秋燥乃大行發為溫
病名曰秋溫

氣不當至而至初冬乃大寒燥以內收其氣伏於
厥陰冬至後天應寒而反溫發為溫病名曰冬溫
春秋病溫此其常冬時病溫此其變冬時應寒而
反大溫此非其時而蓄其氣及時不病至春乃發
名曰大溫此由冬不藏精氣失其正春時陽氣外
發二氣相搏為病則重醫又不曉病源為治乃誤
戾氣流傳遂以成疫

病春溫其氣在上頭痛咽乾發熱目眩甚則譫語
脈弦而急小柴胡加黃連牡丹湯主之

小柴胡加黃連牡丹湯方

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 桔梗根四兩

黃連三兩 杜丹皮四兩 甘草三兩炙 生薑三兩

大棗

一枚十二擘

右九味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升日三服

病秋溫其氣在中發熱口渴腹中熱痛下利便膿血脈大而短濶地黃知母黃連阿膠湯主之不便膿血者白虎湯主之

地黃知母黃連阿膠湯方

地黃八兩 知母四兩 黃連三兩 阿膠二兩

右四味以水一斗先煮三味取三升去滓內膠
烊消溫服一升日三服

白虎湯方見太陽病上

病冬溫其氣在下發熱腹痛引少腹夜半咽中乾
痛脹沉實時而大數石膏黃連黃芩甘草湯主之
不大便六七日者大黃黃芩地黃牡丹湯主之

石膏黃連黃芩甘草湯方

石膏半斤
綿裹碎黃連三兩黃芩四兩甘草二兩

右四味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

大黃黃芩地黃牡丹湯方

大黃

四兩

黃芩

三兩

地黃

四兩

牡丹皮

三兩

右四味以水一斗二升煮取二升去滓分溫二

服大便利止後服

病溫頭痛面赤發熱手足拘急脈浮弦而數名曰
風溫黃連黃芩梔子牡丹芍藥湯主之

黃連黃芩梔子牡丹芍藥湯方

黃連

三兩

黃芩

三兩

梔子

十四

牡丹

三兩

芍藥

三兩

右五味以水六升煮取三升去滓溫服一升日

三服

病溫其人素有溼發熱脣焦下利腹中熱痛脹大而數名曰溼溫豬苓加黃連牡丹湯主之

豬苓加黃連牡丹湯方

豬苓一兩 茯苓一兩 阿膠一兩 澤瀉一兩

滑石一兩 黃連一兩 牡丹一兩

右七味以水四升先煮六味取二升去滓內膠烊消分溫再服

病溫舌赤咽乾心中煩熱脹急數上寸口者溫邪干心也黃連黃芩阿膠甘草湯主之

黃連黃芩阿膠甘草湯方

黃連

一兩

黃芩

一兩

阿膠

一兩

甘草

一兩

右四味以水一斗先煮三味取四升去滓內膠

烊消分溫三服

病溫口渴欬嗽不止脹浮而數大此溫邪乘肺也

黃芩石膏杏子甘草湯主之

黃芩石膏杏子甘草湯方

黃芩

三兩

石膏

半斤

杏仁

十四枚

甘草

一兩

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升日

三服

病溫發熱腰以下有水氣甚則少腹熱痛小便赤

數脈急而數下尺中者此溫邪移腎也地黃黃檗
秦皮茯苓澤瀉湯主之

地黃黃檗秦皮茯苓澤瀉湯方

地黃六兩黃檗三兩秦皮二兩茯苓三兩

澤瀉一兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日

三服

病大溫發熱頭暉目眩齒枯脣焦譏語不省人事
面色乍青乍赤脈急大而數者大黃香蒲湯主之
若喉閉難下咽者鍼火商令出血若脈乍疏乍數

目內陷者死

大黃香蒲湯方

大黃四兩
舌蒲一兩
黃連三兩
地黃半斤

牡丹皮六兩

右五味以水一斗煮取六升去滓溫服二升日
三服

溫病下之大便溏當自愈若下之利不止者必腹
滿宜茯苓白朮甘草湯

茯苓白朮甘草湯方

茯苓四兩
白朮三兩
甘草一兩
炙

右三味以水八升煮取三升去滓溫服一升日

三服

風溫者因其人素有熱更傷於風而為病也脈浮弦而數若頭不痛者桂枝去桂加黃芩牡丹湯主之若伏氣病溫誤發其汗則大熱煩冤脣焦目赤或衄或吐耳聾脈大而數者宜白虎湯大實者宜承氣輩若至十餘日則入於裏宜黃連阿膠湯何以知其入裏以脈沉而數心煩不卧故知之也

桂枝去桂加黃芩牡丹湯方

芍藥三兩甘草二兩生薑炙三兩大棗十二枚

黃芩 三兩 牡丹皮 三兩

右六味以水八升煮取三升去滓溫服一升日

三服

黃連阿膠湯方見少陰病

病溫治不得法留久移於三焦其在上焦則舌蹇
神昏宜梔子湯其在中焦則腹痛而利利後復痛
脣口乾燥宜白虎加地黃湯其在下焦從腰以下
熱齒黑咽乾宜百合地黃牡丹半夏茯苓湯

梔子湯方

梔子 一枚十六 黃芩 三兩 半夏 半斤 甘草 二兩

右四味以水四升先煮梔子取二升半去滓內
三味煮取一升去滓分溫再服

白虎加地黃湯方

即白虎湯加地黃六兩

百合地黃牡丹半夏茯苓湯方

百合七枚地黃汁一升牡丹皮六兩半夏一升
茯苓四兩

右五味先以水洗百合漬一宿當白沫出去其
水別以水二升煮取一升去滓別以泉水四升
煮三味取二升去滓內地黃汁與百合汁更上

火令沸溫服一升日三服

傷寒雜病論卷五

漢長沙太守南陽張機仲景述

長安黃維翰竹齋校

傷暑病脹證并治

傷暑肺先受之肺為氣府暑傷元氣寸口脹弱口渴汗出神昏氣短竹葉石膏湯主之

竹葉石膏湯方

竹葉兩把粳米半升半夏辦斤石膏一斤

人參三兩麥門冬一升甘草二兩

右七味以水一斗先煮六味取六升去滓內粳

卷之三
米煮取米熟湯成溫服一升日三服

傷暑發熱汗出口渴脈浮而大名曰中喝白虎加人參黃連阿膠湯主之

白虎加人參黃連阿膠湯方

知母六兩石膏一斤碎甘草二兩粳米六合

人參三兩黃連三兩阿膠二兩

右七味以水一斗先煮六味米熟湯成去滓內膠烊消溫服一升日三服

傷暑汗出已發熱煩躁聲嘶脈反浮數者此為肺液傷百合地黃加牡蠣湯主之