

朱氏景岳發揮

景岳全書發揮總目

卷第一

賈序

全書紀略

傳忠錄

明理篇

陰陽篇

六辨變

表證篇

裏證篇

虛實篇

寒熱篇

寒熱真偽篇

十問篇

論治篇

中興論

反佐論

升陽散火辨

夏月伏陰續論

陽不足再辨論

小兒補腎論

命門餘義論

誤謬論

辨河間論

辨時醫論

胃氣

脈色

人迎氣口

寸口諸脈

真藏脈

通一子脈義

部脈神

正脈十六部

胃氣解

宜忌歌

卷第二

傷寒

內經脈義

經義傷寒總名

臟象別論

治形論

求本論

標本論

先天論

君火相火論

神氣存亡論

氣味篇

附華氏治法

論治篇

寒熱真偽篇

虛實篇

表證篇

裏證篇

陰陽篇

六辨變

表證篇

論初診傷寒法

諸風

瘧疾

傷風寒三證

論經義古今中風之辨

論瘧疾脈候

傷寒經辨陰證辨

論中風屬風說

治法六要五忌

兩感辨

論東垣中風說

汗散法

寒熱辨

論真中風

清利法

論吐下

非風

瘧疾

舌色辨

論正名邪無邪

論似瘧非瘧

再論陰陽證及傷寒十

論肝邪

論似瘧非瘧

論虛邪治法

論氣虛之本

火證

補中亦能散表

論經絡痰邪

論經義君火相火病

傷寒三表法辨

論寒熱證

論病機火證

傷寒無補治

論治血氣

論五志之火

溫病暑病

論非風諸證治法

虛損

發狂

汗證

論經義虛損病源

戰汗

論證

附論治按

勞倦內傷

怔忡驚恐

呃逆

經義

論怔忡

論證

辨脈治

論治

傷寒呃逆

關格

不寐

鬱證

論證

經義

論內經五鬱之治

飲食門

論治

論情志三鬱證治

經義

三消乾渴

嘔吐

論脾胃三方

論證

附按

脾胃

咳嗽

經義

論脾胃論

論傷感救證治

論嘔證治

論治脾胃

辨內傷咳嗽證治

治嘔氣味論

眩暈

喘促

治嘔氣味論

經義

論證

治嘔氣味論

論治

虛喘證治

卷第三

吐法新按

實喘證治

霍亂

總目

論證治

惡心嘔氣

經義證治
惡心嘔氣證治

氣分諸服論治
水腫論治

新按
述古

積聚

經義證治
述古

論腹急後重
論裏急後重

論大孔腫痛
論口渴

論小水
論陰陽疑似

附按
述古

吞酸

經義證治
述古

痞滿

經義證治
論治

心腹痛

反胃

經義證治
述古

泄瀉

論證治法
分利治法
諸泄瀉論治

食停小腹痛新按
括沙新按
附按
簡易方

噎膈

經義證治
述古

脇痛

經義證治

痢疾

經義證治

腰痛

經義證治

腫脹

經義證治

理詞
論瀉痢虛實

論積垢
論五色

頭痛

論治

眼目

論證
述古

鼻證

論治

聲痞

論治

咽喉

論證
論治

齒牙

論治

遺精

經義
論證

淋濁

論證
述古

論證
論治

血證

論證
論治

吐血
論治
新按

吐血
述古

便溺
論治

痰飲

論證
論治

吐法
述古
治記

濕證

論證
論治

黃疸

論證

痿證

述古

陽痿

論證
述古

疝氣

論證
述古

脫肛

論治

癲狂癡瘖

論證
述古

癰閉

論證
論治

秘結

論證
述古

癰風

述古變證治法

諸氣

天地陰陽氣

經脈類

經脈諸臟病因

血熱經遲

血寒經遲

血虛經亂

腎虛經亂

經期腹痛不止

崩淋經漏

殺血心痛

熱入血室

辨血色

胎孕類

胎脈

惡阻胎氣上逼

產育類

滑胎

產要

胞破產難

胞衣不出

氣脫血暈

子死腹中

產門不開

不閉子宮不收

小產斷產

下胎

產後類

帶濁遺淋類

帶下

白濁遺淋

子嗣類

宜麟策

癥瘕類

論證

血癥

食癥

氣癥

卷第四

小兒則

論產後當大補氣血

論產後三禁

產後腹痛

產後發熱

產後發熱

產後發熱

產後發熱

產後發熱

產後發熱

產後發熱

產後發熱

急驚風

附疹吐瀉

大驚卒恐

痘瘡

夜啼發熱治法

總論脈法

新按發熱弗藥可愈

形色情性

諸熱辨證

五臟實寒熱

吐瀉新按

總論治法

霍亂吐瀉

發熱三朝治法

論瀉痢真尿色

起發三朝治法

五疳證

結毒三朝治法

盜汗腹痛

壓後三朝治法

腹痛腹瀉

臨伏不快

麻疹

瘡疔黑陷

疹證

症瘡黑陷

疹初熱

症瘡黑陷

疹形治法

症瘡黑陷

驚風

腹瀉

夾斑啼哭

大便閉

外科鈴

虛實治法

汗下法

用針勿忌

溫補從證

生肌收口

用看散藥

戒忌調護

戒忌調護

時毒

新方八陣

肺癰肺痿
鶴膝風

便毒
懸癰

本草正

山草部

人參

甘草

柴胡

黃芩

黃連

知母

地黃

麻黃

當歸

芍藥

附子

木部

胡椒

槐花

黃蘗

側柏

石部

石膏

石部

人部

紫河車

地黃

黃連

新方八陣

新方八畧引

補畧

攻畧

散畧

寒畧

熱畧

因畧

補陣

大補元煎

左歸飲

右歸飲

左歸丸

右歸丸

五福飲

一陰煎

加減一陰煎

三陰煎

四陰煎

五陰煎

大營煎

補陰益氣煎

兩儀膏

貞元飲

當歸地黃飲

濟川煎

地黃醴

和陣

金水六君煎

六安煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

歸腎丸
贊化血餘丹

養元粉

元武豆

王母桃

你瘡飲

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

和胃二陳煎

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

赤金豆

敦阜丸

散陣

綠玉女煎
約玉泉散

固陣

秘元煎
固真丸
玉關丸
敦阜糕

熱陣

六味回陽飲

因陣

道遠飲
決津飲
五物煎
調經飲
通於煎
胎元飲
脫花煎
九蜜煎
清化飲
鎮麟珠飲
贊育丹
榮歸飲
六物煎
九味異功煎
瓜膏
槐花蓋

養中煎

溫胃煎

五君子煎

參姜飲

胃關煎

佐關煎

抑扶煎

四維散

鎮陰煎

歸氣散

煖肝煎

壽脾煎

寒陣

秘傳走馬通聖散

三德飲

五德飲

復陽丹

黃芽丸

一炁丸

保陰煎

從薪飲

大分清飲

化陰煎

茵陳飲

清肝煎

安胃煎

化胃煎

聖術煎

溫臟丸

補陣

古方八陣

加味四君湯
加味六君湯

歸脾湯
人參湯

獨參湯
生脈散

柔脾湯
全鹿丸

和陣

五隔寬中散
易老天麻丸

散陣

愈風湯

熱陣

四神丸
石刻安腎丸

己寒丸
紅丸子

婦人規古方

二味參蘇飲

景岳全書發揮總目終

景岳全書發揮卷四

長洲葉桂天士甫著

小兒則

小兒之體柔嫩易實易虛用藥一誤生死立判所以藥不可輕投也故子和有過愛小兒反害小兒論丹溪有慈幼論不可不觀試觀貧窮之家食物淡薄夜裳不周有病無藥生子多有可見小兒有病不必服藥以調和為要

初誕法

保嬰諸書皆云分娩之時口含血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏命門致他日發為驚風發熱痘疹等證此說固似有理然嬰兒通體無非血氣所結而此亦血氣之餘即使嚥之亦必從便而出何以獨留為害無足憑也惟是形體初成固當為之清楚其法於未啼時用軟帛裹指挖去口中之血母之有火者熱氣蘊蓄結成血塊自宜去之嚥下雖從便出其毒氣留於腸胃也既云此說無足為憑今仍云挖去何必言前人之非耶

若母氣素寒小兒清弱者

母氣素寒馬能受胎惟熱能受故有胎毒而出痘

只以淡薑湯拭口最能去胃寒

并可免吐瀉之患此法最妙

未見妙拭後仍用核桃法

以核桃去皮嚼爛包納兒口使吮其汁此法亦未見長

○

一古法拭口多有黃連者不知黃連大苦大寒小兒以胃氣為主安得初生即以

苦劣之氣相犯致損胃氣則他日變嘔變瀉由此而起矣

小兒在腹蘊熱者多黃連解毒亦是極妙何得一拭

口即傷胃氣而變嘔瀉猶如毒藥之不可犯此言大謬何小兒初生即云胃寒甚言其姜湯之妙足見景岳偏執熱藥之誤

護養法

衣服當隨寒熱加減但令背煖亦勿令出汗恐表虛風邪易傷乳哺亦不宜過飽陳氏所謂忍三分寒喫七分飽既云小兒胃寒又云忍三分寒自相矛盾

初生兒看病法

以手指探其口雖發聲而從容咂指者其病輕若即發聲不咂指而色或青紅兼紫者此落地受寒之甚也青紅兼紫此外受寒邪鬱過其火非內寒也

生兒怯弱必須以藥扶助之天稟怯弱亦非藥能扶助調其飲食適其寒溫可也若七日內肌肉頓肥則必病矣過此以往漸肥者不足慮也治肥之法宜清痰濕解胎毒朝內之兒藥難輕用

聲音

又曰內奪而厥則為瘖俳此腎虛也小兒無此症

顏色

白主氣虛甚則氣脫主無火主脾肺不足當云陽氣弱若無火則死○兩顴鮮紅或作或止者謂

之面戴陽乃真陰虛弱非陽症也乃胃家有火陽明胃脉榮於面不可認戴陽而用熱藥在大人則有此病

撮口臍風

凡治此之法痰盛者先治痰火盛者先清火若無火無痰專當溫補脾胃

調養脾胃

驚風

慢驚者陰症也虛症也此脾肺俱虛肝邪無制因而侮脾生風無陽之症也故其形氣病氣俱不足者是為慢驚此當專顧脾腎以救元氣

肝脾兩臟受病若講補腎則凝滯不舒胸膈不寬痰氣反

甚矣

論驚風證治

若痰因火動治火為先火以痰留去痰為主火甚者宜龍胆山梔黃連黃柏石膏大黃之屬

雖火甚胆草大黃不宜輕用

痰之甚者宜牛黃胆星天竺黃南星半夏白芥子之屬

白芥子非

驚風治痰之藥

急驚風

若不顧真陰過用祛風化痰之藥則脾益虛血益燥邪氣綿延必成慢驚矣此中陰虛之義皆人所不知

小兒純陽之體因陰精不足也至十六歲而始成故丹溪有陽

丹溪已言之久矣

何雨不相符耶若屢用驚藥而脾胃虛寒者須用六君子以補脾土丁香木香以

培陽氣

立齋治驚風不言補腎竟講肝脾亦是高見

慢驚風

脾腎虛寒之甚或吐瀉不止宜附子理陰煎再甚者宜六味回陽或四味回陽飲驚

雖虛寒而補脾之中加熱藥為主理陰回陽皆血藥加參附未

為切中當以參朮扶脾為先觀立齋用藥高出景岳萬萬矣

愚按附子溫中回陽為慢驚之聖藥竟講附子回陽之妙此景岳之常技不知以參朮為主而以附子佐之乃為正治景岳不知君臣佐使故持論如此觀前賢用藥俱重脾胃則可知矣

大驚卒恐

治大驚氣散之病當以收復神氣為主驚則氣亂雖大驚未可竟以收復神氣為主當察色審症有痰者清痰安神有火者清火

安神不可單用補劑須以活法處治為妙

發搐

腎虛則為二便不禁津液枯槁為聲不出為戴眼肢體厥逆火不歸源小兒火不歸元者少○

若病已久尤當專顧脾腎幼科治小兒當以後天脾胃為主先天腎家且慢講

夜啼

若陰盛陽衰心氣不足至夜則神有不安而啼叫者宜四君子五味異功或七福飲

心氣不足至夜神不安而啼宜養心安神非四君五味七福之治○若兼吐瀉少食脾胃虛寒也吐瀉少食不一其治非獨脾胃虛寒

○若大便不化食少腹脹脾氣虛弱也與前症同其治亦同○若面色白黑睛少至夜分陰中

陽虛而啼者肝腎不足也宜六味八味丸小兒不必用此兩方○火之微者宜生脉導赤有火亦非

生脉散之治

夜啼治法再宜斟酌
不可竟言補脾腎

外感發熱治法

凡暴感者極易解散一汗可愈但察其氣血平和別無實熱等症或但倦怠昏睡者則但以四柴胡飲或五柴胡飲為主

竟講柴胡解散亦是景岳常技須分經絡見症用藥方謂高明若照新方治外感發熱殺人多

矣

○若中氣不足而兼熱兼嗽者宜金水六君煎

大不通方

○冬受寒邪至春夏而發

熱者是為小兒正傷寒

春夏之病稱正傷寒大謬

新按 余之仲兒生於乙卯五月於本年初秋忽感寒發熱脉微緊然知其臟氣屬

陰不敢清解遂與芎蘇羌芷細辛生薑之屬一劑下咽不惟熱不退而返大瀉連二

日不止而喘繼之愈瀉則愈喘沈思良久漸有所得乃用人參二錢生薑五片煎汁

半盞自午至酉完此一劑復以人參如前煎湯盡其劑而氣息遂平瀉亦止而熱亦

退矣余因紀此以見溫中散寒之功其妙有如此者

五月至新秋僅兩月耳嬰兒不能言語脉亦難憑初秋暑邪尚

熾感而發熱當用清暑之藥乃孟浪投以辛溫發表純陽柔嫩之軀當暑傷元氣之時肺氣焉得不耗散乎肺與大腸相表裏肺氣虛注其大腸而作瀉肺氣耗散則喘作此辛溫發表之誤也故用參補其肺氣而愈乃不省其藥誤反云治病之妙何憤憤若此設竟云人參可以治發熱必誤後人故不得不為之辨白

外感發熱弗藥可愈

但於熟睡之頃夏以單被冬以綿被蒙頭鬆蓋勿壅其鼻蒙頭亦有誤若寒邪甚者兩三微汗之無有不愈過汗之亦不妙

諸熱辨證

其有取汗至再而熱不退者必癰毒痘疹之候發熱竟講取汗必有所誤

一小兒飲食內傷本無發熱之症蓋飲食傷臟則為脹痛吐瀉本非肌表之病焉得

發熱內傷飲食亦有發熱者但不頭痛惡寒耳此景岳未到之處今人但見小兒發熱則多言傷食而妄行消導

謬亦甚矣發熱多端不可但言外感

一小兒疳積發熱此誠飲食內傷所致自內而發於外

凡陰虛發熱者此即勞損症也亦名為童子勞五六歲至數歲則有此得自母胎也

內熱症

故內熱者宜清涼不宜升散升散則內火愈熾火空則發也外熱以膚淒之邪風寒

外襲病在陽分外熱未可執定風寒外襲而妄投發表故外熱者宜解散不宜清降有辛溫解散辛涼解散察症用藥未

可竟言解散而不分明白

肢體熱輕則惺惺散重則人參羌活散內熱不可用羌活發表○陽明火盛兼少陰水虧者玉

女煎病屬兩途石膏施於腎水不足者不宜○汗後陰虛陽無所附而熱者四物湯加參芪川芎汗出不宜用