

白雲閣藏
水刻版

傷寒雜病論
(三)

傷寒雜病論卷九

漢長沙太守南陽張機仲景述

長安黃維翰竹齋校

辨陽明病脈證并治

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

陽明之為病胃家實是也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若

利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣
內實大便難者此名陽明也

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒
反惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰
雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中主土也萬物
所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病
也

本太陽病初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬

陽明也

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出熾熾然者是
轉屬陽明也

傷寒三日陽明脈大者此為不傳也

傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰
者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日
大便鞭者為陽明病也

傷寒轉屬陽明者其人濺然微汗出也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡風脈浮而
緩若下之則腹滿小便難也

傷寒雜症 卷九
陽明病若能食名中風不能食名中寒

陽明病若中寒者不能食小便不利手足澼然汗
出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃
中冷水穀不別故也

陽明病初欲食小便不利大便自調其人骨節疼
翕翕然如有熱狀奄然發狂澼然汗出而解者此
水不勝穀氣與汗共并脈小則愈

陽明病欲解時從申至戌上

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者其人本虛
胃中冷故也

陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難
此欲作穀瘵雖下之腹滿如故所以然者脈遲故
也

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此
以久虛故也

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥
者必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者頭不痛
陽明病但頭眩不惡寒故能食若欬者其人必咽
痛不欬者咽不痛

陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃

陽明病脈浮而大者必潮熱發作有時但浮者必
自汗出

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不
了了者此必大便鞭故也以亡津液胃中乾燥故
令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四
行今日再行則知大便不久必出所以然者以小
便數少津液當還入胃中故知不久必大便也
傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

陽明證心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者

死利止者愈

陽明證眼合色赤不可攻之攻之必發熱色黃者
小便不利也

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

調胃承氣湯方見太陽病上

陽明病脈實雖汗出而不惡熱者其身必重短氣
腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇
然汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多
微發熱惡寒者外未解也其熱不潮者未可與承
氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣

勿令大泄下

大承氣湯方

大黃酒洗厚朴半斤炙枳實五枚芒消三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃更煮取二升去滓內芒消更上微火一兩沸分温再服得下餘勿服

小承氣湯方

大黃酒洗厚朴二兩炙枳實三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分温再服初服更衣者停後服不爾者盡飲之

陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

陽明病實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語也直視譫語喘滿者死下利者亦死

陽明病發汗多若重發汗以亡其陽譫語脈短者

死脈自和者不死

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘
日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者
發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦
者生瀉者死微者但發熱讞語者大承氣湯主之
陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭
鞭則讞語小承氣湯主之

陽明病讞語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之
陽明病服承氣湯後不轉失氣明日又不大便脈
反微澀者裏虛也為難治不可更與承氣湯也

陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭爾宜大承氣湯下之

陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之熾然汗出則愈

陽明病汗出譫語者以有燥屎在胃中此為實也須過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之宜大承氣湯

傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢若發

汗則譫語遺尿下之則手足逆冷額上出汗若自汗者宜白虎湯自利者宜葛根黃連黃芩甘草湯
白虎湯方見太陽病

葛根黃連黃芩甘草湯方見太陽病中

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足皴皴汗出大便難而譫語者下之則愈宜大承氣湯

陽明病脈浮而大咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反譫語若加溫鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者梔子豉湯主之

梔子豉湯方見太陽病中

陽明病渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主

之

白虎加人參湯方見太陽病

陽明病脹浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯

主之

豬苓湯方

豬苓去一兩茯苓一兩澤瀉一兩阿膠一兩

滑石碎一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿

膠烱消溫服七合日三服

陽明病汗出多而渴者不可與豬苓湯以汗多胃中燥豬苓湯復利其小便故也

陽明病脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

四逆湯方見太陽病上

陽明病胃中虛冷不能食者不可與水飲之飲則必噦

陽明病脈浮發熱口乾鼻燥能食者衄

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹

飢不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者與小柴胡湯

小柴胡湯方 見太陽病中

陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解也

陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得涕嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不

解病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘
證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

麻黃湯方見太陽病中

動作頭痛短氣有潮熱者屬陽明也白蜜煎主之
白蜜煎方

人參一兩 地黃六兩 麻仁一升 白蜜八合

右四味以水一斗先煮三味取五升去滓內蜜
再煎一二沸每服一升日三夜二

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內
竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而