

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴司

和陣

局方

二陳湯

治痰飲嘔惡風寒欬嗽或頭眩心悸或中脘不

快或因生冷或飲酒過多脾胃不和等證

陳皮

半夏制各三錢

茯苓 二錢

炙甘草 一錢

水二鍾薑三五片棗一枚煎八分食遠服

加減二陳湯

治嘔吐吞酸胃脘痛呃逆

即前方加丁香九粒氣滯甚者可加一二錢

丹加味二陳湯

治食鬱痰滯胸膈不快

蒼朮

米泔浸

白朮

炒

橘紅

半夏

泡

茯苓

川芎

香附 各八分 枳壳

黃連 薑炒

甘草 各五分

水盞半煎八分食前稍熱服

二木二陳湯 四

治一切嘔吐清水如注

蒼朮 土炒

白朮 炒

陳皮

半夏 制

茯苓 各一錢

炙甘草 五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分稍熱服○虛寒者加人參

煨乾薑○痰飲加南星倍半夏○宿食加神麴砂仁

明黃芩二陳湯 五

治熱痰

黃芩

陳皮

半夏

茯苓 等分

甘草 減半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

柴葛二陳湯 六

治一切瘧暑濕勞食等證

柴胡

乾葛

陳皮

半夏

川芎

黃芩

各等分若陰瘧除此味

茯苓

甘草

白朮

蒼朮制

水二鍾薑三片煎服○內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久瘧及發散過者除之○陽分汗多加人參黃芪去乾葛○陰分虛者加酒炒芍藥當歸生地○久瘧微邪潮熱加四君子湯去祛邪之藥○若欲截瘧加常山檳榔青皮貝母各一錢桂附二陳湯七方在熱陣百十五

治寒瘧厥冷

金匱

小半夏湯

八

治嘔吐穀不得下及心下有飲者

半夏一升

生薑

半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服○局方用半夏五錢生薑二錢半水一鍾半煎服

金匱小半夏加茯苓湯九 治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者

即前方加茯苓三兩煎法同

金匱大半夏湯十 治胃反不受食食入即吐○外臺云治嘔而

心下痞鞭者

半夏二升洗 人參三兩 白蜜一斤

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮藥取二升

半溫服一升餘分再服

御藥大半夏湯十一 一名橘皮湯 治痰飲及脾胃不和

半夏 陳皮 白茯苓各二錢

水二鍾薑五片煎八分溫服

茯苓半夏湯十二 治嘔吐噦心下堅痞膈間有水痰眩驚悸及小兒等病

白茯苓二兩 半夏五錢

右每服三五七錢薑水煎服

宜橘皮半夏湯十三治痰涎壅嗽久不已者常服潤燥解肌

熱止嗽

陳皮五錢半夏製二錢半

水一鍾半加生薑三五片煎七分溫服

靈樞秣米半夏湯十四久病不寐者神效世醫解用之

秣米一升半夏五合

右用千里長流水八升揚之萬遍取清者五升煮秣米半夏炊以葦薪令竭至一升半去渣飲汁一小杯日三服其新病者覆杯即臥汗之即已久病者三日而已也

東垣半夏白朮天麻湯十五治眩暈及足太陰痰厥頭疼

半夏錢半白朮神麴炒各一麥芽

陳皮各錢半人參黃芪茯苓

蒼朮

乾薑 三分

天麻

澤瀉

各五分

黃柏 二分

右咬咀每服半兩水二鍾煎八分食遠熱服

黃芩半夏生薑湯

十六

治乾嘔而利者

黃芩

生薑

各三兩

炙甘草

芍藥

各二兩

半夏

半升

大棗

十二個

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

東垣

平胃散

十七

治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛

嘔噦惡心吞酸噫氣體重節痛白利霍亂噫膈反胃等證

厚朴

薑製炒

陳皮

去白各五兩

蒼朮

去皮米泔浸炒八兩

炙甘草

三兩

本方加人參茯苓各二兩即名參苓平胃散

右爲末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服

○或去薑棗入鹽一小捻單以沸湯點服亦可○如小便不

利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麴麥芽枳實○如胃中
氣痛加木香枳實或枳壳○如脾胃困倦加人參黃芪○如
有痰加半夏○如便鞭腹脹加大黃芒硝○如脉大內熱加
黃連黃芩

調氣平胃散 十八

治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴 製

陳皮

木香

烏藥

白豆蔻

砂仁

白檀香 各一錢

甘草 五分

蒼朮 錢半

藿香 一錢一分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

錢氏益黃散 十九

治脾土虛寒寒水反來侮上而嘔吐不食或

肚腹作痛或大便不實手足逆冷等證

陳皮 一兩

青皮

訶子肉 炮去

炙甘草 各半兩

丁香 一錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散 二十

治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂

泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣癰痢傷寒等證

藿香

紫蘇

桔梗

白芷

大腹皮

錢各二

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白朮

厚朴

各八分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗

不換金正氣散 二

一

治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發

寒熱或作瘧疾或受山嵐瘴氣等毒

厚朴

薑製

藿香

半夏

蒼朮

米泔浸

陳皮

各一錢

甘草

炙五分

薑棗水煎服

不換金正氣散 二

二

治感冒風寒或傷生冷或瘴癘或痰

癰

蒼朮

米泔浸

厚朴

薑汁炒 各四分

橘紅 三兩

炙甘草

半夏

制

藿香

各二兩

人參

木香

濕紙裹

白茯苓

各一兩

右每服

一兩薑棗水煎服

徐氏正氣散 二三

正胃氣進飲食退寒瘧

食瘧瘴氣脾胃滯

用之為宜

藿香

草果

各二兩

半夏

制

陳皮

厚朴

砂仁

炙甘草

各一兩

右為末每服

三錢加生薑七片棗三枚

同煎俟瘧未發前和

渣服

濟生

大正氣散

二四

治脾胃不和為風寒

濕氣所傷心腹脹悶

有妨飲食

白朮

陳皮 各二錢 半夏 制

藿香葉

厚朴 薑炒

桂枝 枳殼

檳榔

乾薑 炮各錢

甘草 炙五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分不時溫服

東垣升陽益胃湯二五 治秋燥令行濕熱少退脾胃虛弱怠惰

嗜卧體重節痛四肢不收口苦舌乾飲食不消大便不調小

便頻數兼見肺病洒淅惡寒慘不樂面色惡而不和乃陽

氣不伸故也當升陽益胃○良方無黃芪甘草半夏芍藥四

味

人參

炙甘草

半夏 脉瀉 薑汁 黃芪 二錢

白朮 三分

白芍

防風 羌活

獨活 各五分

柴胡

茯苓 小便不利澤瀉 不淋者勿用 各三分

陳皮 四分

黃連 二分

右咬咀每服三錢漸加至五錢生薑五片棗二枚水三鍾煎一鍾早飯午飯之間溫服忌語話一二時及酒濕助火之物○服藥後如小便畢而病反增是不宜利小便也當去茯苓澤瀉若得喜食增食初二日間不可太飽恐藥力尙淺胃氣再傷不得轉運也或用美食以助藥力而滋胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之沉降也亦可小役形體使得氣升發切勿大勞致令復傷但以胃氣安靜爲尤善

藏

白朮湯二六

治風濕惡寒脉緩

白朮

防風

甘草

右咬咀加生薑煎服

濟生

白朮湯二七

治五臟受濕欬嗽痰多氣喘身重脉濡細

白朮

橘紅

半夏

茯苓各二錢

炙甘草一錢

水一鍾半薑五片煎七分食遠服

良方三味白朮湯二八方在婦人十二

治妊娠內熱心痛

良方四味白朮湯二九方在婦人十三

治妊娠胃虛惡阻

白朮散二十治自汗盜汗極效

白朮半斤

右將白朮切成小塊用浮麥一升水一斗同煮乾如白朮省硬再加水煮透爛取起切片焙乾爲末每服二三錢仍用浮麥煎湯食遠調服○如治小兒以炒黃芪煎湯草兒大小與服○忌蘿蔔辛辣炙博之物乳母尤忌

明旨白朮散三一 方在固陣三

治虛風多汗痿弱

良方白朮散 三二 方在婦人十一

治妊娠傷寒內熱等證

調胃白朮散 三三

治脾胃不和腹脹泄瀉身面浮腫

白朮

茯苓

各二錢

陳皮

白芍藥炒

澤瀉

檳榔

各一錢

木香

五分

水二鍾薑三片煎八分食遠服○如腫不退倍加白朮并枳

實麩炒一錢

白朮芍藥湯

三四

治脾經受濕水泄體重微滿因弱無力不

欲飲食或暴泄無數水穀不化宜此和之

白朮

炒

芍藥

各一兩

甘草

炒半兩

右每用一兩水煎服

草

白朮芍藥散

三五

治痛瀉要方

白朮

炒三兩

芍藥

炒二兩

陳皮

炒兩半

防風

一兩

右或煎或丸或散皆可用久瀉者加炒升麻六錢

^金苓桂朮甘草湯 三六 病痰飲者當以溫藥和之凡心下有

痰飲胸脇支滿目眩此方主之

茯苓 四兩 桂枝 白朮各三兩 甘草二兩

右以水六升煮取三升溫分三服小便則利

神朮散 三七 治傷寒頭痛身熱等證

蒼朮 二錢 川芎 藁本 甘草各一錢

水二鍾薑三片煎一鍾不拘時服

局神朮散 三八 方在散陣六五

治四時瘟疫頭疼發熱

^海神朮散 三九 治風濕惡寒脉緊

蒼朮 防風 白朮

右咬咀加葱白煎服○治剛瘧無汗者加羌活或獨活麻黃

沉香降氣散 四十 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞或嘔

飲吞酸脇下妨悶

沉香 二錢八分 砂仁 七錢半 香附子 去毛鹽水炒六兩 二錢五分

炙甘草 五錢五分

右為極細末每服二錢入鹽少許沸湯調不拘時服或淡薑

湯亦可

和蘓子降氣湯 四一 治心腹脹滿喘促氣急消痰進食

蘓子 炒 半夏 前胡 當歸

陳皮 厚朴 制各八分 桂枝 甘草 各三分

水二鍾薑三片煎七分不拘時服

林醫小降氣湯 四一 治濁氣在上痰涎壅盛

家紫蘓 台烏藥 白芍 陳皮 各二錢

炙甘草 五分

水一鍾半生薑三片棗一枚煎七分食遠服

純木香順氣散 四三

治氣滯腹痛脇痛

木香

香附

檳榔

青皮

陳皮

枳壳

砂仁

厚朴制

蒼朮 各一錢

炙甘草 五分

水一鍾薑三片煎八分食遠服

局木香調氣散 四四

木香

白檀香

白豆蔻

丁香 各二錢

炙甘草

藿香

各八錢

砂仁 四錢

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

流氣飲子 四五

治三焦氣壅五臟不和胸膈痞滿肩背攻痛

嘔吐氣喘痰盛浮腫等證口卽外科方脉流氣飲

木香 磨片

枳殼

青皮

陳皮