

增補
加批

臨證指南醫案

臨證指南種福堂公選良方卷八

葉桂 天士先生論

全人公較

〔黃疸〕

治疸神飲

將茵陳草煎濃湯。每日以多吃數為妙。要忌葷腥魚肉。并忌鹽味而淡食。則能速愈。此草真治疸

神藥也。若腹中不快。量加神麴麥芽。同煎服之。更無他藥。功能勝此者。若小便不利。或以車前子湯同吃。或

用瓜蒌根打汁碗許服。連服更效。

劉黃胆方

雄鰂魚一個去頭骨至

胡椒每歲一粒至十粒上研細

麝香分三

右二味同煮爛。麝香另加。不必同煮。恐

粘染白上。將蛤蜊殼填滿。合於病人臍上。用絹縛緊。一日夜即愈。

〔河白〕

治河白良方

將梔子黃同雞子白。飛麴搗成餅貼臍內。再以茵陳草 通草 甘草 燈草 煎湯服之。

名四草湯

〔中暑霍亂〕

治中暑昏眩煩悶欲絕急救方

取田中乾泥做一團。堆在病人肚上。使少壯人撒尿於泥團肚臍中。片時即

得生矣。甦後不可飲冷湯。須進溫米湯。又

挖地深三尺。取新汲水。傾入坑內。攪濁。飲數甌即愈。

治中暑法

用大蒜一握同新黃土研爛。以新汲水和之。濾去渣灌入即活。凡中暑傷者。不可便與冷物。俟稍

甦方可投冷物。則中氣運動無患也。

治傷暑霍亂神方

絲瓜葉片

白霜梅葉一枚并核中仁

右同研極爛。將新汲水調服。入口立瘥。切不可即熟

湯。

又取扁豆葉搗汁一碗。飲之立愈。

治傷暑急暴霍亂吐瀉方

陳皮

藿香錢各五

右用土澄清水二杯。煎一杯服之立愈。

急救霍亂吐瀉抽筋危症方

不開轉筋霍亂。令人偃卧。將膝下腕內。以手蘸溫水輕輕急拍。直待紫紅筋現。

起用磁鋒刺出血立愈此名委中穴在膝後對面

治乾霍亂前方

上不得吐下不得瀉身出冷汗危在頃刻者食鹽兩薑五錢同炒變色以水一大碗

煎服吐出自愈

不可熱服好後切不可遽吃飯食俟餓極後方可吃稀粥

治乾霍亂方

只一樣腹痛絞痛不可忍者切不可吃藥并熱湯水一吃即死將冷水一碗調入食鹽二三錢

吃下吐則再吃多吃多吐則邪散而愈

〔消渴〕

玉泉散治消渴之神藥也

白粉甘葛 天花粉 麥冬 生地 五味子 甘草 糯米 右服一劑

還津丸

生津止渴 霜梅 烏梅各二十五 蘇薄荷末兩 冰片半 硼砂半 共研極細為丸每含一

丸津液立至

消渴潤燥方

白蜜 人乳酥各一 右溶化一處每日不拘時服 消渴方 用繅絲湯飲之

〔瘟疫〕

辟瘟丹方

此藥燒之能令瘟疫不染空房內燒之可辟穢惡 乳香 蒼朮 細辛 川芎 甘草

再加檀香一兩亦可共研細末棗肉為丸如芡實大

神聖辟瘟丹

蒼朮倍用 羌活 獨活 白芷 香附 大黃 甘松 山柰 赤箭 雄黃各等 右為

末麩糊丸如彈子大黃色為衣曬乾焚之

治大頭瘟方

頭面腮際腫脹極大寒熱交作甚者崩裂出膿不可敷藥恐邪氣入內以至於死

人中白

下馬桶底也 火煨研末每服二錢白滾湯調服 又 將好青黛末調服二錢

又 只用馬藍頭一把搗汁將鵝毛搽上一日五六次熱氣頓出親驗真神方也

治抱頭火丹

即大頭瘟 將扁柏葉搗爛用雞子清調敷神效

治鷓鴣瘟方

兩腮腫脹憎寒惡熱者 外用赤豈半升為末水調敷或用側柏葉搗爛敷之內用薄荷濃湯

熱服

〔痧〕

治痧脹腹痛方。

凡痧脹夏月多患此症。面色紫赤。腹痛難忍。使飲熱湯。便不可救。即溫湯亦忌。如遇此症。速

取生黃豆咀嚼嚥下。約至數口。立刻止痛。平人食生豆最引惡心。止有痧脹人食之。凡覺甘甜。不知腥氣。此

方既可療病。且可辨症。真奇方也。

沉香鬱金散。治痧氣寒凝。以及腹痛。

沉香 木香 鬱金各一 烏藥錢三 降香錢二 細辛錢五 右忌見

火生研為細末。每服三分。將砂仁湯稍冷送下。

痧藥方。名火龍丹。

牛黃錢一 麝香錢一 冰片錢二 硃砂二兩 草撥錢一 真金箔張一百 火鎗硝兩

研砂錢五

牙兒錢一

各研極細。端午午時合。如痧脹腹痛。將此藥嗅鼻中。并放舌尖上。吃下亦可。

又 名蟾酥丸。

雄黃錢三 麝香錢三 木香錢一 丁香一錢 俱不見火 蒼朮錢三 蟾酥錢一 石菖蒲錢一 炒山茨姑半錢 右共為末。火酒化蟾酥為丸。如粟米大。硃砂為衣。如難丸。少加米飲。每用二三粒。放舌尖上

化下。加入西牛黃金箔。端午午時合。尤妙。

又 沉香細研 母丁香 硃砂水 雄黃五錢 以上各

廣木香兩

麝香錢三

茅山蒼朮淨末二兩

真蟾酥錢三

右俱忌見火。為細末。各秤准分量。將火酒化

蟾酥為丸。

如丸不就。少加米飲丸。如粟米大。每服二三丸。放舌尖上化下。

右共為末。每用一茶匙。放舌尖上。冷茶送下。或

神妙痧藥方。

北細辛兩三

荊芥錢六

降香末錢二

鬱金錢一

右共為末。每用一茶匙。放舌尖上。冷茶送下。或

津嘔嚥下。

白痧藥方。

白胡椒兩

牙兒錢一

火硝

檀香末

明礬

丁香

蟾酥三錢

北細辛錢二

冰片

麝香各五

金箔量加

〔瘰癧〕

內消瘰癧痰毒方。

未穿破者為瘰核。已穿破者為瘰癧。三五个連者為串痰。用羊角數對。以威靈仙四兩

共入瓦罐內。加清水煮數沸。候角軟取出。切薄片。用新瓦燒紅。將角鋪上焙炒過。研細。每成一兩。加廣木香

一錢。白芥子三錢。共為末。煉蜜為丸。用枳櫚煎湯下。或夏枯草湯下亦可。服至七日。後大便下如黑羊屎。小

便由黑水自消。婦人如爛開兩脇服之亦效。忌生冷煎炒房事。

內消瘰癧應驗方。土貝母 白芷各五錢 共為末。糖霜調陳酒下。三錢。重者三服愈。

治痰核方。半夏末川貝末各一分。用雞蛋大頭穿一孔。不破內膜。入藥在壳內。膜外虛空處。如虛人再加人

參末三分。和入。以紙封固。鹽飯鍋內蒸熟。吃之。每日一個。久之自愈。

又 每雞子一個。入貝母末三匙。照上法蒸熟。夏枯草湯。或銀花湯下。

取瘰核法。名提癰丹。水銀 硼砂 火硝 明礬 兒礬 食鹽各一兩 硃砂二錢 用粗瓦盆於前藥上

合粗碗一隻。鹽泥封固。炭火鍊三炷香。先丈後武。冷定。取出昇在粗碗上。藥。白米飯搗丸。菜荳大。硃砂為衣。

每用一丸。放瘡上。棉紙封二三層。一日夜急揭起。則核隨紙帶出。丸可再用。

治瘰癧方。將胡桃一枚。劈做兩半。將一半挖去肉。以蟬脫塞實。對合。用山泥包好。煨存性。研細。陳酒下。每日

服一枚。一月愈。

治瘰癧結核。九真藤即何首烏藤 洗淨。日日生嚼。并取葉搗塗之。

蝙蝠散。治瘰癧多年不瘥。蝙蝠一個 貓頭一個 右同燒灰。撒土黑蓋。煨其灰骨化。碎為細末。濕即乾。搽乾。

則油調敷。內服五香連翹湯效。

治痰核瘰癧方。用鼠薹揀兩頭尖者為雄。兩頭圓者為雌。揀開各曬乾。研末。男用雌。女用雄。將雞子一個。頂

上打一小洞。傾去白。但存黃。入鼠薹在內。以滿為度。攪勻。用皮紙封固小洞。飯上蒸熟。去壳。臨睡時搓碎。好

酒送下。隔一日再服。雖連年破爛者。不過三四枚而愈。未破者即消。

燕鼠膏。治瘰癧痰核癰疽發背腫毒。全蝎次 熟水浸透洗三 白芷 黃連 黃柏 黃芩 當歸 山甲

各一錢 生地 赤芍各五錢 官桂二兩 海藻二兩 三錢洗 番木鱉五錢 用麻油一斤四兩。浸藥五日。熬

焦黑色去渣。將料油秤準。每油二兩。用飛淨黃丹一兩。收滴水不散。先入白占一錢五分。黃占三錢。即下黃

丹。再下黃粉一兩。用桑枝不住手攪成膏。候冷入水浸三四日。再用文火溶化。再入沒藥三錢 阿魏三錢

麝香一錢 血竭二錢 朝南燕五錢 雄黃一錢 硃砂一錢 兩頭尖一錢 白昇丹四錢 以上各藥為極細

末入膏內攪極勻用時隔湯溶化攤貼勿見火 白昇藥方 水銀 皂礬 火硝 白礬 炒熟鹽 共研極細照昇三白頭法昇之

治瘰癧數藥方 瘡已破膿正多瘡正腫用此敷之呼膿退腫 蚯蚓糞生者地 蛇蟬虫用泥包 壁虎瓦上 貓頭骨又 雄鼠糞焙 右各等分共為細末和生麻油調敷每日清晨用藥湯洗淨敷之一日洗五六次敷五六次待膿乾即用膏藥貼之

敷瘰癧瘰癧方 生南星 生半夏錢各三 海藻 昆布錢各二 麝香 冰片錢各二 紅花 牡蠣錢各二 青鹽六 右俱生研極細末另將白芨兩許切片煎膏和煎藥做成梃子晒乾用時磨敷 又 生南星 生半夏 生大黃兩各一 大貝母 昆布 海藻 海浮石 銅綠 明礬錢各五 右用商陸根汁葱汁薑汁蜜四味調敷

又 用鉛三兩鐵器中熬久當有脚如黑灰取此灰和脂塗瘰癧上或用醋調塗以舊帛貼之數換舊帛拭去惡汁又貼如此半月許不痛不破不作瘡內消為水而愈

大紅膏 治瘰癧瘰癧不分新久未穿破者 南星二 銀硃 血竭 消石 潮腦錢各三 輕粉 乳香各錢 貓頭骨錢一 石灰兩 大黃五錢切片同石灰炒 右共為細末陳醋熬稠調藥敷核三日一換敷後綿皮核不消者另換紫雲膏貼之其核自消

痰核瘰癧膏 治未穿破者貼之即消 貓頭骨牙爪一付 大娘 蛇蟬虫錢 磁石醋煨各錢五 乳香 沒藥 去油錢一 生明礬五錢入罐內煨存性 海藻兩 大貝母兩 草麻子肉錢五 用麻油四兩同上海貝麻三味熬至滴水不散濾去渣入乳沒再熬將稠離火乘滾入貓頭蛇蟬磁石飛礬攪勻嫩冷水中出火氣乘軟取起打條臨用攤貼凡去渣後入細藥時仍用青州丹少加松香黃蠟看老嫩得宜方入貓頭等末始易成膏如已穿破再取客廁梁上塵加入

瘰癧收口藥方 龜板煨過埋地中四十九日 青葉陰乾 右同研細末收口神效

〔瘰〕

書補 卷之六 瘰癧 世為 二 子 瘰癧 已 書 同 受 甲

治三日大瘡神妙方 用活大烏龜一個連壳左右肩各攢一孔近尾處亦攢一孔以明雄黃九錢研細每

孔搽入三錢外以磁黃泥包固勿令泄氣炭火上煨存性研細每服准一錢空心陳酒送下二三服即止

又 用陳香櫞一個去頂皮大者每隻加透明雄黃三錢中者二錢小者一錢雄黃研細搽入香櫞內炭火

中煨存性再研極細每服七分用軟腐衣分作六包乾咽下此日不可吃湯任其嘔去頑痰即愈

截瘡丹 斑貓 已豆肉 硃砂各一 麝香分 雄黃半錢 蟾酥分 右用黑棗二三個搗丸如菜豆大貼

眉心穴一周時揭下投長流水中 又 只聞香氣不必煎食亦可愈瘡 常山 草果 川烏 草烏 陳皮 甘草各一 右將絹袋盛貯

貼臍截瘡凡 胡椒 雄精 右二味等分研末將飯研爛為丸如桐子大外以硃砂為衣將一丸放在臍中

外以膏藥貼上瘡即止親驗 治諸瘡代參丸 白朮土煎 生薑一斤搗出汁并 右為末將黑棗一斤煮爛去皮核為丸

治瘡方 虛寒瘡更效孕婦忌貼 桂心分 麝香厘 川椒分 雄黃分 共研極細末納臍中外以膏藥

貼 治不論雙單瘡方 用大荸薺將好燒酒自春浸至秋間如瘡至不食飲食食則脹滿不下者每日服荸薺兩

個三日即愈 〔泄瀉〕 飯鍋紀四兩 蓮肉四兩去 白糖四兩 右共和平每服三五匙一日三次食遠

服 治老幼脾瀉久不愈神方 飯鍋紀四兩 蓮肉四兩去 白糖四兩 右共和平每服三五匙一日三次食遠

正久瀉凡 治一切久瀉諸藥無效服此一服自愈 黃丹過 枯礬 黃蠟各一 石榴皮八錢 將蠟溶

化小銅杓內再以丹礬二味細末投入乘熱為丸如豆大空心服五丸紅痢清茶下白痢薑湯下

治白痢不止神效方 乾飯鍋紀一紅花紅少 臘肉骨頭壯臘 共為末砂糖調不拘時服即止

治脾泄方。陳火腿骨煨存性 紅麴 松花 右三味各等分砂糖調陳酒送下

痢

治痢初起法。不問男婦室女妊娠小兒皆能治之無有不效。白蘆薈二三觔洗淨連皮枚石臼內搗碎絞取膿汁如十歲以內小兒每日吃一飯碗大人每日吃二三飯碗俱要冷吃不必見火忌葷腥雜味并治疫痢如神

又 水晶糖四兩如赤痢用濃苦茶一杯白痢用薑汁一杯赤白痢用濃茶薑汁各半杯將水晶糖入內煨

炸服見糞即愈吃至二服無不見效親驗

治噤口痢 此係元氣虛極者 人參錢三 石蓮肉炒二錢 黃連錢一 鮮荷葉片 老黃米撮 水二鍾煎六

分入木香末三分和勻服積未淨者如山查二錢 檳榔枳殼各七分

又 米粒不下百藥不效者用五穀虫焙乾為末每服二三錢米湯下

又 不能飲食者 用烏梅肉和蜆蜆搗爛成凡含口內片時即能飲食烏梅渣不宜嚥下

又 蒼朮 甘草 陳皮 厚朴 右各等分為粗末用布包之放在肚上將熨斗盛火熨布上逼藥氣入

腹病者覺腹中爽快即將藥投枕頭下以受藥氣一日連熨三四五次痛痢漸止口中即飲食矣

治赤白痢并水瀉 車前子炒 紅麴炒 赤石脂 滑石 右各等分為末砂糖調每服三錢滾湯送下一

二服即效

治赤白痢 不論初起久痢俱可用 柿餅一個開一口入白蠟三分在內將紙包好捺住以水濕透紙放在

灰火中煨熟食之大人兩個小兒一個即愈

治赤痢 木耳灰 槐米灰 紅麴灰 砂糖調空心服

治赤痢久不愈者 初起者宜先服通利清濕熱之藥幾劑然後用此方

飯碗露一宿加白糖霜少許隔湯煨畧溫清晨空心服每日一服兩三服必愈加糖者恐其味澁也如不畏

瀉即不可加

增補

香參丸 治痢極效百發百中之藥也 木香兩四 苦參酒炒 右為末將甘草一斤熬膏凡桐子大每服三

錢白痢薑湯下紅痢甘草湯下噤口痢砂仁蓮肉湯下水瀉豬苓澤瀉湯下

治久痢如神 用刀豆煨飯上蒸熟洋糖蘸食一二日即愈

又 陳火腿骨四錢 煨存性 黃連一錢 薑汁炒 砂糖四錢 烏梅肉五 右共為末將烏梅煮爛搗丸每服三四

十丸空心黃米湯下

治久痢虛滑不禁可以實腸 裏急後重腹痛者不可服 用臭椿樹皮根切碎酒拌炒為細末用真阿膠水

化開和為丸如桐子大每服三五十丸空心米湯下

治久痢 初起者不可服 松花錢三 地榆錢二 乾荷葉錢二 臭椿樹根皮一兩取向東南者去外粗皮 右為細末白痢

紅糖調紅痢蜜調紅白相兼蜜與糖調加溫水少許每服二錢忌麪食薑腥油膩等物 又 烏梅四兩 煨存性 白滑石二錢 淘淨 臭椿樹根皮二兩取在土者剉淨皮曬乾為末 右用陳米飯搗為丸每服四五十丸

空心米湯下

治痢方 不拘赤白泄瀉痢至八九年者三四服即愈 香茹二十 藿香兩十 蘇葉半兩 木瓜兩五 檀香

仁兩 木香兩二 赤苓兩五 甘草半兩 厚朴兩五 枳殼兩五 右為末蜜丸彈子大約重二錢每服一丸白痢

淡薑湯下紅痢木香湯下其餘開水下

治久瀉久痢方 陳石榴皮酸者焙乾研細末每服三錢米飲湯下患二三年或二三月百方不效者服之即

止不可輕忽

治休息久痢 但痢而後無重痛者 用壯大豬小腸一條不落水將箸頂翻轉出腸中油膩穢濁刮下但將

刮下之物在瓦上炙焦乾存性研末用沙糖少許空心調一服條腸垢大者分作二分小者只作一服若翻

轉腸內有糞先去其糞但刮其近腸之血膩油垢又用重者吃兩三條腸垢必愈 治赤白久痢 腹中不痛者 桂圓十 粟壳十 荔枝十 建蓮十 水二碗煎八分空心服朝服可以

一日晚服可以一夜不痢親驗良方

治毒痢方 下膿血者是 金銀花一兩煎湯送香連凡三錢

〔脫肛〕

潤腸散 治痢後脫肛 鰲頭灰 五倍末 伏龍肝 生礬末 赤石脂 訶子肉 各五錢 右為極細末

葱湯洗淨 搽於腸頭上 頻頻換之 以愈為度

治脫肛方 石枯礬煎 五倍子 白礬 右為末 水一碗煎湯洗之 立效 若婦人產後脫肛 五倍子末

搽之

縮肛散 鰲頭一個 枯礬分三 五倍子分三 共研極細搽之 又 用爬牆草煎湯溫洗 肛隨浸隨

縮上 此草上生根 一路沿牆而上者 但有二種 一種葉大似絲瓜葉者 不可用 須葉小如茶匙樣光亮者

〔痔漏〕

縮痔秘方 內痔落下 用大團魚頭一個 火煨為末 搽痔上 即刻收進 親驗

治外痔疼痛 坐臥不得者 大田螺八九個 將針挑開 腐蓋入水片白礬末少許 在內以螺尖埋土中 令其蓋

仰上 經一宿去螺水 以雞毛搭痔上 六七次即消愈

黃洗痔方 五倍子 皮硝 水二碗煎濃 先薰 先後洗一二次即愈 絕妙

治痔漏丹方 名長明酒 用積年舊琉璃燈洗淨 油膩火煨研細 以紅酒服四錢 不過七日 其管自去

點痔方 銀硃 大雄黑背 蛇蛻 共搗爛 用鹽泥封固 作團要留一孔 火昇烟盡為度 取出用田螺水

調搽 即縮上 不用銀硃 將上好黃丹拌之 亦效 又 蛇蛻一條 水片 胆礬 和化蛇蛻水調之

止痔下血方 蛇蛻 煨通紅 去泥用 礬砂 硃砂 雄黃 水片 共為極細末 入龍骨少許 更妙 大便時

乘其脫出 以細草紙盛藥少許 託之 使入大效

治痔漏方 新象牙屑 二觔 為末 每早用熟雞子三個 將牙末和吃 或入稀粥內 吃亦可 服盡一料自愈

又 露蜂房 鹽填滿 煨存性 蟬蛻 木香 各三 象牙末 猪胰油 猪鬃蹄 蜜 各

白頸蛇 瓦焙乾 淨末 一錢 右共為細末 用黃占半觔 溶化 將藥酒漸入 搗勻 為丸 如棗核大 每服一丸

空心好酒送下。連服三丸。瘡口自消。隔一日。第五日再服二丸。第七日再服一丸。痔管自退出矣。將玉簪花根三段。三日搗爛。搽上自愈。

又 名經蟾丸 蟾蜍十數條。將黃泥做成小管。如筆管大。入蟾蜍在內。上以磁黃泥塗護之。以蟾酥一

熊胆分 麝香五分 冰片三分 看漏淺深。用飯粒為條。插入盡頭。欠者五六條。近者二三條。其管為膿水。

用洗藥 洗方 烏桕樹根皮 枸杞根皮 槐花 五味子 水楊樹桿頭 瓦花 黃柏 荔枝草

右煎湯一大碗。先薰後洗。再以十寶丹收口。十寶丹方 龍骨分 桑皮分 琥珀分 血竭分

黃丹分 冰片分 珍珠分 牛黃分 乳香 沒藥 各錢 共為細末。收貼聽用。

痔漏退管方 象牙末兩 人腳脂甲錢五 牛骨髓兩 豬脚格兩 刺蝟皮錢五 右為末。再將

地榆槐角二味 入猪臟內。煮熟搗爛。共搗蜜丸。每服三錢。空心滾湯送下。其管自出。半月即愈。

又 白鴿糞一升。放罐內。以滾水沖入罐中。乘熱病人坐於罐口上。薰之。其管自落。數日即收口。要坐久。忍痛。

又 用猪臟頭。水煮爛。或鹽或醬油蘸吃。每日吃一個。吃至一二百個。必愈。若脾胃畏油膩者。只吃近肚門

處。管一段亦可。再每日切荸薺一片。吃數片。二物常兼吃。更妙。

又 金餘指人手指 銀餘分兩 均在黃沙內炒脫不拘 真血餘兩 血珀錢五 黃牛角腮四兩 羊角腮四兩

新象牙屑兩 猪懸蹄壳四兩 雙爪尖兩 一 蜣螂虫瓦上煨四 刺猬皮黃沙內炒去毛 陳松蘿

茶葉兩 穿山甲先用醋炒四兩 槐角子兩 炒四 青黛用五錢 地榆兩 以上十六味。如法煨煉。為

細末。用黃犬大腸煮爛。加煉老白蜜。為丸。如無犬腸。以猪臟代之。亦可。空心淡鹽湯送下。三錢。壯盛者加。或

至五錢。虛人桂圓湯下。

痔漏插藥方 百草霜 黃連錢半 冰片分五 麝香分二 蜣螂虫 旱連草頭五錢 蟬蛻十五條 瓦 共

為細末。凡如粟米大。入管口。自退藥。二日後待管自化出。用長肉收功。末藥。

收功末藥方 輕粉 乳香 麝香 韶粉 東丹 血竭 共為末。搽之。

又 雄大蜣螂。不拘多少。陰乾。生研。加冰片少許。將棉紙攤作條。用白芨水蘸濕。晒乾。待硬。再蘸濕。染。

入鍋內炒至透粒現開并至集黑色存性

真柿霜即柿餅上白霜也但假者甚多入口甘而涼者為真不可經火係諸藥研末後方和入

右逐味炒焦要如墨色又各

要存性共研為細末和入柿霜拌勻每日空心服藥末四錢白滾湯一飯碗沖和將筋調末即半浮半沉連

湯飲下若下血太甚臨晚再服三錢俟壺色變黑血漸止矣忌食胡椒燒酒辛辣之物有此病者終身宜戒

此方修合之法不過極細黑四字則藥末淡洽於臟腑所以要黑者血過黑而止以水尅火五行之理也

治腸風 臭椿樹根皮四兩扎為一大把

大茴香粒一大 木耳兩四

以雄猪肚子一個將藥俱裝入肚內紮好煮爛

去椿皮但吃木耳肚子連湯吃完重者兩料必愈

治腸風久不愈者 臭椿樹根皮 烏梅 共煎陳酒沖服即愈

治腸風 青州柿餅一個內放白蠟六錢飯鍋上蒸熟食數次愈

治大便秘下膿血 即日夜數次數年久病皆愈 雄猪大臟一條洗淨桂圓肉二兩新鮮白扁豆花四兩將二

味同打爛用白糯米拌和裝入臟內兩頭捺住砂鍋內燒爛忌見鐵器然後將人中白炙脆研末蘸吃或醬

油蘸吃亦可不論吃粥吃飯空口皆可吃四五條即愈

治大便秘下血 葶薺搗汁半鍾將好酒半鍾沖入空心溫服三日即愈

治大便秘下血用涼藥不效者 用歸脾湯加槐花黃芩治之自愈

治大便秘下血虛弱者 早蓮草陰乾為末以棉花煎湯調炒米粉糊丸桐子大每日服五錢以人參五分煎湯

下二服即愈

〔溺血〕

治溺血者 溺血者不痛而小便出血也痛者為血淋用頭鬚燒灰研末每服三錢空心滾酒調下或用百草

霜酒調下或用伏龍肝白滾湯調下夏月水調痛者車前草絞取濃汁碗許入糖霜一二匙燉溫服之此可

多服自愈初痛時用酒汁亦好或將亂髮反糊丸桐子大每服十丸空心開水下

治男子莖中痛及婦人血結腹痛 取牛膝一大握酒煮飲之立愈

治小便下血用清利不效者 用補中益氣湯加車前子治之自愈

〔疝氣〕

雄豬大腰子一對。不落水去膜。併血切作片。以大茴香小茴香各一兩。俱炒為粗末。同腰

子拌勻。復以猪尿胞一個入拌者內。緊固用無灰好酒二碗。砂鍋內懸尿胞於其間。煮至酒存半碗。收出。

一併切碎焙乾研細存酒打糊丸如桐子大每服空心陳酒送下七十丸一方用生白酒三碗煮

治痢并小腸氣 木通 川棘各一錢 大茴五 飛鹽三分半 右為末水酒調服頭服出汗服七日全愈如

少年者加一倍。俱空心酒下。

治疝氣方
荔枝核六兩 橘核一打碎炒
小茴兩 川楝子一兩酒蒸
薤巴一兩酒拌炒
吳茱萸一兩鹽水炒
澤瀉一兩

甘草錢五
青皮兩
山甲土炒二兩
右為末每服一錢升麻一分半黃酒調下

治濕痲陰丸作痛。
斷艾
紫蘇葉二兩
川椒炒熱各三兩
右三味拌勻乘熱絹袋盛夾囊下勿泄氣。

治陰囊腎子腫大方。灶心土三升。砂鍋內炒熟。加川椒小茴香末各一兩。拌勻。將陰囊坐在上面。冷則再換。

如此三次即愈。

治陰子腫大不消。頂大荔枝核十二三個。煨灰存性。以火酒調。如糊吃下。即消。若重者再吃一服。

治疝氣偏墜。用肥薑切片鋪湊板上。上堆蘄艾一失。點火燒之。候將完。即乘熱帶火連薑并艾搗極爛。將鮮

菜葉一大片。放手掌內。即以薑艾攤勻。菜葉上。用手向腎囊底下托之。初時其冷如水。須臾滾熱。通身出汗。

而愈

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍者。良薑 厚朴薑汁炒 靈脂 右各等分為末。每服一錢。醋湯下即止。

治心痛方。實胃口痛也。若真心痛不治。高良薑酒洗火次焙研香附子醋炒火次焙研右二味各記另收之病因寒

得者薑末二錢香附末一錢病因怒起者香附末二錢良薑一錢寒熱兼有者各用一錢五分臨時以米湯

加入生薑汁一匙。食鹽一捻。或二服。或三服。痛止後。用鑊刀挑鹽一撮。火上燒紅。泡湯服。并服大棗數枚。約

數朝速效

治心痛方。婦人服之甚效。丹參兩。檀香錢一。砂仁錢一。共煎八分服之即愈。

治心口胃脘痛。用大黑棗去核。每個中間入胡椒七粒。仍將棗包好。炭火上煨焦黑。存性研末。每服三四分。

陳酒送下。三四服必愈。加木香枳殼紅花當歸五靈脂少許更妙。

治胃口痛方。手指甲男痛用女右。女痛用男左。剪下放新瓦上炙脫存性為末。約四五分入砂糖少許。或湯

或酒調之食遠服。

治胃寒常發惡心嘔吐或痛。用老生薑半觔。去皮搗爛。絞汁去渣隔湯煮一二十沸。停火將上白洋糖半觔。

攪入內煎一滾收之。時時吃二匙。作三四日吃完。重者服之兩料必愈。

治胃寒嘔吐。兼治寒瘧。大黑棗七個。去核。每個內入丁香一。一隻煮爛去丁香。將棗連湯空心服。服見效。

治嘔吐不止。陳梅醬煎成湯。如有火加竹茹。有寒加豆蔻。或砂仁。或煨薑。如無梅醬。以烏梅代之。

治嘔吐方。見食即嘔。或食罷即嘔。初起者易治。此痰在胃口也。生薑二兩打碎。陳皮五六錢。切碎泡湯一

碗。慢慢逐口吃下。自安。甚者竹瀝薑汁和勻。逐匙挑在舌上。咽下。若咽急并藥吐出矣。

治感氣或飲食傷脾作痛方。橘皮一把。煎濃汁一碗。打入鹽薑少許。吃下神效。

補脾養胃方。名陽春白雪糕。茯苓。山藥。炒。芡實。蓮肉。去心。各。糯米。黃米。各半升。白糖兩。

先將藥米粉蒸熟。再入白糖。印作餅子。晒乾。每日空心吃幾個。極有益。

治老人脾泄最宜。名玉露霜。白朮。炒。二兩。陳皮。半兩。蓮肉。去心。四兩。苡仁。炒。四兩。糯米。萊豆。陳米。鍋

煉。各一升。共為末。收貯。臨用時。糖霜量加。將滾水調服。二三兩。

治腫飲。燈草。碗。一把。先將水四。蘿蔔子。微炒。兩。砂仁。微炒。錢。將二味研末。傾入燈草湯內。畧滾即盛入茶壺

內。慢慢吃下。吃盡不見效。如前再煎一服。俟腹响放屁。小便長而腫即退。

〔呃逆〕

治呃逆欲死。半夏。生薑。半錢。水煎服即愈。

治病後呃逆不止 刀豆子燒存性滾水調服二錢即止神效
治呃逆不止方 用荔枝七個連皮燒灰存性為末白湯調服立止

救逆

治救逆方 明雄黃一錢酒一杯煎七分急令患人嗅其熱氣即止

又 好硫黃乳香各等分以酒煎急令患人嗅之 又硫黃乳香 艾錢各三

治食物醋心 用胡桃嚼爛生薑下立止

耳

治耳暴聾方 菊花 木通 石菖蒲 搗爛酒服之

治耳聾方 真北細辛研末溶黃蠟為丸如鼠糞大以綿裹塞耳中二三次即愈

又方 老鼠胆汁滴入耳中二三次即愈

治耳內出膿方 胭脂 枯礬 釘鏽粉 右各等分為末吹之立效

又方 羊屎彈燒反 一錢 枯礬 輕粉各五 右為末用棉花捲淨耳內膿將葦管吹入立效

治耳中膿血不止方 龍骨 枯礬 乾胭脂要產山東濟寧府如銀硃樣紫色者非綿胭脂亦非油胭脂 海螵蛸各等 麝香少許

右為末先以棉紙擦乾輕吹耳內

治耳中腫痛并出膿血方 黃魚牙齒瓦上炙存性為末放土上退火氣研末加水片少許菜油調雞毛蘸

入耳中如乾胭脂更妙

又方 用橄欖核燒灰存性每核一枚入水片二厘研極細末吹入耳中即愈

治耳中常出血方 五色龍骨煨 研細末吹入耳中即止

治出鼻膿方 龍骨煨 五倍子炒 乳香 枯礬 血餘灰 右各等分為末捲淨吹之

治耳中膿水不乾 石榴花辦不拘多少炙脆研末加些水片再研吹耳自愈

治百蟲入耳方 如蟲入耳不可驚動在左耳以手緊閉右耳及兩鼻孔氣至左耳虫自出右耳亦然

目

烏羊肝丸 大能烏鬚髮聰耳明目

胆汁多為妙晒時 以紗罩罩晒極乾 炒 早蓮草 蒸酒拌

當歸酒浸 白茯苓 乳

血餘 生地 川芎 熟地 蒸極熟 何首烏 蒸 覆盆子 炒 山茱萸 核

兩酒煮一晝夜取濃汁一碗拌藥內煉蜜為丸桐子大每服百凡空心酒下臨卧亦服一次

治虛眼方 凡虛人目無病到點燈時候即不見物或羞明只用羊肝煮食便效不必服他藥

治雀目方 目落不見物也 石決明 夜明砂 錢 猪肝 白羊肝 各一 將肝二片中間盛藥麻線索

定淘米泔水一碗砂罐煮熟臨卧服

又方 用羯羊肝一具不見水不犯鐵器以竹刀切開入谷精草細末瓦罐內煮熟不時服之屢驗 墨者佳

治風火眼洗方 歸尾 胆礬 銅青 各一 防風 荆芥 赤芍 川連 各二 杏仁 皮十四粒去 石蠟 包煎洗

治弦爛風赤眼洗方 大蛤 黃連 去淨 防風 荆芥 穗 各五 苦參 錢四 銅綠 分五 右為細末以薄膏煎

湯凡彈子大臨用以熱水化開乘熱洗眼每日三次神效一方有川芎當歸各四錢

治爛眼皮方 用挂金燈淨壳每壳一个摻入研細透明綠色胆礬末二厘或用壳十个或二十个裝套好外

用淨磁黃泥包裏好勿令泄氣炭火煨至中間壳將成黑灰存性故地上用碗蓋熄火將中間反研細包好

放土地上一夜出火毒每用灰少許放茶杯內以冷松蘿茶浸之用薄棉紙蓋在茶面上俟茶滲出紙面上

將此水洗眼皮每日五六次二三日即愈

治火眼熱障眼痛不可忍者 用黃連為末人乳拌勻似糊樣攤碗底上用艾如雞子大一塊放地上點着以

黃連碗覆上令艾薰透取起以清水一小杯調濃上覆棉紙一張隔紙透出黃藥汁以簪頻頻點洗即愈

治眼中努肉方 用蛇退一條將麻油三錢炒黃色不可焦黑菜豆三合炒砂糖一碗水一碗共煎七分食速

服立退二三年者可治兩服即愈