

外科正宗目錄

卷一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陽半陰症歌第五

癰疽五善歌第六

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法并禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆十一

病有三因受病主治不同論十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷二

瘡瘍看法十五

腫瘍治法十六

腫瘍主治方十七

潰瘍治法十八

潰瘍主治方十九

卷三

癰疽圖形二十

癰疽諸名歌二十一

腦疽二十一

卷四

發背二十三

疔瘡二十四

脫疽二十五

卷五

凍瘡二十六

贅疽二十七

卷六

咽喉二十八

時毒二十九

癰瘤三十

肺癰三十一

卷七

流注三十二

乳癰三十三

附骨疽三十四

卷八

腸癰三十五

臍毒三十六

痔瘡三十七

下疳三十八

魚口便毒三十九

卷九

囊癰四十

懸癰四十一

臀癰四十二

楊梅瘡四十三

結毒四十四

多骨疽四十五

陰瘡四十六

卷十

傷寒發頤四十七

痼發四十八

療疽四十九

小腹癰五十

鵠口疽五十一

龍泉疽虎鬚毒五十二

石榴疽五十三

穿踝疽五十四

大麻風五十五

翻花瘡五十六

腋癰五十七

脅癰五十八

鼻痔五十九

骨槽風六十

紫白癰風六十一

齒病六十二

腦漏六十三

破傷風六十四

跌撲六十五

金瘡六十六

杖瘡六十七

竹木刺六十八

湯潑火燒六十九

甲疽七十

繭脣七十一

痞癰七十二

天蛇毒七十三

頭痛七十四

合谷毒七十五

鼻出血七十六

牙縫出血七十七

血箭血瘰七十八

卷十一

鵝掌風七十九

腎囊風八十

疥瘡八十一

癩瘡八十二

血風瘡八十三

頑癬八十四

膿窠瘡八十五

火丹八十六

天泡八十七

肺風粉刺酒戲鼻八十八

雀斑八十九

汗斑九十

油風九十一

白屑風九十二

耳病九十三

漆瘡九十四

瘰癧瘡九十五

疥癩九十六

痰包九十七

癩風九十八

溼腫九十九

女人面生鰐黑斑一百

鈕釦風一百一

枯筋箭一百二

婦人腳丫作癢一百三

手足破裂一百四

眼丹一百五

眼胞菌毒一百六

黑子一百七

體氣一百八

白禿瘡一百九

奶癰一百十

蟾拱頭一百十一

小兒遺毒爛斑一百十二

螻蛄串一百十三

小兒痘風瘡一百十四

小兒赤遊丹一百十五

走馬疳一百十六

重舌一百十七

胎瘤一百十八

鵝口瘡一百十九

痘癰一百二十

痘疔一百二十一

黃水瘡一百二十二

卷十二

大人口破一百二十三

唇風一百二十四

臭田螺一百二十五

牛程躑一百二十六

蜣螂蛙一百二十七

田螺泡一百二十八

皴痛一百二十九

凍風一百三十

陰蝨一百三十一

蒲桃疫一百三十二

咬傷一百三十三

風犬傷一百三十四

惡蟲叮咬一百三十五

百蟲入耳一百三十六

誤吞針鐵骨哽咽喉一百三十七

人面瘡一百三十八

陰毒一百三十九

失榮症一百四十

中砒毒一百四十一

落下頷拏法一百四十二

救自刎斷喉法一百四十三

試知百病死生法一百四十四

造孽報病說一百四十五

仙方活命飲今古不同論一百四十六

拾遺症一百四十七
綳縛背瘡法一百四十八

癰疽內肉不合法一百四十九

煉元明粉法一百五十
煉金頂砒法一百五十一

煉硝石法一百五十二
取蟾酥法一百五十三

製附子法一百五十四
昇白靈藥法一百五十五

製寒食麪法一百五十六

製披針喉針法一百五十七

諸藥製法一百五十八 逐日人神歌一百五十九

十二時人神歌一百六十

十干日針忌歌一百六十一

屍神歌圖一百六十二 醫家五戒一百六十三

醫家十要一百六十四

外科正宗卷七

海甯許

賴幸木訂

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光燾寅昉校

流注論第三十二

夫流者行也。乃氣血之壯。自無停息之機。注者住也。因

氣血之衰。是有凝滯之患。

梟案流注者其毒流走而竄注也此解似非

其

形漫腫無頭。皮色不變。毋論穴道。隨處可生。凡得此者。多生於體虛之人。勤勞之輩。不慎調燮。夏秋露卧。

縱意取涼。熱體當風。圖身快爽。或中風邪。發散未盡。或慾後陰虛。外寒所侵。又或惱怒傷肝。鬱結傷脾。榮氣不從。逆於肉裏。又或跌打損傷。瘀血凝滯。或產後惡露未盡。流宿經絡。皆成斯疾。旣成之後。當分表裏寒熱虛實。邪正新久而治之。初因風寒所中。表症發散未盡者。人參敗毒散散之。房慾之後。體虛寒氣外侵者。五積散加附子溫之。附子徐勒勞傷鬱怒。思慮傷脾而成者。歸脾湯加香附青皮散之。跌撲傷損。瘀血凝滯而成者。復元活血湯逐之。產後惡露未盡。流注經

絡而成者。木香流氣飲導之。此皆初起將成治法。一服至三四服皆可。外俱用琥珀膏敷貼。其中亦有可消者。十中五六。如服前藥不得內消者。法當大養氣血。徐曰。九當消痰。培助脾胃。溫暖經絡。通行關節。木香流氣飲。十全大補湯。俱加熟附子香附。熟附子徐勒。培助根本。如此。則未成者自消。已成者自潰。已潰者自斂。而終無殘敗破漏不斂之症。如有膿。宜急開之。患者又當慎起居。戒七情。遠寒就溫。庶可保全。若誤用寒涼。剋伐內消等藥。終至不救者多矣。

徐曰。流注有虛痰實痰兩種。

又曰。流注一證。由風寒入膜所致。膜在皮中。旁通四達。初無定處。所以隨處作患。此眞脈絡之病。故古人製大活絡丹以治之。其餘煎丸皆非正治。蘇州一小兒甫九歲。患流注。肩背腰脅十餘處。百端醫治無效。余曰。此惟大活絡丹能愈。服至三十餘丸。未破者消。已破者收口。更服補氣血之藥而愈。

此條從洄溪
醫案采八

流注看法