

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷九

訂正仲景全書傷寒論註合病併病篇目錄

葛根湯

葛根加半夏湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

御纂醫宗金鑑卷九

訂正仲景全書傷寒論註

辨合病併病脈證并治篇

傷寒有六經之證有六經之脈證脈井然不雜則可直指爲某經之病若兩經三經陰陽混淆不可以一經名者或一經未罷又傳一經二經三經同病不歸併一經者則名曰合病或二經三經同病其後歸併一經自病者則名曰併病論中所著合病併病雖單舉陽

經未及陰經然陽經既有合病併病則陰經亦必有之可知矣如太陽病脈反沉少陰病反發熱是少陰太陽合病也陽明病脈遲太陰病大實痛是太陰陽明合病也少陽病脈細而厥厥陰病嘔而發熱是厥陰少陽合病也是雖無合病之名而確有合病之實且三陽皆有發熱證三陰皆有下利證如發熱而下利是陰陽合病也陰陽合病若陽盛者屬陽經則下利爲實熱卽論中所謂太陽陽明

陽明少陽太陽少陽合病者是也陰盛者屬  
陰經則下利爲虛寒卽論中所謂少陰下利  
反發熱不死少陰下利清穀裏寒外熱不惡  
寒而面赤者是也蓋陽與陽合不合於陰爲  
三陽合病則不下利而自汗出乃白虎湯證  
也陰與陰合不合於陽爲三陰合病則不發  
熱而吐利厥逆乃四逆湯證也誠以人之藏  
府互根陰陽相合三陽旣有合併之病則三  
陰亦有合併之病不待言矣

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之太陽  
與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之  
註一經未罷又傳一經二經三經同病而不歸

併一經者謂之合病太陽與陽明合病者謂  
太陽之發熱惡寒無汗與陽明之煩熱不得  
眠等證同時均病表裏之氣升降失常故不  
下利則上嘔也治法祇須先解太陽之表表  
解而陽明之裏自和矣若利則宜葛根湯表  
而升之利自可止嘔則加半夏表而降之嘔

自可除也

註集

成無已曰邪氣外盛陽不主裏則裏氣不和  
裏氣下而不上者但利而不嘔裏氣止逆而  
不下者但嘔而不利故以葛根湯以散表邪  
加半夏以下逆氣也

葛根湯方

葛根

四兩

麻黃

三兩

去節

桂枝

二兩

芍藥

二兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

枚  
擘  
十二

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升溫服一升覆取微似汗不須歇粥餘如桂枝法將息及禁忌

葛根加半夏湯方

於葛根湯內加半夏半升餘依葛根湯法

方解是方卽桂枝湯加麻黃葛根也麻黃佐桂枝

發太陽榮衛之汗葛根君桂枝解陽明肌表之邪不曰桂枝湯加麻黃葛根而以葛根命

名者其意重在陽明以嘔利多屬陽明也二  
陽表急非溫服覆而取汗其表未易解也或  
嘔或利裏已失和雖歎粥而胃亦不能輸精  
於皮毛故不須歎粥也

集解柯琴曰李杲定爲陽明經藥潔古云未入陽  
明者不可便服豈二子未讀仲景書耶要之  
葛根桂枝俱是解肌和裏之劑故有汗無汗  
下利不下利俱可用與麻黃之專於發表者  
不同也

汪琥曰外臺方議問曰經云下利不可發汗  
發汗則脹滿今此下利又發汗者何也答曰  
少陰病下利清穀者爲裏虛若更發汗則脾  
虛而脹今太陽病未罷或有頭痛惡風寒等  
證尚在於表其脈尚帶浮便傳入陽明而有  
口渴身熱等證又自下利必須此方發散太  
陽之表以中有葛根能除陽明之邪也故諸  
證但發熱兼有裏而脈浮者此方最善

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯

註

太陽陽明合病不利不嘔者是裏氣實不受邪也若喘而胸滿是表邪盛氣壅於胸肺間也邪在高分之表非結胸也故不可下以麻黃湯發表通肺喘滿自愈矣

集註

喻昌曰兩經合病當用兩經之藥何得專用麻黃湯耶蓋太陽陽明兩邪相合邪攻其胃不嘔則利故用葛根湯今邪攻其肺所以喘而胸滿麻黃杏仁者肺氣喘逆之專藥也

魏荔彤曰二經合病獨見證於胸肺之間喘

而作滿此正二經之表邪爲患不可誤認胸  
膈屬裏妄施攻下如大小陷胸之類也

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃  
芩加半夏生薑湯主之

註

太陽與少陽合病謂太陽發熱惡寒與少陽  
寒熱往來等證並見也若表邪盛肢節煩疼  
則宜與柴胡桂枝湯兩解其表矣今裏熱盛  
而自下利則當與黃芩湯清之以和其裏也  
若嘔者更加半夏生薑是清和之中兼降法

也

謀程知曰言太陽少陽合病下利宜用和法也  
曰太陽則尙有表證也然已見下利則入裏  
之熱已明故不解外而清內成無已云太陽  
陽明合病下利爲在表當與葛根湯陽明少  
陽合病下利爲在裏可與承氣湯此太陽少  
陽合病下利爲在半表半裏非汗下所宜故  
與黃芩芍藥以和解之嘔者邪上逆也故加  
半夏生薑以散逆氣

汪琥曰太少合病而至下利則在表之寒邪悉入而爲裏熱矣裏熱不實故與黃芩湯以清裏熱使裏熱清而在表之邪自和矣所以此條病不但太陽桂枝在所當禁并少陽柴胡亦不須用也

黃芩湯方

黃芩

三兩

甘草

炙二兩

芍藥

二兩

大棗

十枚擘

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升

日再服夜一服

黃芩加半夏生薑湯方

於黃芩湯方內加半夏半升生薑三兩餘依黃  
芩湯法

飭裏熱不和故自下利用黃芩清熱甘草和中  
得芍藥大棗其功倍焉熱清裏和而利可止  
集柯琴云因熱不在半表故不用柴胡熱已入  
半裏故主黃芩加芍藥也非微弱胃虛不須  
人參若兼嘔者仍加半夏生薑可也

陽明少陽合病必下利其脈不負者爲順也負者失也互相尅賊名爲負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

註

陽明屬土少陽屬木二經偏裏故合病必下

利也陽明脈大少陽脈弦脈得大弦是爲本

脈宜黃芩湯清熱和土兼瀉木邪利自止矣

若脈單大不弦則爲土不受邪其病易愈名

爲順也單弦不大則爲木來尅土其病難治

名爲負也今脈不大弦而滑數則知非本土

爲害乃宿食爲病之熱利也故不用黃芩湯  
而以大承氣湯下之也太陽陽明合病下利  
表證居多故以葛根湯發之陽明少陽合病  
下利裏證居多故以大承氣湯攻之太陽少  
陽合病下利半表半裏居多故以黃芩湯和  
之若非合病則桂枝湯麻黃湯分主太陽之  
表五苓散抵當湯分主太陽之裏葛根湯主  
陽明之表三承氣湯主陽明之裏小柴胡湯  
主少陽之表大柴胡湯主少陽之裏是各有