



凡產後若因風寒外感邪氣入肺而喘急者必氣壅胸膈或多咳嗽自與氣短似喘上下不接者不同治當疎散兼補爲主宜金水六君煎或六君子湯若單以寒邪入肺氣實氣壅而本無虛者宜六安煎或二陳湯加蘇葉之類主之又有瘀血入肺必面黑發喘與氣短似喘大不相同用二味參蘇飲治之或有氣虛血痰泛上者用六君子調服失笑散亦效。

金水六君煎

治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰虛

血氣不足外受風寒咳嗽嘔惡多痰喘急等證

當歸

半夏製

茯苓 各二錢

熟地 三五錢

陳皮 一錢五分

炙草 一錢

水二鍾。生薑三五片。煎八分。食遠溫服。○如大便不實。

而多濕者。去當歸。加山藥。○如痰甚。氣滯。胸脇不快者。

加白芥子 七八分。○如陰寒甚。而嗽不愈者。加細辛 五

七分。○如兼表邪寒熱者。加柴胡 一二錢。

六安煎 治風寒咳嗽。及非風初感。痰滯氣逆等證。

陳皮 一錢五分

半夏 二三錢製

茯苓 二錢

杏仁 去皮尖碎

甘草 各一錢

白芥子 五七分凡老年氣弱及產後者不用

水一鍾半。加生薑三五片煎七分食遠服。○若無虛癢倒及氣逆無痰者不可用此劑。

六君子湯 見上卷諸痛門

二陳湯 見上卷子煩門

二味參蘇飲 見本卷三衝證門

失笑散 見中卷胞衣不下門

惡露不下論

凡產後臟腑勞傷。氣血虛損。或胞絡挾於宿冷。或當風取涼。風冷乘虛而搏於血。壅滯不宜積蓄在內。故不下也。宜溫煖活血。則血自行。此必小腹脹滿。刺痛無時。宜用血證黑神散。予每治此證。用生化湯倍莖仁。調失笑散。生新行瘀。頻以黑沙糖衝滾湯少滴。無灰酒服之。如素不飲。或恐發暈。卽不加酒亦可。每每獲效。又或因脾胃素弱。中氣本虛。敗血亦少。氣乏血阻。不能盡下。其證乍痛乍止。痛亦不甚。不可用大黃等藥攻之。反增別病。加減八珍湯主之。或生化湯多服數貼。亦效。薛氏止用失笑散治之。尊生錦囊。

均用四味散治效。○一產婦患前證服峻厲之劑惡露隨下久而昏憤以手護其腹此脾氣復傷作痛故用手護也。以人參理中湯加肉桂二劑補之而愈。

加減八珍湯

人參 八分或一錢

白朮 土炒

茯苓 各一錢

歸身 二錢

川芎

赤芍 各八分

熟地 一錢五分

延胡索 炒

製香附 各七八分

炙草 五分

薑棗引水煎食前服。

四味散 治瘀血不下及療纔分娩一切諸疾。

當歸

延胡

血竭

沒藥 各五分

爲末用熱童便半鍾調服。

血證黑神散 見上卷譫語門

生化湯 見本卷生化湯論後

失笑散 見中卷胞衣不下門

脫汗亡陽及諸汗論

產婦分娩既已亡血而又多汗極危證也。蓋汗者心之液，榮於內，爲血發於外，爲汗。血液屬陰，陰亡陽亦隨之而走，故曰脫汗亡陽。其用藥與他證不同，但血塊作痛，著朮又未可遽加。如倦甚，澀澀汗出，形色又脫，速灌加參生化湯，倍參以救危急。母拘塊痛，俟汗止再去參服之。經曰：陽氣者，精則養神，柔則養筋。多汗不止，必發柔痙，氣血俱虛。當用十全大補湯，不應加附子。予謂無塊痛者當用之。此證若服參著重劑而汗多不止，及頭汗出，不至腰足難治。自汗不止，皆由勞傷心神，不能鎮守其液，治當健脾胃，散

水穀之精以歸肺益其榮衛而虛血歸源灌溉四傍不使妄行於外而爲汗也亦用加參生化湯或麻黃根湯并間用黃耆五味煎湯送六味丸醫通云因外感多汗者黃耆建中湯治之

盜汗者睡中汗出醒來卽止猶盜賊之瞰人睡而盜之謂之盜汗非自汗可比此因亡血陰虛陽氣偏盛內經云陽加於陰則發汗治當兼用血分藥品雜病雖有當歸六黃湯然寒而膩膈又不可治產後之盜汗也宜止汗散主之頭汗者或因濕熱或因瘀血當審虛實治之

半身汗出。昔人用二陳合四物治多不效。以血藥助陰。閉滯經絡也。此屬氣血不克而有寒痰留滯。非大補氣血兼行經豁痰不效。宜十全大補人參養榮加星半川烏。若肥人多加豁痰行氣藥。如瘦人乃氣血本枯。天之徵也。

麻黃根湯 治產後虛極自汗不止。

人參 一錢或二錢。

當歸 二錢。

黃耆 一錢五分蜜炙。

麻黃根

牡蠣 煨。

麥冬 去心。

浮麥 各一錢。

桂枝 五分。

炙草 四分

水煎服。○如無塊痛。加土炒白朮一錢。熟地三錢。○手

足冷。加熟附子一片。炮薑四分。○渴。加去心麥冬一錢。

五味子十粒。○惡風寒。加防風五分。○肥人。加竹瀝一

小盞。生薑汁半茶匙。以清痰火。并。間服六味丸七八十

丸。用炙黃耆、五味子煎湯送下。

黃耆建中湯 附小建中湯。○內補建中湯。

桂枝三錢。白芍六錢炒。

炙草二錢。黃耆一錢五分。蜜炙。

膠飴 一合

大棗 四枚擘

右開乃古方分兩。後人多有減用者。桂枝 一錢。白芍 二

錢。炙甘草 七分。膠飴 三錢。薑 三片。棗 二枚。○千金多人參

二錢。○桂枝湯者和營表藥也。倍芍藥。加膠飴。便能建

立中氣。故名小建中湯。以芍藥之酸。歛護營血。膠飴之

甘。培養中土。能治風木乘脾。寒熱腹痛。再更加炙黃耆。

卽黃耆建中湯。治虛勞感寒。發熱自汗。以黃耆實衛氣。

使營衛藏府俱和。而受益多矣。○千金於小建中方加

入當歸。名曰內補建中其調和中外之力可知。

止汗散 治產後盜汗。

人參 二錢。

麻黃根 一錢五分。

當歸 酒洗。

熟地 各三錢。如有塊痛不

黃連 五分炒。

浮麥 一錢。

水煎服。一方用牡蠣末 五錢。炒小麥麩 八兩。二味兼

服三五錢。猪肉汁調服。

人參養榮湯 治心脾虛寒。榮血不足。寢汗發熱。

人參

黃耆 蜜酒炙。

炙草

白朮

土炒

茯苓

陳皮

熟地

當歸

酒拌各一錢

芍藥

一錢五分炒

肉桂

八分

遠志

五分甘草水製去骨

五味子

七分炒搥碎

薑三片。棗二枚。水煎服。

一陳合四物名八物湯因不用故不錄方

加參生化湯

見本卷暈厥門

六味丸

見上卷諸痛門附六味地黃湯下

十全大補湯

見上卷胎不長養門

## 傷食論

產後形體勞倦。脾胃俱傷。是以新產之後。去膏粱。遠厚味。食粥茹蔬。以爲調攝。不知者。惟慮產後之虛。以厚味爲有補。更有本不思食。而強與之胃。雖少納。脾難轉運。易至食停。痞塞甚。而傷食發熱。切勿誤認爲陰虛。更有食滯腹痛。又勿錯疑爲血凝。治斯證者。體認正實。如發熱而飲食調者。方可補血。若惡食。噯酸者。食滯之徵。卽當扶元爲主。補氣養血。健脾助胃。審傷何物。佐以何藥。消導則脾氣復。而轉輸易。滯物行。而胃思穀矣。如此補消兼治。無有不安。故

善治者治法有先後緩急論證因塊痛有無產後有日數  
新久能重產虛之本而兼去停積之標攻補如法無不應  
手而愈故有生化消食湯健脾消食湯之分別施治如誤  
服峻藥過於消導致不思穀惟活命丹可救予每見治產  
者但知速消食物反損正氣益加滿悶一劑不效又加峻  
藥一醫無功又更一醫先後互異輕證反重以致命絕病  
家自歸命數醫家以爲盡技豈不惜哉

生化消食湯 治產後塊痛未止停食痞塞

川芎二錢

當歸五錢酒洗

乾薑炙黑

炙草各四分

桃仁十粒去皮尖

神麴炒

麥芽炒各六分

水煎服。○傷肉食。加山楂五分。砂仁五分。○傷寒物。加

吳茱萸一錢。肉桂五分。○虛人。加人參一錢或二錢。

健脾消食湯  
治產後塊痛已除。停食痞塞。

人參二錢  
當歸三錢酒洗

川芎  
神麴炒各一錢

白朮一錢五分土炒  
山楂