

尤

注

金

匱

二

金匱心典卷上目錄

臟腑經絡先後病脉證第一

瘧濕喝病脉證治第二

百合狐惑陰陽毒病證治第三

瘧病脉證并治第四

中風歷節病脉證并治第五

血痺虛勞病脉證并治第六

肺痿肺癰欬嗽上氣病脉證治第七

瘧病脉證并治第四

師曰瘧脉自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者下之差。弦遲者可溫之。弦緊者可發汗鍼灸也。浮大者可吐之。弦數者風發也。以飲食消息止之。

瘧者少陽之邪。弦者少陽之脉。有是邪則有是脉也。然瘧之舍固在半表半裏之間。而瘧之氣則有偏多偏少之異。故其病有熱多者。有寒多者。有裏多而可下者。有表多而可汗可吐者。有風從熱出而不可以藥散者。當各隨其脉而施治也。徐氏曰脉大者爲陽。小者爲陰。緊雖寒脉。小緊則內入而爲陰矣。陰不可

從表散。故曰下之愈。遲既爲寒。溫之無疑。弦緊不
爲寒脉。而非陰脉。非陰故可發汗。鍼灸也。瘧脉繁弦
而忽浮大。知邪在高分。高者引而越之。故可吐。喻氏
曰。仲景既云弦數者多熱矣。而復申一義云。弦數者
風發。見多熱不已。必至於極熱。熱極則生風。風生則
肝木侮土。而傳其熱於胃。坐耗津液。此非可徒求之
藥。須以飲食消息止其熾熱。卽梨汁。煎漿生津止渴
之屬。正內經風淫於內。治以甘寒之旨也。

病瘧以月一日發。當十五日愈。設不差。當月盡解。如其
不差。當云何。師曰。此結爲癥瘕。名曰瘧。劫急治之。宜

甲煎丸

天氣十五日一更。人之氣亦十五日一更。氣更則邪當解也。否則三十日。天人之氣再更。而邪自不能留矣。設更不愈。其邪必假血依痰。結爲癥瘕。僻處脇下。將成負固不服之勢。故宜急治。驚甲煎丸行氣逐血之藥頗多。而不嫌其峻。一日三服。不嫌其急。所謂乘其未集而擊之也。

驚甲煎丸方

驚甲

十二分炙

烏扇

三分燒
即射干

黃芩

三分

柴胡

六分

鼠婦

三分
熬

乾薑

大黃

桂枝

石芒夫毛

厚朴

紫葳即凌霄

半夏

可膠

芍藥

牡丹

麝蟲各五分

葶藶

人參各一分

瞿麥二分

蜂窠四分

赤硝

十二分

蜣螂

六分

桃仁

二分

右二十二味為末取煨竈下灰一斗清酒一斛五升

浸灰俟酒盡一半着鱉甲於中煮令泛爛如膠漆絞

取汁內諸藥煎為丸如梧子大空心服七九日三服

千金方用鱉甲十二片又有海藻三分太戟一分無

鼠婦赤硝二味

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩冤手足熱而

欲嘔。名曰痺瘧。若但熱不寒者。邪氣內藏於心。外舍分肉之間。令人消燂肌肉。

此與內經論痺瘧文大同。夫陰氣虛者。陽氣必發。發則足以傷氣而耗神。故少氣煩冤也。四肢者。諸陽之本。陽盛則手足熱也。欲嘔者。熱干胃也。邪氣內藏於心者。痺爲陽邪。心爲陽藏。以陽從陽。故邪外舍分肉。而其氣則內通心藏也。消燂肌肉者。肌肉爲陰。陽極則陰消也。

瘧瘧者。其脉如平。身無寒但熱。骨節煩疼。時嘔。白虎加桂枝湯主之。

此與內經論溫瘧文不同。內經言其因此詳其脈與證也。瘧瘧溫瘧俱無寒但熱俱嘔而其因不同。瘧瘧者肺素有熱而加外感爲表寒裏熱之證。緣陰氣內虛不能與陽相爭故不作寒也。溫瘧者邪氣內藏腎中。至春夏而始發爲伏氣外出之證。寒畜久而變熱故亦不作寒也。脈如平者病非乍感故脈如其平時也。骨節煩疼時嘔者熱從腎出外舍於其合而上并於陽明也。白虎甘寒除熱桂枝則因其勢而達之耳。

白虎加桂枝湯方

知母六兩

石膏一斤

甘草二兩

粳米二合

桂枝 三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三
瘧多寒者名曰牡瘧。蜀漆散主之。

瘧多寒者非真寒也。陽氣爲痰飲所遏不得外出肌
表而但內伏心間。心牡藏也。故名牡瘧。蜀漆能吐瘧
痰。痰去則陽伸而寒愈。取雲母龍骨者以蜀漆上越
之。猛恐并動心中之神與氣也。

蜀漆散方

蜀漆 燒去腥

雲母 燒二日夜

龍骨 等分

右三味杵爲散。朱砂前以漿水服半錢匕。

附外臺秘要三方

牡蠣湯

牡蠣

麻黃

各四兩

甘草

二兩

蜀漆

三兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

按此係宋孫奇等所附蓋亦蜀漆散之意而外攻之力較猛矣趙氏云牡蠣與堅消結麻黃非獨散寒且可發越陽氣使通於外結散陽通其病自愈

柴胡去半夏加栝樓根湯

治瘧病發渴者亦治勞瘵

柴胡

八兩

人參

黃芩

甘草

各二兩

括樓根

四兩

生薑

二兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升

溫服一升日二服

柴胡桂薑湯 治瘧寒多微有熱或但寒不熱服一劑

如神

柴胡

半斤

桂枝

三兩

乾薑

二兩

括樓根

四兩

黃芩

三兩

甘草

二兩 炙

牡蠣

二兩 熬

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服

一升日三服微煩復服汗出便愈

趙氏曰此與牡蠣相類而實非牡蠣邪客空下此風

寒濕痺於肌表。肌表既痺。陽氣不得通於外。遂鬱伏於榮血之中。陽氣化熱。血滯成癰。着於其處。遇衛氣行。陽二十五度及之。則病作。其邪之入營者。既無外出之勢。而營之素痺者。亦不出。而與陽爭。故少熱。或無熱也。是用柴胡爲君。發其鬱伏之陽。黃芩爲佐。清其半裏之熱。桂枝乾薑。所以通肌表之痺。括樓根牡蠣。除留熱消癰血。甘草和諸藥。調陰陽也。得汗則痺邪散。血熱行。而病愈矣。

中風歷節病脉并治第五

夫風之爲病。當半身不遂。或但臂不遂者。此爲痺脉微而數。中風使然。

風微於上。下故半身不遂。痺閉於一處。故但臂不遂。以此見風重而痺輕。風動而痺着也。風從虛入。故脉微。風發而成熱。故脉數。曰中風使然者。謂痺病亦是風病。但以在陽者。則爲風。而在陰者。則爲痺耳。

寸口脉浮而緊。緊則爲寒。浮則爲虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脉空虛。賊邪不寫。或左或右。邪氣反緩。正氣卽急。正氣引邪。咽僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪

在。於。經。卽。重。不。勝。邪。入。於。府。卽。不。識。人。邪。入。於。藏。舌。卽。難。言。口。吐。涎。

寒。虛。相。搏。者。正。不。足。而。邪。乘。之。爲。風。寒。初。感。之。診。也。浮。爲。血。虛。者。氣。行。脉。外。而。血。行。脉。中。脉。浮。者。沉。不。足。爲。血。虛。也。血。虛。則。無。以。充。灌。皮。膚。而。絡。脉。空。虛。并。無。以。捍。禦。外。氣。而。賊。邪。不。寫。由。是。或。左。或。右。隨。其。空。處。而。留。著。矣。邪。氣。反。緩。正。氣。卽。急。者。受。邪。之。處。筋。脉。不。用。而。緩。無。邪。之。處。正。氣。獨。治。而。急。緩。者。爲。急。者。所。引。則。口。目。爲。僻。而。肢。體。不。遂。是。以。左。喎。者。邪。反。在。右。右。喎。者。邪。反。在。左。然。或。左。或。右。則。有。邪。正。緩。急。之。別。而。

爲表爲裏亦有經絡藏府之別經云經脉爲裏支而橫者爲絡絡之小者爲孫是則絡淺而經深絡小而經大故絡邪病於肌膚而經邪病連筋骨甚而入府又甚而入藏則邪通矣蓋神藏於臟而通於府府病則神窒於內故不識人諸陰皆連舌本藏氣厥不至舌下則機息於上故舌難言而涎自出也

侯氏黑散

治大風四肢煩重心中惡寒不足者

菊花

四十

白朮

防風

各十

桔梗

八分

黃芩

五分

細辛

乾薑

人參

茯苓

當歸

川芎

牡蠣

礬石

桂枝

分

右十四味杵爲散酒服方寸七日一服初服二十日
溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止卽
藥積腹中不下也熱食卽下矣冷食自能助藥力
此方亦孫奇等所附而去風除熱補虛下痰之法具
備以爲中風之病莫不由是數者所致云爾學者得
其意毋泥其迹可也

寸口脉遲而緩遲則爲寒緩則爲虛營緩則爲亡血衛
緩則爲中風邪氣中經則身癢而癢疹心氣不足邪氣
入中則胸滿而短氣

遲者行之不及。緩者至而無力。不及爲寒。而無力爲虛也。沉而緩者爲營不足。浮而緩者爲衛中風。衛在表而營在裏也。經不足而風入之。血爲風動。則身癢而癢疹。心不足而風中之陽用不布。則胸滿而短氣。經行肌中而心處胸間也。

風引湯除熱癰瘤

大黃

乾薑

龍骨

各四兩

桂枝

三兩

甘草

牡蠣

各二兩

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏

各六兩

右十二味杵麤篩以葷囊盛之。取三指撮并花水三