



胎產心法卷之下

上谷閣純璽

麻瞽論

產後麻瞽。皆因氣虛血少。不能充溢乎週身也。即如人曲肱而枕。稍久。即麻木。不為我用。豈非氣血不週遍之明徵歟。目得血而能視。得清氣之升而能用。血虛氣弱。不能生清。故濁不降而瞽。宜生血補氣。十全大補湯主之。至於去血過多。手足發麻。小腹大痛。則遍體麻暈欲死。此非惡露凝滯。乃虛中挾痰。六君子加炮薑香附當歸。曾治一婦。產後右半身麻瞽而昏暈不省人事。發即胸膈痞悶。下體重着。或時心神蕩搖。若無心肺之狀。頃則周身冷汗如漉。大吐痰涎。而蘇。此產後經脉空虛。痰飲乘虛襲入之故。因與六君子加歸著肉桂。隨手而效。復有一婦。產後左半身麻瞽。昏暈不省人事。發則周身大痛。筋脈癱瘓。肌肉攣動。或時頭面赤熱。或時腿上振振動。頃則蒸蒸汗出。而蘇。此產後營血大虧。虛風襲入之故。用十全大補湯治之。諸證悉平。但麻瞽不止。後與地黃飲子而安。

地黃飲子

治腎氣上交於心。舌瘡足痺。

熟地

三兩

巴戟天

酒浸

附子

炮

山茱萸

去核

肉苁蓉

酒浸

石斛

白茯苓

石菖蒲

遠志

甘草湯泡

甜肉桂

麥冬

去心各

五味子

五錢

共為粗末。每服五錢。生薑五片。大棗一枚。薄荷七葉。水煎。日二服。服無時。方中桂附巴戟。原為驅逐濁陰痰涎而設。不可執已見而輕去之。

十全大補湯

見上卷胎不長養門

六君子湯 見上卷諸痛門

口乾渴兼小便不通或短少論

凡產後舌燥咽乾而渴兼小便不利由產後亡血或汗多所致內亡津液也夫日用水穀胃納而脾運肺散至精至清之氣為津為液清肅下行膀胱而為小便其氣通心受火色化為榮身之血值產亡血而又汗出加之產後氣虛不能為胃行其津液則是化生之氣不運滲泄之令不行所以上無津液流通而有咽燥乾渴之證下氣不升而有小便不通雖通而亦短少之候勿作淋秘輕用滲利使氣益虛病益甚治法必當助脾益肺升舉氣血則氣化流行陰升陽降斯水入經而為血為津穀入胃而長氣行脉自然津液充而便利調勻矣初產生化湯多服數劑如汗多亡津液須加人參於內使血生而津足若無塊痛六君子倍參著或服生津止渴益水飲渴甚兼服參麥飲如產後口乾少力宜生津益液湯有用四君子湯加車前一錢桂心五分若認咽乾口燥為火而用芩連梔柏以降之認小便秘澀為水滯而用五苓等劑以通之不特非其治法更患愈通愈竭變生他證矣尊生云小便不通金匱腎氣丸可加減用之予謂當用加味腎氣丸為是若兼口渴用生津止渴益水飲渴甚兼生脉飲密齋云如惡露不來敗血閉澀水瀆小便不通其證則小腹脹滿刺痛乍寒乍熱煩悶不寧用加味五苓主之予謂初產自當用生化湯則瘀行便利矣可無事乎五苓也如產過五七日而惡露亦自宜漸少而止矣又何必事乎五苓也況產後最禁發汗利水予焉敢輕產而用五苓以竭其陰乎世有治小便不通用炒鹽加麝少許填臍中外用葱白十餘莖作一束切如半指厚置鹽麝上將苓灸之覺熱氣入腹難忍方止小便即通此惟氣閉者宜之若產後氣虛源涸與夫熱結膀胱者皆不可

用。

生津止渴益水飲 治產後口渴小便不利。

參生地麥冬去心各二錢黃耆分錢五五味子粒十當歸三錢酒浸茯苓

升麻炙甘草各四錢葛根錢一

水煎服。如汗多加麻黃根錢一炒棗仁錢一浮小麥撮大便日久不通加酒洗肉蓯蓉一錢五分渴

甚用參麥飲代茶飲之。不可疑而不用。凡一切降火利便藥斷不可用。

生津益液湯 治產後口乾少力。

人參宜隨麥冬分錢二茯苓瓜蒌根各一錢甘草分八小麥撮竹葉片十

棗二枚水煎服。如大渴加蘆根。

加味五苓散 治產後惡露不行小便不通。

猪苓澤瀉白朮炒土茯苓桂心各一錢桃仁去皮紅花各二錢

水煎服。此方予未敢用。姑錄之以備參考耳。

生化湯 見本卷生化湯論

六君子湯 見上卷諸痛門

參麥飲 見本卷暈厥門

四君子湯 見上卷胎逆上逼門

加味腎氣丸 見上卷諸痛門 附六味地黃湯

泄瀉及完穀不化並遺尿論



產後泄瀉不可與雜證同治。大率中氣虛弱。傳化失職所致。氣虛食積與溼也。氣虛宜補。食積宜消。溼宜燥之。然惡路未除。又難以驟補。峻消急燥。當先用蓮子生湯。三劑化舊生新。方中且有蓮子茯苓補脾利水。兼治其瀉。候舊化新生。然後用健脾利水。生湯或補氣或消食。或化積。或燥溼。分利。因證加入對證之藥。始無滯澁虛虛之失。至產後旬日。外方可與雜證同論。然猶宜量人虛實而治也。如痛下清水腹鳴。米飲不化者。以寒瀉溫之。如糞色黃。肛門痛。以熱瀉清之。如飲食過多。傷脾。噯氣。味如敗卵。以食積消之。如飲食減少。食下腹鳴。腹急。盡下所食之物。方覺暢快。以脾虛食積補而消之。丹溪云。如產後虛瀉。眼昏不識人。危證。用參苓木附湯救之。又有胎前久瀉。產後不止。以致虛脫。須從暈服參苓生湯。以扶虛。仍分塊痛。不痛。加減而治。凡瀉兼熱。切勿用苓。蓮。桃。柏。兼痰。切勿用半夏。生薑。如瀉渴。參麥飲。以回津液。如產後脾瀉。石止參苓蓮子飲。妙。夫完穀不化者。因產時勞倦傷脾。而轉輸稽遲也。夫水穀入胃。游溢精氣。散歸於脾。脾氣散精。上歸於肺。而謂通水道。乃能致氣滋臟。以養人。今因產勞倦。脾傷。以致中和之氣不能化。而物完出焉。病名食泄。又飲食太過。脾胃受傷。亦致完穀不化。俗呼為水穀痢也。然產方三日內。血塊未散。患此脾敗胃弱之證。未可遽加著木。且服加味生湯。內有益智砂仁。少溫其氣。俟塊消散。服參苓大補生湯。如胃氣虛瀉。痢黃色。用補中益氣湯。加木香。治之。若久瀉痢虛者。參香散。如久瀉元氣下陷。大便不禁。肛門如脫。寒用加味六君子湯。若見完穀不化。色白如糜。此脾胃大虛。元氣虛脫之候。十有九死。惟猛進溫補之劑。庶可挽回。即有煩燥發熱。面赤。脈來數大。皆虛火上炎之故。當並進桂附人參甘草乾薑苓木之類。伏龍肝煎湯代水煎服。仍得收功。若小便混濁如泔。或大便中痛白沫。如腸垢者。乃元氣下陷之故。並宜

補中益氣用桂苓抱菴升舉之。或瀉息水不用。加蘄艾香附吳茱萸。若兼瘀結不通。腹脹喘急。雖神丹亦無濟也。如大便不知為遺尿。補中益氣湯加肉從蓉故帛。

蓮子生化湯 治產後血塊未消泄瀉

川芎 茯苓 各二錢 當歸 各四錢 黃土炒 一方一炮 薑 四錢 桃仁 十粒去皮尖 炙草 五錢

蓮肉 去十枚 水煎服 一方無桃仁

健脾利水生化湯

川芎 當歸 各一錢 白朮 二錢 澤瀉 八錢 乾薑 四錢 陳皮 炙草 各五錢

肉苁蓉 人參 各三錢 茯苓 五錢 熟瀉 加炒黃連 五錢 瀉水腹痛米飲不化加

一方無茯苓 寒瀉加砂仁 分炮乾薑 分 熱瀉加炒黃連 分 瀉水腹痛米飲不化加

砂仁 分 山查麥芽 瀉有酸暖具氣係食積加神麴 分 砂仁 分 山查麥芽 少食不安瀉即

覺安快者亦以食積論 脾氣虛久瀉加升麻 瀉水多而腹不痛者有溼加製蒼朮 錢一

燥之 諸瀉方中須加蓮子十枚

人參 木附湯 丹溪治產後虛瀉 眼昏不識人危證 用此方救之

人參 白朮 三錢 茯苓 附子 製各錢

水煎服

參苓生化湯 治胎前久瀉 產後不止

人參 當歸 各二錢 乾薑 炮 炙草 各五錢 訶子皮 川芎 山藥 各一錢

池瀉並完穀不化方

肉 菓一個麵 茯苓錢一錢五分 蓮子七粒 糯米撮一大

水煎服 虛甚加人參錢三錢四分 如七日内外塊痛不止減參肉菓訶子以除痛 血塊不痛

加土炒白木錢三錢 陳皮分三

參苓蓮子飲 治產後脾泄不止并治年久不止脾泄之證

人參 白木土炒各錢二錢 白芍炒八分 當歸一錢五分 白茯苓 山藥各一錢 升麻

薑二片水三鍾煎服取藥內蓮子送藥。甚者腹疼加炒黑乾薑分五 虛甚加人參錢三四 加味生化湯 治產後脾虛三日内血塊未消完穀不化胎前素弱者非參木能治此方

主之

川芎 益智仁 砂仁各一錢 當歸土炒錢四 炮薑分四 炙草分五 茯苓錢一錢五分

桃仁皮十粒去尖

水煎服 參苓大補生化湯 治產後血塊痛止可服此以補之完穀自化矣

人參 白木土炒各錢二錢 川芎 當歸 益智仁 白芍炒 茯苓 乾薑

水煎服 瀉而腹痛加砂仁分八 瀉水多加澤瀉木通各八分 渴加去心麥冬五味子 寒倍

炮薑加木香分四 食積黃色以神麴麥芽山查砂仁擇一二味加入

參香散 治久瀉痢虛者

人參 木香錢各二 肉蔻 茯苓 扁豆錢各四 陳皮 粟穀錢各一

為末米飲下。

加味六君子湯 凡產後瀉久胃氣虛弱完穀不化宜溫助胃氣也

人參 茯苓 半夏製各一錢 白朮二錢土炒 陳皮 炙甘草各八分 肉蓯蓉一枚熟去麵煨

木香分三四

水煎服 一方有炙乾薑分四

參麥飲 見本卷暈厥門

補中益氣湯 見上卷諸痛門

痢滯論

凡雜證之痢皆由暑溼之積邪或挾食積所致傷於氣分則痢白傷於血分則痢赤氣血俱傷亦白兼下至產後患此則有不同治法亦有異蓋多由中氣虛而停積也如產後七日內外患赤白痢疾後重頻併最為難治欲調氣行血而推盪痢邪則慮產後之元氣方虛欲滋榮益氣而大補產虛又恐反助痢初之邪盛其行不損元補不助邪惟生化湯去乾薑加以木香茯苓名香苓生化湯為善以其能消惡露兼行痢滯也如痢在七日之外可酌加芍藥連蓮朴等藥如傷麴食穀食瀉痢先服生化湯加炒神麴塊痛止服六君子加麥芽錢一或炒神麴錢一如傷肉食瀉痢先服生化湯加山查砂仁塊痛止服六君子湯加山查四枚砂仁五錢或炒神麴錢一如半月外患赤痢後重歸芍連殼飲如脾氣虛弱瀉痢四肢浮腫宜六君子湯加木香肉蓯蓉錢一如胃氣虛弱瀉痢完穀不

如瀉痢黃色乃脾土正氣虛耳宜補中益氣湯加木香分四肉蓯蓉一枚煨如胃氣虛弱瀉痢完穀不



化當溫助胃氣及產後瀉痢日久後重者並宜服加味六君子湯。大凡產後赤痢去血多薑砂木香之類不可多用熱則血愈行。倘血痢日久不止者血虛也宜四物湯加荊芥人參或用人參錢香連丸錢同為末下。凡諸證兼嘔吐皆宜加藿香分五痰加製半夏分八兼小便短澀引加燈心三十寸且燈心利水而不傷陰。況產後津液已虧兼之瀉痢傷陰復傷津液小便理宜短少故止用燈心足矣。不可用利水傷陰之藥也。如胎前下痢產後不止伏龍肝湯丸治之。又有白頭翁加甘草阿膠湯治產後痢不止。馮氏云產後腹痛瀉痢若非外因所傷乃屬腎氣虧損陽虛不能生土陰虛不能閉藏耳。必用四神八味補腎。倘誤投分利導水之劑是益其虛但瀉痢之證非脾即腎。如病在腎所謂補脾不如補腎。如病在脾自又補腎不如補脾也。圓機活法在臨證定之耳。

香苓生化湯

治產後七日内患赤白痢

川

芎錢二

當歸錢五

炙草分五

桃仁十粒去尖

茯苓錢一

陳皮分四

木香分

水煎服

如紅痢腹痛加砂仁分三

七日外可加白芍黃連炒蓮肉製厚朴分五

歸芍連殼飲

治產後半月外患赤痢後重

川

芎錢一

當歸錢二

白芍炒酒

茯苓錢一

黃連分六

枳殼錢五

甘草

木香分三

水煎服

五皮散

治產後風溼傷脾氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫脹氣喘

陳皮

桑皮

薑皮

茯苓皮

大腹皮黑豆水製

淨各一錢

水煎服。

香連丸 治下痢赤白膿血相雜裏急後重。

黃連二十兩吳黃十兩同炒去吳黃 木香四兩八錢不見火

醋糊丸米飲下。一方等分蜜丸。一方加甘草兩黃連兩用蜜水炒蒸晒九次入木香為丸。

伏龍肝湯丸 治胎前下痢產後不止及元氣大虛瘀積小腹結痛不勝攻擊者。

山查肉炮一兩黑 黑糖二兩枯

二味一半為丸一半為末用伏龍肝兩煎湯代水煎前末二錢日三夜二服一晝夜令盡。

氣虛加人參二錢 駕馭之。虛熱加炮薑肉桂茯苓炙甘草 兼感風寒加葱白香豉。

膈氣不舒磨沉香數匙調服。

生化湯見本卷生化湯論後

六君子湯

補中益氣湯俱見上卷諸痛門

加味六君子湯見本卷泄瀉門

四物湯見上卷安胎門

白頭翁加甘草阿膠湯見上卷痢門

四神丸見上卷腹痛門

八味丸見上卷諸痛門附六味地黃湯下

霍亂論

霍亂者。反覆不寧。而揮霍撩亂之謂也。邪干於上則吐。邪干於下則瀉。邪注中焦。不能容受。或冷熱不調。邪正相搏。則上吐下瀉。此邪字雖有寒溼及水土氣令。或乍寒乍熱。外邪之侵。然因於飲食停滯。或傷過飽。食不能化。而致者十之六七。常人尚多如此。而況產後血去氣損。脾胃愈虛。飲食易傷。風冷易乘。一旦不及運化。或稍失調理。則陰陽升降不順。清濁亂於腸胃。即有心腹絞痛。手足逆冷。吐瀉交作。霍亂之證矣。如塊痛未除。宜服生化六和湯。塊痛已除。宜溫中散。無塊痛而手足厥冷者。宜附子散。密齋用加味理中湯。治產後霍亂。若用於塊痛已除之後。亦可。

生化六和湯 治產後塊痛未除。氣血虛損。傷食感寒。而霍亂吐瀉。

川芎錢二 當歸錢四 茯苓錢一 砂仁分六 乾薑 陳皮 藿香 炙甘草各分

薑一片。水煎服。

溫中散

人參隨宜 白朮分錢五 當歸錢二 厚朴分八 薑製 乾薑分四 茯苓錢一 草豆蔻

分六

薑一片。水煎服。

附子散 治產後無塊痛。霍亂吐瀉。手足厥冷。

人參 白朮土炒各錢一 當歸錢二 陳皮 丁香 乾薑各四分

附子製五分

為末。用二錢粥飲調下。

加味理中湯

人

參

宜

白

木

土

炒

錢

乾

薑

陳

皮

各

四

藿

香

厚

朴

薑

製

各

炙

草

分

二

生薑五片。水煎溫服。

氣逆嘔吐不食論

人之胃腑。為水穀之海。而水穀之精。化為血氣。榮潤臟腑。產後勞傷。臟腑寒邪。易乘入於腸胃。則氣逆嘔吐。而不食也。初產宜加減生化湯。七日外。宜溫胃丁香散。如咳嗽嘔逆。怔忡目眩。用石蓮散。秘書云。產後胃氣不和。嘔吐不止。全不納穀。初產香砂生化湯。塊痛止。加味香砂生化湯。又云。當分二證。立三方。如七日內。塊痛未除。當重塊安胃行血湯。佐以溫胃藥。如七日內。曾服生化湯三四貼。血塊不痛。嘔不納穀。當服加減六和湯。又和中湯。此二方選用。如產後嘔止。或服三方。而胃和嘔止痛止。但血氣不足。食少。宜補中和胃湯。馮氏倣立齋治法云。飲食過多。六君子加查麵。兼勞役。補中湯。飲食停滯。人參養胃湯。脾胃氣虛。六君子。胃氣虛寒。加炮薑煨木香。寒水侮土。益黃散。肝木侮土。六君子加升柴。嘔吐泄瀉。手足俱冷。肚腹作痛。乃陽氣虛寒。急用附子理中湯。此內有命門火衰。不能生土。而嘔吐用八味丸。一論恐非救急之務。故摘出。密齋遵郭稽中治云。有敗血散於脾胃。脾受則不能運化津液。而成腹脹。胃受則不能受水穀。而生嘔逆。若以尋常治脹嘔之劑。則藥不對證。反增其病。用抵聖湯。若產後傷食嘔吐脹滿。用六君子湯為主。加隨證藥治之。予謂馮氏偏於補氣。密齋用抵聖一論。泥於敗血。臨證者。似宜斟酌。一座婦朝吐痰。夜發熱。晝夜無寐。或用清痰降火。肌體日瘦。飲食日少。前證愈甚。蓋早間吐痰。脾氣虛也。夜間發熱。肝血虛也。晝夜無寐。脾血耗也。遂用六君子湯加味逍遙散。加味



歸脾湯以次調理而痊。

加減生化湯 治產後嘔逆不食。

川芎錢一 當歸錢四 炮薑 砂仁各四分 炙草分五

薑一片。水煎服。

溫胃丁香散 治產後七日外患嘔逆不食。

人參錢一 當歸 白朮土炒各二錢 藿香 前胡 炮薑 丁香 陳皮

炙草各四分

薑一片。水煎服。

石蓮散 治產後咳嗽嘔逆怔忡目眩。

石蓮子錢一兩五錢去殼 茯苓兩一 丁香錢五

共為細末。米飲調送。每服三錢。

香砂生化湯 治產後塊痛未除。氣逆嘔吐。

當歸錢四 川芎錢一 製半夏分八 桃仁粒去尖 炙薑 藿香 砂仁各四分

陳皮錢三 炙草分五

生薑一片。水煎服。

加味香砂生化湯 治產後塊痛已除。嘔逆不止。

當歸錢二 川芎 白朮土炒各一錢 製夏分八 陳皮分三 前胡 砂仁

藿香 炮薑各四分 炙草分五

生薑一片。水煎服。

安胃行血湯

治產後七日內塊痛未除嘔吐不止全不納穀

人參 川芎錢各

當歸酒洗

桃仁皮十粒去尖

砂仁 藿香 炙草各四分

生薑一片。水煎服。

一方無桃仁有汗不可用薑

加減六和湯

治產後七日內曾服生化湯三四貼令血塊不痛但嘔不止不納穀

人參 川芎

茯苓錢各一

當歸錢二

山藥錢一分炒五

藿香 陳皮各三分

白豆蔻 炙草各四分

薑一片。水煎服。

嘔止減豆蔻 一方有炮薑四分

和中湯

人參 當歸

茯苓錢各一

白朮錢一分土炒五

扁豆錢二

丁香 藿香

陳皮各三分

炙草四分

薑一片。水煎服。

嘔吐止去丁香。受寒加吳萸一分二

補中和胃湯

治產後嘔吐服前三方而胃和嘔止塊痛止但氣血不足食少者

人參 白朮土炒

當歸

扁豆錢名二

茯苓錢一

山藥錢一分五

炮薑

陳皮 炙草各四分

水煎服。

益黃散

治脾胃虛寒。水反來侮。以致嘔吐不食。或肚腹作痛。或大便不實。手足厥冷等

證。

陳皮兩一青皮錢五訶子錢二肉桂錢二炙甘草錢五丁香錢二

右為散。每服二三錢。水煎服。或黑糖調服一錢。益黃不用補。益中州。反用青皮二橘。辟除陳氣。其旨最微。此方原為嬰兒久瀉連縣不已。乳食積滯於內。故需二皮。專理肝脾宿蓄。即兼訶子以兜瀉下脫。丁香以溫理中州。甘草以和脾氣。深得瀉中寓補之法。非洞達斯義。難與言至治也。

抵聖湯 治產後敗血積於脾胃。腹脹嘔逆。

人參 製夏 澤蘭 陳皮 赤芍各二錢炙甘草錢一

火焙生薑三片。水煎服。惡露過多者。去澤蘭。赤芍倍加。陳皮生薑。予謂陳皮用二錢過當。

用一錢足矣。

六君子湯

補中益氣湯

人參養胃湯俱見上卷諸痛門

附子理中湯見上卷瘧門附枳實理中湯

呃逆論即吃忒又名咳逆

凡病呃逆者。乃逆氣使然。蓋此氣從胃中出。上衝噴門。吃忒而作聲也。有胃氣虛寒者。有中氣大虛。衝任之火直犯清道而上者。有飲水過多。水停而逆者。有大小便閉。下焦不通。其氣上逆者。有胃絕者。至於產後呃逆。乃胃虛氣寒證也。有云呃噫者。胃氣所生。宜加味理中湯主之。醫通云。產後氣血俱虛。風冷搏氣而逆上。乃胃氣虛寒之極。最為惡候。理中加丁香。古方以丁香

豆蔻伏龍肝為末。用桃仁吳萸煎湯調下一錢匙。如人行五里再服。未應急投參附。遲則不救。尊生治吃忒云。以可異事。或費思索事。出其不意扣之。令其思維立止。又立羗附湯以治之。馮氏云。如中氣太虛。下焦陰火上衝。而致呃逆者。當用桂附乾薑之類。

加味理中湯

人參 白朮

土炒各一錢

乾柿蒂

二錢

丁香

炮薑

各五分

陳皮

炙草

各八分

水煎服

有熱去丁香。加竹茹

二錢

如虛羸太甚。飲食減少呃逆者。胃絕也難治。

羗附湯

羗活

製附子

小茴香

各五分

木香

生薑

各二分五釐

食鹽

捻

水煎熱服立愈。

理中湯

見上卷痢門

腹脹滿悶論

產後有因敗血入於脾胃。腹脹嘔吐者。已於嘔吐門中論之矣。然婦人因產。脾胃多虛。飲食最易停滯。而生脹悶。若產畢隨服生化湯。消其舊瘀。而生其新血。瘀塊既消。便大補氣血。使脾胃健運。自無中虛脹滿之證。其產後大率因傷食而誤用消導。因氣鬱而誤專順散。或因多食冷物而停滯惡露。或因血虛大便燥結。誤下而愈脹。此蓋止知傷食當消。氣鬱當順。惡露當攻。便結當下。不知消耗愈多。胃氣大損。滿悶益增。氣不升降。積鬱之久。兼成膨脹。若再專用攻消。不死不休矣。豈知消導佐於補劑內。則脾強而所傷之食消。氣散逐瘀。佐於養血劑中。則惡露自行而大便濡潤亦通。更考之綱目內云。飲食停於脾。六君子湯加厚朴。錢若飲食傷於胃。宜六



君子湯以補之。又云大凡停於脾。莫妙節其飲食。自愈為善。尊生亦用加減六君子湯治之。秘書立有治脹方。並養生化滯湯二方。治產後脹證。均未敢專於消導。前人之慮產深矣。醫通云。胎前孕婦服安胎藥過多。或正產半產後。經一兩月惡露未淨。此非敗血之比。宜導氣行血。若用止截誤矣。又云飽悶惡露不行。多因血逆。宜行瘀為主。如有塊上升。飽悶欲吐者。二陳湯加薑桂香附炮查蓬朮塊不散。積久愈堅。琥珀黑龍丹。予謂審知飽悶。實因惡露不行所致。若初產仍宜服生化湯。瘀去而飽悶自開。可無藉乎二陳炮查蓬朮。恐產虛者難當耳。

治脹方 治產後腹脹

人參錢二

白朮炒土 當歸各三錢

茯苓一錢五分

川芎七分

陳皮四分

甘草三分

水煎服

養生化滯湯 治產後大便不通。誤服大黃等藥。致成鼓脹。

人參

茯苓 川芎

白朮炒各一錢

當歸錢四

桃仁十粒去

肉苁蓉錢五

大腹皮五分

陳皮四分

甘草三分

水煎服

去泥

水煎服

如服甚再加人參錢二

陳皮四分

製香附錢三

炙甘草各三

嘗治誤用大黃多者。服參歸至半觔以上。大便乃通。腫

脹漸退

加減六君子湯

治產後腹脹

人參

白朮炒土

茯苓各一錢

陳皮六分

厚朴八分

砂仁

炮薑各四分

炙甘草五分

水煎服