

00031

齊陽綱目



濟陽綱目目錄

卷四十一

積聚瘕塊

論

脈法

通治一切積聚方

仙方香殼丸一

刺蓬煎丸二

香稜丸三

磨積三稜丸四

木香通氣丸五

玄胡索丸六

濟陽綱目

卷四十一

大阿魏丸七

白芥丸八

千金不換肉消丸九

破積導飲丸十

栽朮潰堅湯十一

治寒積方二

大七氣湯十二

枳殼散十三

散聚湯十四

流氣丸十五

鷄爪三稜丸十六

礪砂煎丸十七

勝紅丸十八

治瘕丸十九

木香三稜丸二十

治熱積方三

硝石丸二十一

醋煮三稜丸二十二

神功助化散二十三

聖散子二十四

遇仙丹二十五

木香和裏丸二十六

通玄二八丹二十七

宜毒丸二十八

全真丸二十九

解毒板榔丸三十

取積丹三十一

治暴積方四

大承氣湯三十二

杉木湯三十三

濟陽綱目

卷四十一

肘后方三十四

一方三十五

治久積方五

萬病紫苑丸三十六

萬病丸三十七

乾柿丸三十八

神效五食湯三十九

妙香丸四十

治五積方六

肥氣丸四十一

伏梁丸四十二

痞氣丸四十三

息奔丸四十四

奔豚丸四十五

增損肥氣丸四十六

增損伏梁丸 四十七

增損痞氣丸 四十八

增損息黃湯 四十九

增損奔豚湯 五十

溫白丸 五十一

勻氣湯 五十二

海藏方 五十三

半夏湯 五十四

枳實散 五十五

五靈丸 五十六

聚膏丸 五十七

葶藶丸 五十八

治食積方 七

保和丸 五十九

紅丸子 六十

紺珠木香檳榔丸 六十一

二賢散 六十二

濟陽綱目 卷四十一 目錄

主

小二稜煎 六十三

丁香脾積丸 六十四

治肉積方 八

阿魏丸 六十五

小阿魏丸 六十六

治酒積方 九

烏梅丸 六十七

消滯丸 六十八

東垣草豆蔻丸 六十九

酒積方 七十

不藥法 七十一

治茶積方 十

茶癖方 七十二

星朮丸 七十三

丹溪方 七十四

一方 七十五

治疫積方 七十五

石礬丸 七十六

開結枳實丸 七十七

黃連磨積丸 七十八

大阿魏丸 七十九

蚶殼丸 八十

治水積方 八十一

芫花丸 八十二

神效五食湯 八十三

治氣積方 八十四

導氣枳殼丸 八十五

木香化滯湯 八十六

濟陽綱目 卷四十二 目錄

四

一法 八十七

治驚積方 八十八

加味妙應丸 八十九

治血積方 九十

海石丸 九十一

桃仁承氣湯 九十二

桃仁丸 九十三

桃仁煎 九十四

桃奴散 九十五

治腸下積塊方 九十六

龍薈丸 九十七

小阿魏丸 九十八

神效阿魏散 九十四

丹溪方 九十五

治諸蟲瘕方 十七

蟻瘕 九十六

鷄子致積 九十七

髮瘕 九十八

蛇瘕 九十九

蠶瘕 一百

米瘕 一百一

治積補攻法 十八

丹溪和胃湯 一百二

丹溪方 一百三

丹溪方 一百四

丹溪方 一百五

丹溪方 一百六

丹溪方 一百七

濟陽綱目 卷四十一

五

磨積藥 一百八

一方 一百九

次與攻塊方 一百十

又方 一百十

三聖膏 一百十

琥珀膏 一百十

一方 一百十

又方 一百十

神應比天膏 一百十

貼疳膏 一百十

貼疳積塊 一百十

集驗聚瘕方 一百十

濟陽綱目卷四十一

涇陽張 楠蔭齋註梓

臨潼武叔卿先生編輯

涇陽姚 恩錫三續梓

積聚瘕塊 瘕音時食不消也腸積聚也小兒疳

論曰積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成

故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚

名曰聚積之始發也有常處其痛不離其部上下有

所終始左右有所窮處聚之始發也無根本上下無

濟陽綱目 卷四十一 積聚瘕塊

一

所留止其痛無常處是積聚藏府陰陽之別也肝之

積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人

發欬逆瘕瘕連歲不已心之積名曰伏梁起臍上如

臂上至心下久不愈令人煩心心痛脾之積名曰痞

氣在胃脘右側覆大如盤久不愈令人四肢不收發

黃疸飲食不為肌膚肺之積名曰息贖在右脇下大

如覆杯久不愈令人酒淅寒熱喘咳發肺癰腎之積

名曰奔豚發於小腹上至心下若豚狀或上或下無

時久不愈令人喘逆骨痠少氣此五積之狀各隨五

藏發病故不同也。有言積聚者，有言癥瘕者，有言痞
癖者，名雖異而病則同也。原其所得之由，本因六淫
七情所干，積久而成也。治療之法，當察其所痛，以知
其病。有餘不足，可補則補，可瀉則瀉，無逆天時，詳察
府之高下，辨積聚之虛實，如寒者溫之，結者散之，客
者除之，留者行之，堅者削之，又當節飲食，慎起居，和
其中外，使可畢已。若驟以大毒之劑攻之，積不能除，
反傷其氣，終難治矣。故潔古云：養正積自除。此之謂
也。小兒癥瘕如蛇，如信肝內有血孔，通貫外有血筋，盤
盤同直，通背脊下與臍相對，有動脈處為病之根。

濟陽綱目

卷四十一

癥瘕痞塊

二

李東垣曰：諸積皆本於喜怒傷藏，而陰虛陰既虛矣，
則風雨襲陰之虛，病起於上而生積，情濕襲陰之虛，
病起於下而成積。
許學士云：治積之法，或以所惡者攻之，或以所喜者
誘之，則易愈。如硃砂水銀治肉積，神麩麥芽治酒積，
水蛭蠅蟲治血積，木香枳榔治氣積，牽牛甘遂治水
積，煨黃蘗粉治疫積，礞石巴豆治食積，各從其類也。
若用羣隊之藥，分其勢則難取效，須要認得分明，是
何積聚，眾見何證，然後增加佐使之藥，不爾反有所

損要在臨時通變也。

潔古云：壯人無積，虛人則有之，皆由脾胃性弱，氣血
兩衰，四時有感，皆能成積。若遠以磨堅破結之藥治
之，疾似去而人已衰矣。乾漆硃砂三棱，事作大黃之
類，得藥則暫快，藥過則脾胃之真氣消，疾暫愈，究何
益哉？故善治者，當先補虛，使血氣壯，積自消，如滿朝
皆君子，則小人自無容地也。不問何藏先弱，其中使
能飲食，是其本也。根本既固，則積聚自消矣。蔣按
葉氏曰：按潔古養正積自除之語，乃為世之治積者
好行攻伐之劑，故發此以救時之弊也。然人之積氣
有微甚不同，積之微者，但養其正，正勝則積自消，譬
之鼠竊狗偷之盜，朝政清明，彼將自散矣。苟或積氣
之甚，難養其正，恐日積月累之邪，根深蒂固，欲其消
泯，散不可得也，必攻補兼施，然後可。譬之恃險自
固之盜，非王化所能服，必強我六師以伐之。如高宗
之於鬼方，攻之而克也。故治積之法，不養其正，而徒
為攻擊，則正氣愈虛，邪氣猶在，固不可也。若養其正
而於邪之甚者，遽謂其能自除，不復攻之，亦不可也。

濟陽綱目

卷四十一 積聚痞塊

五

變而通之存乎其人。

丹溪曰塊是有形之物氣不能成塊乃痰與食積死血也在中為痰右為食積左為血積。大法鹹以軟

之堅以削之行氣開痰為主。治塊用海石三稜莪

朮香附俱醋煮桃仁紅花五靈脂之類為丸石礮

字古新切音減白朮湯下。蜀葵根煎湯入人參白朮青皮

陳皮甘草稍牛膝煎成膏入細研桃仁玄明粉各少

許熱飲二服當見塊下重者須補劑後再加減行

石礮去痰積食積洗滌垢膩有功。瓦礮子能消血

濟陽綱目

卷四十一

積聚痞塊

四

塊亦能消痰。瓦礮子即蠟壳也考之本草云蠟壳如屋瓦燒以醋淬三度埋令壞醋膏丸治

一切血積塊不可專用下藥徒損真氣病亦不去當

氣痰癥消導使融化。行死血塊塊去須大補。婦人有塊

多是死血。凡痞塊在皮裏膜外須用補氣藥及香

附開之兼二陳湯先須斷厚味。

葉氏曰氣無形故不成塊然痰與食積死血多因氣

滯而成是氣雖不為塊而所以為塊者實由於氣故

治積之法以行氣為先。

戴氏曰積聚癥瘕有積聚成塊不能移動者是癥或

有或無或上或下或左或右者是瘕。飲癖成塊在

腹脇之間病類積聚用破塊藥多不效宜行其飲導

痰湯何以知其有飲其人先病口吐涎沫清水或素

多痰者是也。腹中自若癖瘕隨氣上下未有定處

宜散聚湯。有正當積聚處因熱如火漸及四肢一

日數發二三日又愈此不當攻其熱。有原得熱病

熱結不散遂成癥瘕此當兼用去熱之劑。

李氏曰經云積聚癥瘕痞滿皆太陰濕土之氣始因

外感內傷氣鬱醫誤補而留之以成積。積者陰氣

濟陽綱目

卷四十一

積聚痞塊

五

五藏所主。脉沉伏或左或右發有根痛有常處肝積

左脇下曰肥氣言風氣有餘而血隨氣不行也令人

脇痛痰癥心積膈上曰伏梁言如梁之橫架心下令

人煩心乃火之鬱也。忌熱藥與灸又腸癰與此相似

但身股背腫環臍而痛為癰脾積胃脘稍右曰痞氣

言陽氣為濕所蓄也。令人黃疸倦怠飲食不為肌膚

仍忌熱藥肺積右脇下曰息賁言喘息奔而上行也

令人咳嗽肺癰腎積發於小腹或湊心下曰奔豚言

若豚之奔衝上下無時也。令人喘逆骨疼最為難治

諸積勿輕吐下。徒損真氣。積亦不去。奔豚尤不可吐。
五積古有五方。今增損五積丸。更妙。聚者陽氣。六
府所成。脉沉結。或隱或見。發無根。痛無常處。散聚湯。
七氣湯。香稜丸。大阿魏丸。大安丸。加參。左屬死血。
破血爲主。海石丸。或當歸龍薈丸。料五錢。加桃仁。姜
黃各一兩。蜜丸。右屬氣積。調氣爲主。青皮湯。木香
分氣丸。有積者消積。正元散。紅丸子。小阿魏丸。或當
歸龍薈丸。保和丸。俱加鴉鴉屎。中乃水穀出入之
路。飲食七情鬱積成痰。石礮丸。白芥丸。積初爲寒

濟陽綱目

卷四十一 積聚痞塊

太

宜辛溫消導。大七氣湯。烏白丸。大小溫中丸。退黃丸。
阿魏撞氣丸。久則爲熱。宜辛寒推蕩。木香枳榔丸。通
元二八丹。消塊丸。通用纂積丹。有蟲者妙應丸。外治
三聖膏。三稜煎。神效阿魏散。陽虛有積。易治。惟陰
虛難以峻補。痞積又忌滯藥。止宜早服滋補藥。加
鱉甲。龜板。秋石丹。午服枳木丸。大安丸。或醋鱉丸。善
消融化爲妙。若痞積滯冷貫臍。誤爲沉寒。冷痢。投以
姜附熱藥。初服甚與病情相宜。久則痞積益甚。真氣
傷而陰血燥矣。其硫附固不可服。如知栢門冬。寒涼

傷肥滯氣。亦所不宜。古云。衰其大半而止。又云。養正
積自除。皆爲虛損有積而言也。平補之外。更能斷厚
味。節色慾。戒暴怒。正思慮。庶乎萬全。

或問人有積塊。疝氣。心腹痛等證者。雖多服久服附
子。姜桂等熱藥。而不發藥毒。不生他病。然本病日深。
者何也。王節齋曰。諸積諸痛。喜溫而惡寒。熱藥與病
情相合。積久成鬱。而火邪深矣。鬱熱既深。則見寒愈
逆。則見熱愈喜。兩熱相從。故不生他病。所謂亢則害。
承乃制。火極而似水者也。然真氣被食。陰血乾枯。病

濟陽綱目

卷四十一

積聚痞塊 七

日深痼。而不可爲矣。世人不識。但見投熱不熱。誤認
爲沉寒冷痼。而益投之。至死不悟。悲夫。然則治之當
如何。曰。當與從治法。內經曰。熱因寒用。寒因熱用。伏
其所主。先其所因者是也。病音訓。男子有七病。陰按
寒水。筋血氣。孤。陰。張鷟峯云。人之藏府。皆因觸冒。以成疾病。而脾胃最
易受觸。蓋日用飲食。稍或過多。則停積難化。冷熱不
調。則吐嘔泄痢。膏粱者爲尤甚。蓋口腹恣縱。不能謹
飭。近用消化藥。或論飲食既傷於前。難以毒藥反攻。
其後。不復使巴豆。硃砂等藥。止用麴蘖之類。不知古

今立方用藥各有主對。麴蘖止能消化米穀。如肉食有傷。則非硝砂阿魏等藥不能治也。至於魚蟹過傷。則須用橘皮紫蘇生薑。菓菜有傷。則須用丁香桂心。水飲傷。則須用牽牛芫花。固不可一概論也。必審其所傷之因。對用其藥。則無不愈。其間輕重則隨患人氣血以增之而已。又有一等虛人。沉積不可直取。當以蠟匱其藥。蓋蠟能粘逐其病。又可久留腸胃間。又不傷氣能消磨至盡也。又有脾氣偏虛。飲食運化者。止宜助養脾胃。則自能消磨。不須用尅化藥耳。病久

濟陽綱目 卷四十一 積聚病塊 人

成積聚癥瘕者。須用三稜。鱉甲之類。寒冷成積者。輕則附子厚朴。重則礬石硫黃。瘀血結塊者。則用大黃。桃仁之類。醫者宜審用之。宜慎用之。不可大意。又按吳氏曰。伏翼尿。即天鼠之糞也。又名夜明砂。古人治血積。每用水蛭。虫蟲。以其善吮血耳。然其性毒人。多患之。而伏翼尿者。食蚊而化之者也。蚊之吮血。不減蛭虫。故亦可以攻血積。本草稱其能下死胎。則其能攻血塊也。何疑。書此以待同志者用之。可耳。 又按癥者。微也。腹中堅硬。按之應手。曰癥。瘕者。猶假

也。腹中雖硬。而忽聚忽散。無有常處。曰瘕。瘕因傷食。瘕是血生。瘕者在腹內近臍左右。各有一條筋。脉急痛如筋。如指如弦之狀。瘕者。僻側在兩脇之間。有時而痛。曰瘕。夫瘕之與癥。皆陰陽不和。經絡痞隔。飲食停滯。不得宣流。邪冷之氣。搏結不散。得冷則發。作疼痛。故曰瘕。瘕也。 大抵積之初。固為寒。而積之久。則為熱。寒者必凝。熱者必聚。分新久之義。以施治。

脉法

脉經曰。脉來細而附骨者。積也。來在寸口。積在胸中。微出寸口。積在喉中。在關上。積在臍傍。上關上。積在

濟陽綱目 卷四十一 積聚病塊 九

心下。微下關。積在小腸。尺微。積在氣衝。脉出在右。積在右。脉出在左。積在左。脉兩出。積在中央。各以其部處之也。脉來小沉而遲者。脾胃中有積聚。不下。食則吐。肺積。脉浮而毛。按之辟易。心積。脉沉而芤。上下無常處。肝積。脉弦而細。腎積。脉沉而急。脉沉重而中散者。因寒食成積。脉左轉而沉重者。氣癥積在胸中。脉右轉出不至寸口者。肉有肉瘕也。又曰。左手脉洪。瘕在左。右手脉洪。瘕在右。頭大者在頭。小者在下。脉遲而滑。中寒。有瘕結。偏得洪實。

而滑為積，弦緊亦為積，為寒痺，為疝痛。內有積，不見脈難治。見一脈相應為易治，諸不相應為不治。

脈弦腹中急痛，腰背痛，相引腹中，有寒疝瘕。脈弦緊而微細者，瘕也。夫寒痺瘕瘕積聚之脈皆弦緊。若在

心下，即寸弦緊，在胃脘，即關弦緊，在臍下，即尺弦緊。脈弦小者寒痺。診人心腹積聚，其脈堅強急者

生，虛弱者死。脈弦而伏者，腹中有瘕，不可轉也，必死不治。

脈訣舉要曰：胃痞脈滑為有皮結，弦伏亦痞滿，則氣滯陽綱目。卷四十一 積聚病晚 十

氣肝積肥氣，弦細青色。心為伏梁，沉扎色赤。脾積痞氣，浮大而長，其色脾土。中央之黃，肺積息賁，浮毛色

白。奔豚屬腎，沉急而黑。五藏為積，六府為聚，積在本位，聚無定處。其脈浮牢小而沉實，或結或伏，為聚為

積。實強者生，沉小者死。生死之別，病同脈異。脈理提綱曰：鬱脈沉澹，積脈弦堅。

○通治一切積聚方一

仙方香鼓丸

破痞癰消瘕塊及冷積

木香 丁香 並不見火 京三稜 酒浸 青皮 白

枳殼 川練子 茴香 炒各

莢 凡一兩切酒浸一宿，將三稜莢同去壳巴豆三十粒同炒，巴豆黃色去巴豆不用。

右為細末，醋糊丸如桐子大，用硃砂為衣，每服五十丸，用姜湯或鹽湯溫酒不拘時任下。

荆蓬煎丸 治瘕瘕痞癰冷熱積聚宿食不消，嘔吐辛酸，久服通利三焦，升降陰陽，順氣消食。

京三稜 二兩酒浸冬達莢 二兩切醋浸冬三日以去壳巴豆二十個銀器內炒令黃色去豆不用。木香 火 枳殼 炒

青皮 去 茴香 炒 枳榔 各一

濟陽綱目 卷四十一 積聚病晚 土

右為細末，姜糊為丸，如豌豆大，每服三五十丸。

白湯或生姜湯下，食遠服。

香稜丸 治五積六聚氣塊

三稜 義木 炮或 青皮 陳皮 枳殼 炒

枳實 炒 蘿蔔子 炒 香附子 黃連 神麴 炒

麥芽 炒 鱉甲 炙 乾漆 炒煙盡 桃仁 杏仁

綱砂 歸尾 木香 甘草 炙各 枳榔 兩

山查 兩

右為細末，醋糊丸如桐子大，每服三五十丸，白

湯下

磨積三稜丸

治連年近日諸般積聚癖症

氣塊或氣積酒積諸般所傷無問男子婦人老幼

並宜服之

木香

麥牙 京三稜

炮 莪朮

枳殼

石三稜

杏仁 葛根

乾漆

雞爪三稜

黑牽牛

白牽牛

官桂

丁香 香附子

縮砂

青皮

陳皮

濟陽綱目

卷四十一

積聚癖塊 主

右為末醋糊丸如桐子大每服二十九生姜湯

下食後溫水下亦得日二服病大者四十日消

木香通氣丸

治疰瘵氣滯心腹痞滿嘔逆

咳嗽順氣消痰進飲食消痞

人參

木香 玄胡索

陳皮 枳殼

黑牽牛

丁香

三稜

莪朮

半夏

茴香

木通

神麴

麥牙

青皮

右為末水糊丸如小豆大每服三四十丸姜湯

下食後日二服

元胡索丸

治吐利腹脹心腹痛癥瘕氣結

心煩不安順三焦和脾胃

元胡索

當歸 青皮

雄黃

木香

枳殼 京三稜

右為末入雄黃末水糊丸如桐子大每服六

七十九丸姜湯下

大阿魏丸

去諸積

南星

半夏

山查

神麴 麥牙

濟陽綱目

卷四十一 積聚癖塊 主

黃連

連翹

阿魏

瓜蒌仁 風化硝

貝母

石礬

胡黃連

白芥子

蘿蔔子

蒸

右為末姜汁浸炊餅為丸如桐子大每服三十

丸白湯下

一方加香附蛤粉治嗽

白芥子

治男婦食積死血痰積成塊在兩

脇動作腹鳴嘈雜眩暈身熱時作時止

白芥子

蘿蔔子

山梔

川芎 三稜

菝葜

桃仁

香附

山查

神麴

青皮五錢

黃連

一兩半 一半用吳茱萸水炒 一半用砂仁水炒

右爲末蒸餅爲丸如桐子大每服七八十九白

湯下

千金不換內消丸

專治積聚氣壅胸膈膨

脹肚腹飽滿心助緊束等證

蒼朮

半斤米浸 浸去皮

枳殼一兩半溫水浸炒 青皮水浸去穢

三稜

醋煮 去毛 蓬莪醋煮 去毛 香附炒去毛 大茴香炒

乾漆

醋炒 烟盡 藿香洗去土 陳皮各一兩 厚朴姜炙

砂仁

炒去皮 破故紙各一兩 二錢 猪牙皂角去皮

濟陽綱目

卷四十一

積聚癰塊

商

黑牽牛

各二兩 去皮 草菓一兩 去皮 百草霜一兩

右十七味爲細末麵糊爲丸如桐子大每服七

十九量人稟氣飲食厚薄加減臨臥好酒或茶

清或鹽湯白湯任下或不拘時照依前丸數湯

引服之暫得一二時間便食飯飲酒自覺肚腹

內寬快不分多寡服並無肚腹嚮洩有健體扶

陽之益及治小兒五六歲已上飲食停滯飽滿

便用十數丸已上增添咬碎用茶清米湯送下

服之即愈此丸男女皆可服惟孕婦不可服

破積導飲丸

治內有積塊堅硬飲食不消

心下痞悶

木香

枳榔 青皮白

陳皮白

枳殼炒

枳實炒

莪朮炒

京三稜炮

半夏湯洗

神麴炒

麥牙炒

茯苓

乾姜

澤瀉

甘草

炙各五錢 牽牛頭末六錢

巴豆三十枚去油

皮心膜另研

右爲細末入巴豆霜令勻生薑汁打麵糊爲丸

如桐子大每服三十九丸姜湯下食前

莪朮潰堅湯

十一

治中滿腹脹內有積塊堅硬

濟陽綱目

卷四十一

積聚癰塊

五

如石令人坐臥不安

半夏

泡七次 黃連各六分

當歸稍

厚朴

黃芩各五分

莪朮

神麴各三分

甘草生三分

益智仁七分

紅花

橘皮去白

升麻各二分

柴胡

澤瀉

吳茱萸各三分

青皮二分

如虛湯加葛根二分

右咬咀都作一服水二盞先浸藥少時煎至

一盞去粗稍熱服食前忌酒濕麵

○治寒積方二

大七氣湯十二 治五積六聚狀如癥瘕隨氣上

下發作有時心腹疼痛上氣壅塞小腹脹滿大小便不利

益智 陳皮去 蓬莖 京三稜 青皮去

桔梗去 香附去 藿香葉 肉桂各一錢半

甘草去

右作一服用水二鍾生姜三片煎至一鍾食前

服

枳殼散十三 治五種積氣三焦痞塞胸膈滿悶

清陽綱目 卷四十一 積聚癥瘕 六

嘔吐痰逆口苦吞酸常服順氣寬中除痰癖消積

聚

枳殼炒 益智 陳皮 京三稜 莪朮 枳櫟

肉桂各一錢 肉豆蔻 厚朴 青皮去

木香不見火 乾姜各五分 甘草炙五分

右作一服水二鍾生姜三片紅棗二枚煎至一

鍾不拘時服

散聚湯十四 治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下

發作有時心腹絞痛攻刺腰脇小腹脹服大小便

不利

半夏湯泡七次 枳櫟 川歸各四錢 陳皮 桂心

杏仁去皮尖 茯苓各一錢 甘草 附子炮去

川芎各五錢 枳殼去 厚朴去 吳茱萸各一錢半

大便不利加大黃酒浸一錢

右作一服入生姜三片水煎食遠服 薑按此

方名散聚者所以散六府之聚氣耳蓋中氣之

道熱則施張施張弗聚也寒則收引收引則氣

斯聚矣故桂心附子吳茱萸辛熱之品也半夏

清陽綱目 卷四十一 積聚癥瘕 七

陳皮辛溫之品也川芎當歸杏仁辛潤之品也

辛則能散聚熱則能壯氣溫則能和中潤則能

澤六府乃茯苓甘草之甘平可以使之益胃而

枳櫟枳殼厚朴大黃則皆推陳之品故曰散聚

流氣九十五 治五積六聚癥瘕塊癖留飲以上

之疾皆係寒氣客搏於腸胃之間久而停留變成

諸疾此藥能消導滯氣通和陰陽消舊飲雖年高

氣虛亦宜服之

木香 川茴香炒 紅橘皮去 菖蒲 青皮去

蘿葡子

莪朮

枳殼

補骨脂

神麴

枳殼

華澄茄

縮砂

麥藥麴

牽牛

兩半

右為末水糊丸如桐子大每服五十丸細嚼白

豆蔻仁一枚送下食後

鷄爪三稜丸

治五藏痰癖氣塊年深者一

月取效

鷄爪三稜

石三稜

京三稜

木香

青皮

陳皮

枳殼

肉豆蔻

濟陽綱目

卷四十一 積聚痞塊

大

右為細末生姜汁打麵糊為丸如桐子大每服

二十九生薑湯下空心臨臥各一服忌一切生

礪砂煎丸

消磨積塊痼癖一切凝滯老人

虛人無妨

黑附子

木香

草撥

礪砂

破故紙

紙微炒

右將飛過礪砂未封在附子盆內却用剗出附

子末盡口用和成白麵裹約半指厚慢火灰內

燒勻黃色去麵用木香等為細末却用元嬰附

子熟黃麵為末醋調煮糊為丸如桐子大每服

十五丸至三十九生薑湯送下此藥內有奇功

勝紅丸

治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安

治之

陳皮

莪朮

青皮

三稜

乾姜

良姜

香附子

濟陽綱目

卷四十一 積聚痞塊

丸

右為末醋糊丸如桐子大每服二十九生薑湯

送下

治癥丸

治丈夫女人小兒年深日近沉積

痼塊面色青黃時上搶心吐水吞酸舌生白沫婦

人積年月經不調漸成血氣或血蠱塊中焦之間

覆如杯碗連年累月漸成痼瘕寒熱往來一切脾

胃受寒久不瘥愈之疾並皆治之

巴豆

蓬朮

京三稜

厚朴

丁香皮

木香

丁香

厚朴

石菖蒲_{二兩} 良姜_{一兩} 宦蟲_{炒一兩半} 川牛膝_{一兩}

香附子_{四兩} 石蓮子_{二兩} 薏苡仁_{一兩}

史君子_{三兩} 主壳

右爲細末稀麵糊爲丸如菉豆大積年癥瘕成

塊者第一服用熱水下二十九粒自後每日三九

五九更量虛實加減與之五日去盡積塊若近

脾胃有積者每服五九米飲吞下一服取效

婦人血氣成塊及血瘕每服二十九粒用蘇木酒

童子小便各一半煎五七沸令溫空心吞下自

濟陽綱目 卷四十一 積聚癥瘕 手

後每日用溫酒下三九其血塊逐旋消從大小

便去盡 自知小兒疳蟲腹痛不能忍日夜叫

喚百藥不救者陳皮湯下七九立效諸蟲皆宜

下常服或白湯或姜湯下三五九 中酒及酒

積犬便鮮臭者白湯與酒各半吞十九立效如

神 一切咽塞心下硬痛皆用薑湯下五九不

拘時候

木香三稜九_{二十}

治一切氣悶胸膈痞滿榮衛

不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化脇肋疼痛無

問久新並皆治之

青木香 破故紙 茴香 黑丑 甘遂 芫花

大戟 京三稜 莪朮 川練子 葫蘆巴

巴戟_{各一兩} 巴豆_{去皮心不} 陳倉米_{二合與巴}

砂仁_{一兩}

右細切用好米醋二升除砂仁木香外餘藥入

醋中浸一宿入鍋內煮醋乾盡爲度同木香砂

仁爲細末醋麵糊爲丸如菉豆大每服五九或

七九食後服看虛實大小加減九數隨湯水任

濟陽綱目 卷四十一 積聚癥瘕 手

下

○治熱積方三

硝石九_{又名消塊九} 二十一 治癥瘕痞塊當先下此藥

不令人困須量體虛實又治帶下絕產

硝石_{六錢} 大黃_{八錢} 人參 甘草_{各三錢}

右各爲末用陳醋三升置磁器內先納硝黃不

住手攪煮候將乾却下參甘二末和勻爲丸如

桐子大每服三十九米湯下四日一服候下如

鷄肝米泔惡物赤黑色等效下後忌風冷軟粥

將息

醋煮三稜九二十二 治一切積聚不拘遠年近日

治之神效

京三稜四兩醋煮透 川芎二兩醋煮

大黃半兩醋煮過

右為末醋糊為丸如桐子大每三十九溫水下

不拘時病甚者一月效小者半月效

神功助化散二十三 治男子婦人腹中痞塊不拘

氣血食積所成此方之妙不可盡述

濟陽綱目卷四十一 積聚痞塊 圭

地扁蓄五錢 瞿麥穗五錢 大麥牙五錢 神麴二錢半

沉香 木香各半錢 甘草五分 大黃二兩

右為細末淨依分兩和勻男以甘草浸竹葉二

味等分煎湯及無灰酒同調服酒多於湯婦人

用紅花燈心當歸等分煎湯及無灰酒同調服

酒多於湯忌油膩動氣之物及房事一月藥須

用黃昏服大小便見惡物為度神妙非常誓不

輕傳匪人

聖散子二十四 治遠年積塊及婦人乾血氣

礞砂六兩 大黃八兩 麥牙六兩 乾漆燒過 椿蓄

茴香炒 枳榔各一兩

如婦人乾血氣加川山甲二兩炮

右為細末每服三錢溫酒調下仰臥此藥只在

心頭至天明大便如魚腸小便赤為驗取出並

無毒有神效小兒用一錢十五已上五錢空心

服之更效

遇仙丹二十五 治邪熱上攻疫涎壅滯番胃吐食

十膈五噎胸哈酒積蟲積血積氣塊諸般痞積瘡

濟陽綱目卷四十一 積聚痞塊 圭

熱腫痛或大小便不利婦人女子面色痿黃鬼注

癥瘕誤吞銀鉄銅物悉皆治之此藥有積去積有

蟲去蟲不傷元氣亦不損傷藏府功效不能盡述

白牽牛半生半熟 白枳榔一兩 茵陳五錢

蓬朮五錢 三稜五錢 牙皂五錢炙

右為細末醋糊為丸如棗豆大每服三錢五更

時用冷茶下天明可看去後之物數服行後隨

以溫粥咬之忌食他物胸音响鼻息也哈音噴以口飲飲也

木香和裏丸二十六 消腸胃中積聚癥瘕癖塊宣

暢三焦開利胸膈主治氣逆上攻心胸脇肋脹滿
痞痛四肢六脉拘急身體困倦潤大便利小便和
脾氣進飲食

木香去腐 沉香 枳殼去穢 蓬莪朮去皮

青皮去穢 陳皮白 當歸酒浸 黃芩去腐 木通去皮

黃連去鬚 白豆蔻 三稜去皮 牙皂連子

郁李仁去皮各一兩 大黃蒸四兩 縮砂半兩

黃柏去粗皮 香附去毛各三兩 牽牛末二兩或四兩

右爲末水丸如桐子大每服一錢半加至三錢

濟陽綱目 卷四十一 積聚痞塊 雷

生姜湯下或茶酒亦得不拘時候

通玄二八丹 二十七 治積聚止泄痢除拘急之妙

藥

黃連半斤 芍藥 當歸 生地酒炒 烏梅各五錢

右爲末用雄猪肚一個以藥盛於內以線縫之

用韭菜二斤鋪底面於鍋內蒸之候湯乾再添

候蒸一日以藥熟爲度就猪肚共用石杵春搗

之藥爛爲丸如桐子大每服七十丸如治積聚

侵晨用姜湯服之稍瀉一二次卽除以溫粥補

住之如治渴痢飯後用茶清服之卽止此丸以
姜湯服之則行以茶清行之則止 積聚卽肚
腹飲食宿滯等疾

宣毒丸 二十八

大黃 青皮 陳皮 蒼朮 當歸去頭各一兩

黑牽牛四兩

右爲末煮蘿蔔丸如桐子大每服五十丸溫水

臨臥下米粥補之

全真丸 二十九 治三焦氣壅結痞心胸大便秘

濟陽綱目 卷四十一 積聚痞塊 韋

傷寒下證已服承氣不利服此安穩而通

川大黃 南枳殼炒 枳榔 黑牽牛半生半熟各半兩

右爲細末滴水爲丸如桐子大每服五七十丸

米飲下

解毒枳榔丸 三十 治男子婦人嘔逆酸水疲涎

不利大便膿血口苦煩燥涕唾稠粘嗽血血崩腹

脹氣滿手足痿弱四肢無力酒疸食黃口舌生瘡

寒熱往來瘧疾腸風痔瘻癰疽血積諸惡瘡疔疽

並皆治之 瘰音屈腫也入瘡也亦作漏疔音丁病創

枳榔 黃連 青皮 陳皮 木香 沉香

巴戟去心酒浸 當歸 白木 枳殼 香附子炒

甘草炙 大黃各二錢半 黃柏七錢半 牽牛末一兩

右爲細末滴水爲丸如桐子大每服七十九羹湯下

取積丹 三十一

用好大黃不以多少爲末用好醞醋煮膏子爲丸如桐子大每服一百丸量虛實大小休喫晚飯用好墨研濃好酒送下次日見膿

濟陽綱目 卷四十一 積聚痞塊 美

○治暴積方 四

大承氣湯 三十二 丹溪云一人年六十素好酒八

月間因暑熱中得疾兩足冷遍膝上脘有塊如掌牽引脇痛不可眠臥飲食減半却不渴診之六脉俱沉瀉而小按之不爲弱皆數而右爲甚大便秘如常小便赤色遂用大承氣湯減大黃之半而熱炒加黃連芍藥川芎乾葛甘草作湯下瓜萸仁半夏黃連貝母丸至十二貼足冷退至脘塊減半遂止藥至半月飲食復舊諸證悉除

承氣湯方見傷寒等門

杉木湯 三十三 柳宗元纂救死方元和十二年二

月得脚氣夜半痞絕脇有塊大如石且死因大寒不知人三日家人號哭榮陽鄭詢美傳杉木湯服

半食頃大下二三氣通塊散

杉木節一大升無葉以皮代之 大腹枳榔七個

右合一處搗碎用童便三大升共煮取一升半

入二服若一服得快利停後服

肘后方 三十四 治卒暴癥腹中有如石刺痛

濟陽綱目 卷四十一 積聚痞塊 幸

用牛膝一大把並葉酒煮飲之

一方 三十五 治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死

取葫蘆根一小束洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿煖溫服五合至一升日三若欲速得服於熱腹中溫令藥味出服之此方無毒神效

右四方所謂暴積急去之如塊除後必用補劑以救其受攻之傷也

○治久積方 五

萬病紫苑丸 三十六 療臍腹久患痞癥如碗大及