

吳

鞠

通

方

歌

吳鞠通方歌目錄

溫病名目解

治病法論

方目

並附卷首

溫病

風溫
冬溫

溫熱

溫疫

統在此類

溫毒

斑疹

發黃

暑溫

伏暑

濕溫

寒濕

喉咽

呃逆

嘔

咳

飲症

腫脹

疝瘕

霍亂
乾霍亂

癰

痢

黃疸

痺

血症

不卧

大便

小便

秋燥

調經

吳鞠通方歌卷首

南海黃任恆秩南編

溫病名目解

焦上



溫病者有風溫有溫熱有溫疫有溫毒有暑溫

有濕溫有秋燥有冬溫有溫瘧

風溫者初春陽氣始開厥陰行令風夾溫也

溫熱者春末夏初陽氣弛張溫盛爲熱也

溫疫者厲氣流行多兼穢濁家家如是若役使然也

溫毒者諸溫夾毒穢濁太甚也

暑溫者正夏之時暑病之偏於熱者也

濕溫者長夏初秋濕中生熱即暑病之偏於濕也
秋燥者秋金燥烈之氣也

冬溫者冬應寒而反溫陽不潛藏民病溫也
溫瘧者陰氣先傷又因於暑陽氣獨發也

治病法論

雜論

治外感如將

兵貴神速機圓法活去邪務盡善後

治內傷如相

生鈔蓋早半一日則人少受一日之

如羽

非輕不與

治中焦如衡

非平不安

治下焦如權

非重不沈

治上焦

方目此書數用之方特標其目繫以所在症類使易檢查其一處獨用者則不復摘錄於

此省繁贅也

銀翹散

溫病上焦五

五苓散

腫脹末

白虎湯

溫病上焦七

益胃湯

溫病中焦十二

桂枝湯

飲症下焦卅三

理中湯

霍亂末

葛根湯

病症末

桃花湯

大便秘下焦廿二

清宮湯

溫病上焦十六

清營湯

暑溫上焦三十

清絡飲

暑溫上焦廿七

烏梅圓

痢症下焦七二

小定風珠

溫病下焦十五

大定風珠

溫病下焦十六

白頭翁湯

痢症中焦九九

人參白虎湯

溫病上焦八

三甲復脈湯

溫病下焦十四

補中益氣湯

痢症末

犀角地黄湯

血痢上焦十一

調胃承氣湯

大便下焦廿三

加減瀉心湯

痢症下焦七五

吳鞠通方歌一卷

南海黃保康霄鵬著

姪任恆秩南校注

溫病

上焦太陰為病脈不緩不緊而動數或兩寸獨大尺膚熱頭痛微惡風寒身熱自

汗口渴或不渴而咳午後熱甚者名曰溫病○

案

風溫溫熱溫疫冬溫諸病治法大畧相同故

統括在此而名之曰溫病其餘溫毒暑溫濕溫秋燥溫瘧與及諸雜病不能通治者則皆分類

別列於後

上焦

五

初溫竹桔芥銀翹葦薄甘牛豆豉調

太陰溫病服桂枝湯

風寒已解祇餘溫病銀翹散主之方用連翹銀花各壹兩桔梗薄荷牛旁子各六錢甘草淡豆豉各五錢

竹葉芥穗各四錢共研為散胸悶須憑香鬱散屺成每用六錢鮮葦根煎湯服

還取栝茅消杏仁又可咳中進花粉應從渴上澆膈

悶者加藿香屈金各三錢血衄者去芥穗豆豉加茅根側柏炭梔子炭各三錢咳者加杏仁渴甚加花粉熱漸趨中生地麥黃芩梔子亦堪邀二三日病猶在肺熱漸入裏加生地麥冬以補津液尚不解或小便短再加知母黃芩梔子

七 舌黃面赤脈浮洪大汗大渴 宜 白虎湯 攻之方知

母石膏以退熱 粳米以補是也 **八** 脈芤汗湧仗參功

脈浮大而芤大汗微喘甚至鼻孔煽者宜前方加人參此名人參白虎湯

九 太陰溫病舌絳乾熱在營中仔細看惟有清營湯

最合黃連擲去莫輕餐寸脈大舌絳而乾法當渴今反不渴者熱在營中也清營

湯去黃連主之

十 元參蓮子並用心犀角冬翹及竹針太陰溫病不可發汗發汗

而至神昏譫語者清宮湯主之方用連心麥冬元參
心各三錢竹葉捲心連翹心犀角尖各二錢蓮子心
五痰盛萸皮或竹瀝再逢熱毒仗銀金熱痰盛加竹
瀝梨汁各五
匙略痰不清加括萸皮錢半熱毒盛加金汁人中
黃漸欲神昏加銀花三錢荷葉二錢菖蒲壹錢

中焦

陽明溫病脈促浮竹葉石膏用最優更借麥冬

甘草力驅邪出表病焉廋

脈浮而促者熱勢甚急減
味竹葉石膏湯主之方用

竹葉五錢石膏八錢麥冬
六錢甘草三錢分三次服

下後汗來貴復陰麥冬生地與沙參冰糖玉竹同

煎服

此名益
胃湯

潮熱何愁咳勢沈

下後汗出陰液受傷
當復胃陰此方主之

不然恐成乾
咳身熱之證

下後無汗脈竟浮銀翹甘竹地冬傳

下後邪氣還
表欲作汗而

未能其脉浮者銀翹湯主之方用銀花五錢連翹三錢竹葉二錢甘草壹錢麥冬生地各四錢若是浮洪須白虎人參加入治洪芤若脉浮而洪熱熾津亡白虎湯主之脉洪且芤金受火克元氣不支人參白虎湯主之

固下後無汗脉不浮人中參地麥知收下後無汗脉不浮而數邪

之未解可知但既下又無連下之理宜清燥湯以增水敵火方用麥冬生地各五錢知母二錢人中黃壹

錢五分元參三錢煎分三次服咳嗽加桑葉牛子參梨牡蠣休

咳嗽膠痰加參牡蠣牛旁子各三錢桑葉壹錢五分梨汁半酒杯

固下後數日再下方丹皮知母及大黃元參麥冬細

生地此方名是護胃承氣湯下後數日熱不退或退不盡口燥咽乾舌苔乾黑或

金黃色脉沈有力者邪氣復聚於胃也須再通其裏但正氣日虛陰津日耗宜加意防護此方主之

下焦**八**復脈阿膠並地黃冬麻甘芍合成方加減復脈湯方用炙

甘草生地白芍各六錢留心麥冬五錢阿膠麻仁各三錢分三次服**再**加龍牡名救

逆心震舌塞主之良前方去麻仁加龍骨四錢牡蠣八錢名救逆湯溫病誤表津劫

神昏心震舌強自汗中無所主者主之

一脈虛大手足心熱於手足背者邪久羈陽明或已下或未下身

熱面赤口乾齒黑脈虛大手足心躁盛者溫病已汗

而不得汗已下而熱不退六七日外脈尚躁盛者重與復脈湯**六**結代者誤用升

代甚則脈兩至者重與汗下**七**後口燥咽乾神倦欲

眠舌赤苔老俱宜加減復脈湯

三若脈沈數手指蠕動舌乾齒黑者熱邪深入下焦急防痙厥