

傷寒來蘇集

上海棋盤街
文瑞樓印行



傷寒論註卷之三

南陽 張機 仲景原文

慈谿 柯琴 韻伯編註

崑山 馬中驥 駢北較訂

陽明脈證上

陽明之為病胃家實也

陽明為傳化之府。當更食更虛。食入胃實而腸虛。食下腸實而胃虛。若但實不虛。斯為陽明之病根矣。胃實不是陽明病。而陽明之為病。悉從胃實上得來。故以胃家實為陽明一經之總綱也。然致實之由。最宜詳審。有實於未病之先者。有實於得病之後者。有風寒外熱不得越而實者。有妄汗吐下重亡津液而實者。有從本經熱盛而實者。有從他經轉屬而實者。此口舉其病根在實。而勿得以胃實即為可下之證。按陽明提綱。與內經熱論不同。熱論重在經絡病為在表。此以裡證為主。裡不和即是陽明病。他條或有表證。仲景意不在表。或兼經病。仲景意不在經。陽明為闔。凡裡經不和者。又以闔病為主。不大便固闔也。不小便固闔也。不能食。食難用飽。初欲食反不能食。皆闔也。自汗出。盜汗出。表開而裡闔也。反無汗。內外皆闔也。種種闔病。或然或否。故提綱獨以胃實為正。胃實不是。竟指燥屎堅硬口對下利言。下利是胃家不實矣。故汗出解後。胃中不和而下利者。便不稱陽明病。如胃中虛而不下利者。便屬陽明。即初硬後溏者。總不失為胃家實也。所以然者。陽明太陰同處中州。而所司各別。胃司納故。以陽明主實。脾司輸故。以太陰主利。同一胃府而分治如此。是二經所由分也。

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

陽明主裡而亦有外証者有諸中而形諸外非另有外証也胃實之外見者其身則蒸蒸然裡熱熾而達於外與太陽表邪發熱者不同其汗則濺濺然從內溢而無止息與太陽風邪為汗者不同表寒已散故不惡寒裡熱閉結故反惡熱口因有胃家實之病根即見身熱自汗之外証不惡寒反惡熱之病情然此但言病機發現非即可下之証也宜輕劑以和之必譏語潮熱煩燥脹滿諸証兼見纒為可下

四証是陽明外証之提綱故胃中虛冷亦得稱陽明病者因其外証如此也

陽明病脈浮而緊者必潮熱發汗有時但浮者必盜汗出

陽明脈証與太陽脈証不同太陽脈浮緊者必身疼痛無汗惡寒發熱不休此則潮熱有時是惡寒將自罷將發潮熱時之脈也此緊反入裡之謂不可拘緊則謂寒之說矣太陽脈但浮者必無汗今盜汗出是因於內熱且與本經初病但浮無汗而喘者不同又不可拘浮為在表之法與脈浮緊但浮而不合麻黃証身熱汗出而不是桂枝証麻桂下咽陽盛則斃耳此脈從經裏非脈從病反要知仲景分經辨脈勿專據脈証証

傷寒三日陽明脈大

脈大者兩陽合明內外皆陽之象也陽明受病之初病為在表脈但浮而未大與太陽同故亦有麻黃桂枝証至二日惡寒自止而反惡熱三日來熱勢太盛故脈亦應其象而洪大也此為胃家實之正脈若小而不大使屬少陽矣

內經云陽明之至短而濇此指秋金司令之時脈又曰陽明脈象大浮也此指兩陽合明之病脈

脉浮而大。心下反鞕。有熱。屬藏者。攻之。不令發汗。屬府者。不令溲數。溲數則大便硬。汗多則熱愈。汗少則便難。脉遲尚未可攻。

此治陽明之大法也。陽明主津液。所生病。津液乾則胃家實矣。津液致乾之道有二。汗多則傷上焦之液。溺多則傷下焦之液。一有所傷。則大便硬而難出。故禁汗與溲。夫脉之浮而緊。浮而緩。浮而數。浮而遲者。皆不可攻。而可汗。此浮而大。反不可汗。而可攻者。以為此陽明三日之脉。當知大為病進。不可拘浮為在表也。心下者。胃口也。心下硬。已見胃實之一証。以表脉不當見裡証。故曰反硬耳。有熱屬藏。是指心。肺有熱。不是竟指胃實。攻之。是攻其熱。非攻其實。即與黃芩湯微其熱之義也。不令者。禁止之辭。便見瀉心之意。上焦得通。津液自下。胃氣因和。且屬府指膀胱。亦不指胃。膀胱熱。故溲數。不令處亦見當滋陰之義矣。屬府是陪說。本條重在藏熱。汗多何。直接發汗句來。蓋汗為心液。汗出是有熱屬藏之徵也。所以不令發汗者何。蓋汗出多。津液亡。而火就燥。則愈熱而大便難。即汗出少。亦未克便硬而難出。故利於急攻耳。仲景治陽明不患在胃家實。而患在藏有熱。故急於攻熱。而緩以下其實。禁汗與溲。所以存其津。正以和其實耳。然証有虛實。脉有真假。假令脉遲。便非藏實。是浮大皆為虛脉矣。仲景特出此句。正發明心下硬一証。有無熱屬藏者。為妄攻其熱者禁也。其慎密如此。

陽明病。心下硬滿者。不可攻之。攻之利遂不止者。死。利止者。愈。

陽明証具。而心下硬。有可攻之理矣。然硬而尚未滿。是熱邪散漫。胃中尚未乾也。妄攻其熱。熱去寒起。移寒於脾。實及或虛。故利遂不止也。若利能自止。是其人之胃不虛。而脾家實。腐穢去盡。而邪不留。故愈。上條熱既屬藏。利於急攻。所以存津液也。此條熱邪初熾。禁其妄攻。所以保中氣。

也要知腹滿已是太陰一班陽明太陰相配偶胃實則太陰轉屬於陽明胃虛則陽明轉屬於太陰矣此仲景大有分寸處診者大宜着眼

傷寒嘔多雖有陽明証不可攻之

嘔多是水氣在上焦雖有胃實証只宜小柴胡以通液攻之恐有利遂不止之禍要知陽病津液未亡者慎不可攻蓋腹滿嘔吐是太陰陽明相關証胃實胃虛是陽明太陰分別處胃家實雖變症百出不失為生陽下利不止參附不能挽回便是死陰矣

陽明病自汗出若發汗小便自利此為津液內竭大便雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土水根及與大猪膽汁皆可為導

本自汗更發汗則上焦之液已外竭小便自利則下焦之液又內竭胃中津液兩竭大便之硬可知雖硬而小便自利是內實而非內熱矣蓋陽明之實不患在燥而患在熱此內既無熱只須外潤其燥耳連用三自字見胃實而無變証者當任其自然而不可妄治更當探苦欲之病情於欲大便時因其勢而利導之不欲便者宜靜以俟之矣此何以故蓋胃家實固是病根亦是其入病根禁攻其實者先慮其虛耳

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此必大便秘故也以亡津液胃中乾燥故令大便硬當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

治病必求其本胃者津液之本也汗與溲皆本於津液本自汗出本小便利其人胃家之津液本多仲景提出亡津液句為世之不惜津液告者也病差指身熱汗出言煩即惡熱之謂煩而微知

惡熱將自罷以尚不了。故大便硬且數少。即再行之謂大便硬小便少皆因胃亡津液所致。不是陽盛於裡也。因胃中乾燥則飲入於胃不能上輸於肺通調水道下輸膀胱故小便反少而游溢之氣尚能輸精於脾津液相成還歸於胃胃氣因和則大便自出更無用導法矣。以此見津液素盛者雖亡津液而津液終自還正以見胃家實者毋躊躇顧慮示人以勿妄下與勿妄汗也。歷舉治法脈遲不可攻心下滿不可攻嘔多不可攻小便自利與小便數少不可攻總見胃家實不是可攻証。

蜜煎方 蜜七合

右一味於銅器內煎凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中欲大便時乃去之。

猪膽汁方 大猪膽一枚瀉汁加醋少許以灌穀道中如一食頃當大便出宿食惡物甚效。

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也。答曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也。

陽明受病當二三日發上條是指其已發熱言此追究一日前未發熱時也。初受風寒之曰尚在陽明之表與太陽初受時同故陽明亦有麻黃桂枝証一日來表邪自罷故惡寒止熱微故汗自出而反惡熱。兩陽合明之象見矣。陽明病多從他經轉屬此因本經自受寒邪胃陽中寒邪即退反從熱化故耳。若因無津液而轉屬必在六七日來不在一二日間。本經受病之初其惡寒雖與太陽同而無頭項強痛為可辨。即發熱汗出亦同。太陽桂枝証但不惡寒反惡熱之病情是陽明一經之樞紐。本經受邪有中面中膈之別。中面則有目疼鼻乾邪氣居高即熱反勝寒寒邪未能一日遽止此中於膈部位近於胃故退汗最捷。

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也
太陽病八九日尚有惡寒証若少陽寒熱往來三陰惡寒轉甚非發汗溫中何能自罷惟陽明惡
寒未經表散即能自止與他經不同始雖惡寒二日語意在陽明句中向上夫知陽明之惡寒易
止便知陽明為病之本矣胃為戊土位處中州表裡寒熱之邪無所不歸無所不化皆從燥化而
為實實則無所復傳此胃家實所以為陽明之病根也

右論胃實証

問曰太陽緣何而得陽明病答曰太陽病若發汗若下若利小便亡津液胃中乾燥因轉屬陽明胃
實大便難此名陽明也

此明太陽轉屬陽明之病因有此亡津液之病機成此胃家實之病根也○按仲景陽明病機其
原本經脈篇主津液所生病句來故雖有熱論中身熱鼻乾等語總歸重在津液上如中風之口
苦咽乾鼻乾不得汗身目黃小便難皆津液不足所致如腹滿小便不利水穀不別等症亦為液
不化使然故仲景諄諄以亡津液為治陽明者告也

陽脈微而汗出少者為自和也汗出多者為太過陽脈實因發其汗出多者亦為太過太過為陽實
於於裏亡津液大便因硬也

陽明主津液所生者也因妄汗而傷津液致胃家實且桂枝症本自汗自汗多則亡津麻黃症本
無汗發汗多亦津此雖指太陽轉屬然陽明表症亦有之

本太陽病初得時發其汗汗先出不微因轉屬陽明也微止也即汗出多之互辭
傷寒轉屬陽明者其人濇然微汗出也

此亦汗出不止之互辭。概言傷寒不是專指太陽矣。

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出漉漉然者是轉屬陽明也。

胃實之病機在汗出多。病情在不能食。初因寒邪外束故無汗。繼而胃陽遽發故反汗多。即嘔不能食時可知。其人胃家素實與嘔乾不同。而反汗出則非太陽之中風。是陽明之病實矣。

太陽病寸緩關浮尺弱其人發汗熱出復惡寒不嘔。但心下痞者。此以醫下之也。如不下者。病人不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必硬。不大便十日無所苦也。渴欲飲水者。少與之。但以法救之。宜五苓散。

此病機在渴。以桂枝脈症而兼渴。其人津液素虧可知。小便數則非消渴矣。以此知大便雖硬。是津液不足。不是胃家有餘。即十日不便而無痞滿便硬之苦。不得為承氣証。飲水利水。是胃家實而脈弱之正治也。不用猪苓湯。用五苓散者。以表熱未除故耳。此為太陽陽明之併病。餘義見五苓証中。

傷寒脈浮緩手足自溫者。繫在太陰。太陰者。身當發黃。若小便利者。不能發黃。至七八日大便硬者。為陽明病也。

太陰受病。轉屬陽明者。以陽明為燥土。故非經絡表裡相關所致。總因亡津液而致也。此病機在小便利。小便不利。是津液不行。故濕土自病。病在肌肉。小便利。是津液越出。故燥土受病。病在胃也。

客曰。病在太陰。同是小便利。至七八日暴煩下利者。仍道太陰病。大便硬者。轉為陽明病。其始則同。其終則異。何也。曰。陰陽異位。陽道實。陰道虛。故脾家實則腐穢自去。而從太陰之開胃。

家實則地道不通而成陽明之闔此其別也

右論他經轉屬証

問曰脉有陽結陰結何以別之答曰其脉浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也十日當劇其脉沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結也期十四日當劇

脉以浮為陽為在表數為熱為在府沈為陰為在裡遲為寒為在藏証以能食者為陽為內熱不能食者為陰為中寒身輕者為陽重者為陰不大便者為陽自下利者為陰此陽道實陰道虛之定局也然陽証亦有自下利者故陰証亦有大便硬者實中有虛虛中有實又陰陽更盛更虛之義故胃實因於陽邪者為陽結有因於陰邪者名陰結耳然結陽能食而不大便陰結不能食而能大便秘何以故人身腰以上為陽腰以下為陰陽結則陰病故不大便陰結則陽病故不能食此陽勝陰病陰勝陽病之義也凡三候為半月半月為一節凡病之不及太過斯皆見矣能食不大便者是但納不輸為太過十七日劇者陽主進又合乎陽數之奇也不能食而硬便仍去者是但輸不納為不足十四日劇者陰主退亦合乎陰數之偶也脉法曰計其餘命生死之期期以月節越之內經曰能食者過期不能食者不及期此之謂也

此條本為陰結發論陽結即是胃實為陰結作伴耳陰結無表証當屬少陰不可以身重不能食為陽明應有之証沈遲為陽明當實之脉大便硬為胃家實而不敢用溫補之劑也且陰結與固瘕穀疸有別彼澹而不便是虛中有實此硬而有便是實中有虛急須用參附以回陽勿淹留期至而不救○右論陰陽結証

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯

陽明病。脉浮。無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。

此陽明之表証表脉也。二証全同太陽而屬之陽明者。不頭項強痛故也。要知二方專為表邪而設。不為太陽而設。見麻黃症即用麻黃湯。見桂枝証即用桂枝湯。不必問其為太陽陽明也。若惡寒一罷。則二方所必禁矣。

陽明病。脉浮而緊者。必潮熱發作有時。但浮者。必盜汗出。

上條脉証與太陽相同。此條脉証與太陽相殊。此陽明半表半裡之脉証。麻桂下咽。陽盛則斃耳。故善診者必據証辨脉。勿據脉談証。全註解見本篇之前。

脉浮而遲。面熱赤而戰惕者。六七日當汗出而解。遲為無陽。不能作汗。其身必痒也。

此陽明之虛証虛脉也。邪中於面而陽明之陽上奉之。故面熱而色赤。陽併於上而不足於外。衛寒邪切膚。故戰惕耳。此脉此症。欲其惡寒自止。於二日間不可得矣。必六七日胃陽來復。始得汗出。溱溱而解。所以然者。汗為陽氣。遲為陰脉。無陽不能汗。更可以身痒驗之。此又當助陽發汗者也。

陽明病。法多汗。反無汗。其身如虫行。皮膚中此久虛故也。

陽明氣血俱多。故多汗。其人久虛。故反無汗。此又當益津液和營衛。使陰陽自和而汗出也。

陽明病。反無汗而小便利。二三日嘔而欬。手足厥者。必苦頭痛。若不欬不嘔。手足不厥者。頭不痛。

小便利則裡無痰熱可知。二三日無身熱。汗出惡熱之表。而即見嘔欬之裏。似乎熱發乎陰。更手

足厥冷。又似病在三陰。然若頭痛。又似太陽之陰証矣。然頭痛必因欬嘔厥逆。則頭痛不屬太陽。欬嘔厥逆。則必苦頭痛。是厥逆不屬三陰。斷乎為陽明。半表半裡之虛証也。此胃陽不敷。布於四

肢故厥不上升於額顱故痛緣邪中於膈結在胸中致嘔欬而傷陽也當用瓜蒂散吐之嘔欬止厥痛自除矣兩者字作時字看更醒

陽明病但頭眩不惡寒故能食而咳其人必咽痛若不欬者咽不痛

不惡寒頭不痛但眩是陽明之表已罷能食而不嘔不厥但欬乃是欬為病本也咽痛因於欬頭眩亦因於欬此邪結胸中而胃家未實也當從小柴胡加減法

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

此邪中於面而病在經絡矣液之與血異名而同類津液竭血脈因之而亦傷故陽明主津液所生病亦主血所生病陽明經起於鼻榮於口齒陽明病則津液不足故口鼻乾燥陽厥則陽絡傷故血上溢而為衄也口鼻之津液枯涸故欲漱水不欲嚥者熱在口鼻未入乎內也能食者胃氣強也以脈浮發熱之証而見口乾鼻燥之病機如病在陽明更審其能食不欲嚥水之病情知熱不在氣分而在血分矣此間而知之也

按太陽陽明皆多血之經故皆有血証太陽脈當上行營氣逆不循其道反循顱而下至目內眥假道於陽明自鼻額而出鼻孔故先目瞑頭痛陽明脈當下行營氣逆而不下反循齒環唇而上循鼻外至鼻額而入鼻故先口燥鼻乾異源而同流者以陽明經脈起於鼻之交額中旁納太陽之脈故也

二條但言病機不及脈法主治宜桃仁承氣犀角地黃輩

○右論陽明在表脈証

傷寒四五日脉沈而喘滿沉為在裡而反發其汗津液越出大便為難表虛裡實久則譫語

喘而胸滿者為麻黃証然必脉浮者病在表可發汗脉沉為在裡則喘滿屬於裡矣反攻其表

則表虛故津液大泄喘而滿者滿而實矣因轉屬陽明此譫語所由來也宜少與調胃汗出為表

虛然是陪話歸重口在裡實

發汗多若重發汗者亡其陽譫語脉短者死脉自和者不死

上條論譫語之由此條論譫語之脉亡陽即津液越出之互辭心之液為陽之汗脉者血之府也

心主血脉汗多則津液脱營血虛故脉短是營衛不行藏府不通則死矣此譫語而脉自和者雖

津液妄泄而不甚脱一惟胃實而營衛通調是脉有胃氣故不死此下歷言譫語不因於胃

譫語直視喘滿者死下利者亦死

上條言死脉此條言死証蓋譫語本胃實而不是死証若譫語而一見虛脉虛証則是死証而非

胃家實矣藏府之精氣皆上注於目目不轉睛不識人藏府之氣絕矣喘滿見於未汗之前為裡

實見於証語之時是肺氣已散呼吸不和故喘而不休脾家大虛不能為胃行其津液故滿而不

運若下利不止是倉廩不藏門戶不要也與大便難而譫語者天淵矣

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲重語也

同一譫語而有虛實之分邪氣盛則實言雖妄誕與發狂不同有莊嚴狀名曰譫語正氣奪則虛

必目見鬼神故鄭重其語有求生救死之狀名曰鄭聲此即從譫語中分出以明譫語有不因胃

實而發者更釋以重語二字見鄭重之謂而非鄭重之音也若造字出於喉中與語多重覆叮囑

者不休等義誰不知其虛仲景烏庸辨

陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之譫然汗出則愈血室者肝也肝為藏血之臟故稱血室女以血用事故下血之病最多若男子非損傷則無血下之病惟陽明主血所生病其經多血多氣行身之前陽明熱盛侵及血室血室不藏溢出前陰故男女俱有是証血病則魂無所歸心神無主詰語必發要知此非胃實因熱入血室而肝寔也肝熱心亦熱熱傷心氣既不能主血亦不能作汗但頭有汗而不能遍身此非汗吐下法可愈矣必刺肝之募引血上歸經絡推陳致新使熱有所洩則肝得所藏心得所主魂有所歸神有所依自然汗出週身血不妄行詰語自止血按蓋血使膿血總是熱入血室入於腸胃從肛門而下者謂之便血膿血蓋女子經血出自子宮與溺道不同門男子精血溺三門內異道而外同門精道由腎血道由尿水道由膀胱其源各別而皆出自前陰

期門肝之募也又足太陰厥陰陰維之會太陰陽明為表裡厥陰少陽為表裡陽病治陰故陽明少陽血病皆得刺之

婦人中國發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門

人之十二經脈應地之十二水故稱血為經水女子屬陰而多血脈者血之府也脈以應月故女子一月經水溢出應時而下故人稱之為月事也此言婦人適於經水來時中於風邪發熱惡寒此時未慮及月事矣病從外來先解其外可知至七八日熱除身涼脈遲為愈乃反見胸脇苦滿而非結胸反發詰語而非胃實何也脈遲故也遲為在藏必其經水適來時風寒外來內熱乘肝月事未盡之餘其血必結當刺其募以瀉其結熱滿自消而詰語自止此通因塞用法也

婦人傷寒發熱經水適來晝則明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上下焦必自愈

前言中風此言傷寒者見婦人傷寒中風皆有熱入血室証也然此三條皆因譫語而發不重在熱入血室更不重在傷寒中風要知詰語多有不因于胃者不可以詰語為胃實而犯其胃氣也發熱不惡寒是陽明病申酉詰語疑為胃實若是經水適來固知熱入血室矣此經水未斷與上條血結不同是肝虛魂不安而妄見本無實可瀉固不得妄下以傷胃氣亦不得刺之令汗以傷上焦之陽刺之出血以傷下焦之陰也俟其經盡則詰語自除而身熱自退矣當以不治治之熱入血室寒熱如瘧而不詰語者入柴胡証

○右論陽明詰語脉証

陽明脉証下

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹滿小便難也

本條無目疼鼻乾之經病又無尺寸俱長之表脉微喘惡寒脉浮而緊與太陽麻黃証同口苦咽

乾又似太陽少陽合病更兼腹滿又似太陽少陽兩感他經形証互呈本經形証未顯何以名為

陽明中風耶以無頭項強痛則不屬太陽不且聾目赤則不屬少陰不腹滿自利則不關太陰是

知口為胃竅咽為胃門腹為胃室喘為胃病矣今雖惡寒二日必止脉之浮緊亦潮熱有時之候

也此為陽明初病在裡之表津液初虧故有是証若有腹滿為胃實而下之津液既竭腹更滿而

小便難必大便反易矣此中風轉中寒胃實轉胃虛初能食而致反不能食之機也傷寒中風但

見有柴胡一証便是則口苦咽乾當從少陽症治脉而緊者當曰弦矣

陽明中風脉弦浮大而短氣腹部滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉弦浮者與小柴胡湯脉但浮無餘証者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

本條不言發熱看中風二字便藏表熱在內外不解即指表熱而言即暗伏內已解句病過十日是內已解之互文也當在外不解句上無餘証句接外不解句來刺之是刺足陽明隨其實而瀉之少差句言內能俱減但外証未解耳非刺耳前後其腫少差之謂也脉弦浮者向之浮大減少而弦尚存是陽明之脉証已罷惟少陽之表邪尚存故可用小柴胡以解外若脉但浮而不弦大則非陽明少陽脉無餘証則上文諸症悉罷是無陽明少陽証惟太陽之表邪未散故可與麻黃湯以解外所以然者以陽明居中其風非是太陽轉屬即是少陽轉屬兩陽相熏灼故病過十日而表熱不退也無餘証可憑表熱不解法當瀉脉故弦浮者可知少陽轉屬之遺風但浮者是太陽轉屬之餘風也若不尿腹滿加噦是接耳前後腫來此是內不解故小便難者竟至不尿腹部滿者竟不減時時噦者更加噦矣非刺後所致亦非用柴胡麻黃後變証也○太陽主表故中風多表証陽明主裡故中風多裡証○弦為少陽脉耳前後脇下為少陽部陽明中風而脉証兼少陽者以膽為風府故也若不兼太陽少陽脉証只是陽明病而不名中風矣參看口苦咽乾知陽中風從少陽轉屬者居多

本條多中風而不言惡風亦不言惡熱要知始雖惡寒二日自止風邪未解故不惡熱是陽明中風與太少不同而陽明過經不留不解之風亦與本經和中迥別也

右論陽明中風証

陽明病若能食名作風不能食名中寒

太陽主表病情當以表辨陽明主裡証雖在表病情仍以裡辨此不特以能食不能食別風寒更以能食不能食審胃家虛實也要知風寒本一體隨人胃氣而別此條本為陽明初受表邪先辨胃家虛實為診家提綱使其着眼處不是為陽明分中風傷寒之法也

陽明病若中寒不能食小便不利手足濇然汗出此欲作固瘕必大便初硬後溏所以然者以胃中冷水穀不別故也

胃實則中熱故能消穀胃虛則中寒故不能食陽明以胃實為病根更當以胃寒為深慮耳凡身熱汗出不惡寒反惡熱稱陽明病今但手足汗出則津液之洩出外者尚少小便不利則津液不洩於下陽明所虛在亡津液此更慮其不能化液矣

固瘕即初硬後溏之謂肛門雖固結而腸中不全乾也溏即水穀不別之象以瘕瘕作解者謬矣按太陽小腸俱屬於胃欲知胃之虛實必於二便驗之小便利尿定硬小便不利必大便初硬後溏人但知大便硬大便難不大便者為陽明病亦知小便難小便不利小便數少或不尿者皆

陽明病乎

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱必噦

初受病便不能食知其人本來胃虛與中有燥屎而反不能食者有別也噦為胃病病深者其聲噦矣

若胃中虛冷不能食者飲水則噦

要知陽明病不能食者雖身熱惡熱而不可攻其熱不能食便是胃中虛冷用寒以徹表熱便是

攻非指用承氣也。傷寒治陽明之法利在攻。仲景治陽明之心全在未可攻。故諄諄以胃家虛實相告耳。

陽明病脈遲腹滿。食難用飽。飽則微煩。頭眩。必小便難。此欲作穀疸。雖下之。腹滿如故。所以然者。脈遲故也。

陽明脈浮而弦大為中風。若脈遲為中寒。為無陽矣。食難用飽。因於腹滿。腹滿因於小便難。煩眩又因於食飽耳。食入於胃。濁氣歸心。故煩。虛陽不能化液。則清中清者不上升。故食穀則頭眩。濁中清者不下輸。故腹滿而小便難。胃脘之陽不達於寸口。故脈遲也。金匱曰。穀氣不消。胃中苦濁。濁氣下流。小便不通。身體盡黃。名曰穀疸。當用五苓散調胃利水。而反用茵陳湯下之。腹滿不減。而除中發噦所由來矣。所以然者。蓋遲為在藏。脾家實則腐穢自去。食難用飽者。脾不磨也。下之則脾家愈虛。不化不出。故腹滿如故。

傷寒脈遲六七日。而反與黃芩湯徹其熱。脈遲為寒。今與黃芩湯復除其熱。腹中應冷。當不能食。今反能食。此名除中。必死。

凡首揭陽明病者。必身熱汗出。不惡寒反惡熱也。此言傷寒則惡寒可知。言徹其熱則發熱可知。脈遲為無陽。不能作汗。必服桂枝湯啜稀熱粥。令汗生於穀耳。黃芩湯本為協熱下利而設。不為脈遲表熱而設。今不知脈遲為裡寒。但知清表之餘熱。熱去寒起。則不能食者為中寒。反能食為為除中矣。除中者。胃陽不支。假穀氣以自救。凡人將死而反強食者是也。

陽明病初欲食。小便反不利。大便自調。其人骨節疼。翕然如有熱狀。奄然發狂。濇然汗出而解者。此水不勝穀氣。與汗共併。脈緊則愈。