

金斗居士

印

本草從新  
坤

杏仁

果部  
味類  
五果  
肺解  
肌潤燥

山果

夷果

蘇果

水果

夷果  
水果

辛苦甘溫而利有小毒。瀉肺降氣行痰，解肌除風，散寒利胸膈，氣逆通大腸。氣秘東坦曰：杏仁下喘治氣，桃仁潤腸，相表裏，竇門在上，澀門在下，為氣之通道，故並以陳皮佐之。○杏仁善潤並能解肺鬱，利小便，潤燥消積，棗豆粉則爛治時行頭痛，上焦風燥，欬逆，上氣，抄研密丸含噙，煩熱喘促其毒性，又能殺蟲，治瘧制錫毒，狗毒消狗肉積，因虛而欬，便閉者忌之。雙仁者殺人，去皮尖炒研發散，連皮尖研得火良，生薑根、黃芩、黃柏、杏子駁熟，有小毒，慎以孕婦忌。

巴旦杏仁

潤肺

甘平止欬下氣，消心腹逆悶。

有濕痰者勿服，以其性潤也。

形扁皮白

大瓣如鷄

嘴者

真形

黃皮真者

仁皆潤

○凡仁皆潤

○杏仁皆潤

○杏仁出山東

烏梅

酸肺

河南不入藥

酸澀而溫，脾肺血分之果。瀉腸，斂肺，酸收急食。○止血涌痰，消腫解毒，生津止渴。時珍曰：梅花子冬而寢于夏，得為乙未人，舌下有四竅，兩通膽液，故食酸則津生。○酿酒殺虫，治久嗽，瀉痢，血痢尤良。○梁莊肅公血痢，陳應之用烏梅胡黃連，灶下土等，鹽梅肉一枚研爛，含臍。○瘡瘍霍亂吐逆，反胃，下血，崩安，蛇厥，蛇虫上攻而眩，一日減半，兩日而平。病有當發表者，大忌酸收，誤食必為害。

青梅黃裏為烏梅，指灰斗牀蒸則肥澤不露。○大納入下部，產安吉者肉厚多脂，最佳。合溪者次之。長沙梅福，建梅肉薄無脂，不堪用。○齒齦即易開，若用鉗器攤開，恐傷其齒，驚癇喉痺，梅核少時即通。

白梅

酸澀

平功

用

堅

什牙

齒齦

閉

取肉揩擦牙齦，涎出即關益酸，先入筋驚癇喉痺，梅核。

膈氣取半青半黃梅子每個用鹽一兩淹一日夜晒乾又浸又晒至水盡乃止用青錢三個夾二梅麻線繩縛定通裝磁罐內封埋地下百日取出每用一枚含之喫汁入喉即消收一年者治一人收二年者治二人神效  
敷乳癰腫毒刺入肉中搗爛罨之即出瘡中搗肉搗餅貼之即收刀箭傷敷搗敷血多食損齒傷筋過食而齒齦者嚼胡桃肉以解之

鹽漬為白梅取大青梅以鹽汁漬之日晒夜清十日成矣久乃上霜故又名鹽梅○衣

根葉治休息痢及

霍亂煮濃汁飲之

桃仁寫破血潤燥

苦平微甘苦以泄血滯甘以緩肝氣而生新血成無己曰肝者血之源血聚則通大腸血祕治熱入血室衛血燥血瘀損傷積血血痢經閉欬逆上氣血和則皮膚燥癢肌有發熱如狂若小腹滿痛小便氣降若非血瘀而誤用之

大傷陰氣

泡去皮去炒研碎雙仁者有毒不可用香附為使妊娠後陰腫挑仁搗研傳之俱妙婦人陰癰桃仁杵爛綿裹塞之

桃花通大

告平下宿水除痰飲消積聚利二便療風狂蘇頹杜陽編載范純佑女喪夫發狂閉之室中夜斷宵

儒門事親載一婦滑濁數年百治不效或言此傷飲有積也桃花落時以棟針刺取數十萼勿犯人

手以趁相作餅煨熟食之未數日下不一二時渴下如傾六日行至数百行昏困惟飲涼水而平

以攻決為

用但可使於氣實有餘之證若無故而因除百病美頤色諸謬說而服之為害不小

三月三日採花揀淨以絹

袋盛縣簷下陰乾千葉者勿用

桃葉宜發汗

凡傷寒風癆發汗不出以火燒地用水洒之布乾桃葉於上厚二三寸

采嫩者名桃

心入藥尤勝

桃子辛酸甘熱微毒多食令人有熱生癰癥有損無益五果列桃為下以此與蘿同食患心痛服者尤忌之

桃島是桃子在樹經冬不

落者正月採之苦微溫有小毒辟邪祛祟

白毛頭瘡桃乾一兩黑丑一合為末臘豬脂調搽

栗栗膾

鹹溫厚腸胃補腎氣能解羊瘧

小兒不可多食生則難化熟則滯氣小兒疳瘡生嚼栗子殼之

大棗調營衛和百藥

甘溫補中益氣滋脾土潤心肺調營衛緩陰血生津液悅顏色通九竅助十二經和百藥傷寒及補劑中加用之以發脾胃升騰之氣並與薑 紅棗功用相微差不及爾雖補中而味過於甘中滿者忌之甘令人滿大建中也如脾虛泄瀉之類母多食者指有餘之脾也如寒溼腫脹之類凡用藥者能隨其虛實而變通之雖奉常品味必獲神功苟執而泥之雖有良薑而無之則不知言宜食者指不足之脾莫展其長故學者以格致為亟也 凡風疾痰熱及齒痛皆非所宜小兒疳病亦禁生者尤為不利北產肥潤堅實者佳金華南棗及徽實所產皮薄而皺花紋甚細而可愛味雖甘美而微帶酸且脂少於北棗止嗽止渴烏附毒忌可充寢用皆不堪入藥宏景曰南棗大惡不堪啖蘇頌曰江南出者堅燥少脂不可入藥

魚同食

頻洗取愈○食椒聞氣食走即解

以上五果類

梨涼心潤肺

利大小腸

潤肺寧

甘寒微酸涼心潤肺利大小腸丹溪曰梨者利也下行之謂也 止嗽消痰清喉降火生之可清六腑之熱熟之可滋五臟之陰定火宜生虛火宜熟除煩解渴潤燥消風人知其清火消痰醒酒解毒經流曰晉梁之家厚味濁酒縱肆無節必多痰火 中風失音鵝汁細服聖惠方梨汁煮切片貼湯火傷 脾虛泄瀉乳婦及金瘡忌用鵝汁用熬膏亦良加姜汁蜜佳清痰止嗽與茶服相間收藏則不爛

柿  
潤肺寧

利大小腸

潤肺寧

生用甘冷潤肺止嗽破氣胃理焦煩乾柿甘寒而濡潤腸止油潤肺寧嗽而消宿血治肺痿熱咳產寶云產後欬飲咯血反胃有人三世病反胃至終以 腸風下血痔漏肺與大腸相表裏臟清則肺熱亦除方柿乾同飯常食不飲水愈 治之患惟教食梨能轉重為輕變危為安治傷寒發熱熱嗽痰喘中風失音鵝汁細服聖惠方梨汁煮切片貼湯火傷 脾虛泄瀉乳婦及金瘡忌用鵝汁用熬膏亦良加姜汁蜜佳清上焦心肺之熱為尤佳治咽喉口舌瘡痛 柿性頤寒肺經無火及風寒作嗽冷痢滑泄者忌之若與蟹同食令人腹痛作瀉 柿蒂止呃逆古方單用取其苦溫降氣濟生加了香生姜取其開鬱散痰亦從治之法

木瓜  
和脾舒筋

舒筋

酸澀而溫和脾理胃斂肺伐肝化食酸能斂飲則止渴酸能收氣滯能和調營衛利筋骨筋急者得之即化與山楂同生津氣脫能收氣滯者得之即舒筋緩者遇之

**即利去濕熱消水脹治霍亂轉筋** 都傷脾胃清濁不分揮霍擾亂上吐下瀉甚則肝木乘脾而筋為之轉也時珍曰屬陽明木瓜治轉筋取其理脾以伐肝也上病則木良而木盛故用酸熟養脾胃所致轉筋必起於足腓腓及宗筋皆溫以收脾胃之耗散而藉其走筋以平肝邪乃土中潤木以助金也瀉痢腳氣脾主四肢或寒濕傷于足絡或至足則脚氣成惡寒發熱狀類傷寒第腫脹掣痛為異爾宜利濕清熱忌用補劑及淋洗昔腰足無力多食損有患足脾者乘舟見舟中一袋以足倚之比及登岸足已善步矣詢袋中何物乃木瓜也

**齒及骨病癰瘍**

酸收太甚鄭真一曰木瓜乃酸澀之品世用治水腫腹脹誤矣有大僚舟過金陵愛其芬馥購數

撤去此物溺即出矣不必用藥也

于是盡投江中頃之溺即如舊

陳者良忌鉄反花痔瘡木瓜為末以鱗魚身上延調貼之

以布護住○辟除蠭蟻木瓜切片鋪于席上

## 山楂

古字作楂○瀉破

氣消食化痰散瘀

**酸甘微溫健脾行氣消食磨積**

善去腥羶油膩之積與參牙消穀積者不同凡老雞硬肉投數枚則易爛其消肉積可知

散瘀化痰發小兒痘疹行乳食停

留止兒枕作痛

瘀積于太陰少腹作

痛沙糖調服

療小腸疝氣香

服山楂即解一

破氣也

胃中無積及脾虛惡食者忌服

有大小二種小者入藥一名棠梨子去皮核

核亦有用化食

不相宜者

**橘皮**

宜理氣調中

瀉燥濕消痰

**辛能散溫能和苦能燥能瀉為脾肺氣分之藥**

脾為氣母肺為氣籥凡用補藥

主潔古日陳皮枳殼利

散皮膚

氣雖中和亦損真元無帶勿用

健脾順氣為

通藥則去白去白名橘紅

桑能陰寒發表皮能發

散皮膚

氣雖中和亦損真元無帶勿用

廣產為勝皮厚不脆有滑

棕紋

福建產者名建皮力薄浙江

陳久者良故又名陳皮

陳則逆氣消無燥散之患半

夏亦然故同用○二陳湯

治痰欬嗽便浸晒治痰積

**薑汁炒入下佳鹽水炒化**

用川陳皮消疾甚靈然消之太峻不宜

輕用況此物真者絕少無非柚皮而已

**青皮**

瀉肝破氣消積

破氣消積

辛苦而溫色青氣透入肝膽氣分疏肝瀉肺凡爲氣药

引諸药至厥陰之分柴胡疏上焦肝氣

下飲食入太陰之

倉破滯削堅消痰散痞治肝氣鬱積腸病多怒火瘡結癥

入肝散邪入脾除痰氣逆心痛乳腫丹毒曰乳房

屬陽明乳頭

疏利清脾散以之為君胸膈氣逆心痛乳腫丹毒曰乳房

屬陽明乳頭

疏利清脾散以之為君胸膈氣逆心痛乳腫丹毒曰乳房

屬陽明乳頭

疏利清脾散以之為君胸膈氣逆心痛乳腫丹毒曰乳房

屬陽明乳頭

疏利清脾散以之為君胸膈氣逆心痛乳腫丹毒曰乳房

屬陽明乳頭

疏利清脾散以之為君胸膈氣逆心痛乳腫丹毒曰乳房

屬陽明乳頭

疏利清脾散以之為君胸膈氣逆心痛乳腫丹毒曰乳房

屬陽明乳頭

屬厥陰乳母或因怒懶悶厚味釀結致厥陰之氣不行故發不出陽明之血勝沸故熱甚而化濃或因其子王再加石膏清胃熱桂皮消腫甘草節解毒歸如沒藥桔梗金銀花蒲公英皂角刺當歸皆可隨宜用之少佐以酒火則凹陷名乳岩不可治矣英皂角刺當歸皆可隨宜用之少佐以酒火則凹陷名乳岩不可治矣

忌用性頗猛烈人年少壯未足躁暴及火為桂皮如人至老年烈性漸減經久而為陳皮則多寒暑躁氣全消也橘之青而未黃者古方無用者宋以去瓢切片醋拌炒陳皮升浮入肺脾治高青皮沈降入肝膽治低炒之以醋所謂肝欲散急食辛以散之以酸泄之以苦降之也

橘始與陳皮分用能入厥陰行肝氣葉治乳癰腸癰肺癰皆能入厥陰行肝氣

肉生痰聚氣生痰聚氣表裏之異如此

核治疝痛腰腎冷痛去皮炒

香櫞下氣消食

平苦酸溫入肺脾二經理上焦之氣而止嘔進中州之食而健脾除心頭痰水治痰氣欬嗽煮酒心下氣痛性雖

中和草用多用亦損正氣須與參朮並行乃有相成之益爾陳久者良根葉功用畧同

香櫟快膈化痰

苦甘酸辛而平下氣消食快膈化痰解酒毒治飲酒人口氣去腸胃中惡氣散憤懣之氣療妊婦不思食口淡愈

痰氣欬嗽用香櫟去核切砂瓶內浸酒封固一夜煮爛蜜拌勻時時含嚥能去濁惡之氣無滯而虛者禁之孕婦氣虛者勿與此柚之膚也其黃而小者為蜜橘其大者謂之朱櫟其最大者謂之香櫟今人誤稱為香圓不知香圓即佛手柑也香櫟夏初生白花六月盛實至冬黃熟今人於六七月間採其小實晒乾至十月為枳實枳殼

花紅即林檎

酸澗甘溫生津治消渴潤精水利小兒閃癖頭髮豎黃瘰疬瘦弱者乾末和醋傅

多食發熱閉百脈

枇杷葉禹肺下氣

苦平清肺和胃而降氣氣下則火降痰消氣有餘便是火大則生痰治熱欬嘔逆口渴時珍曰大降痰消則嘔者不嘔逆者不啜身如火瘡飢瘦將成勞以把枇杷葉欬冬紫苑桑皮木通杏仁等分大黃減半蜜丸櫻桃大食後夜卧各含化一丸未終劑而愈虛寒嘔吐風寒欬嗽忌之葉濕重一兩乾

重三錢為氣足拭淨毛毛射肺今人致治胃病薑汁塗灸黃治肺病蜜水塗灸黃逆除上佳熟潤五臟多食發瘧熱傷脾同炙肉及熟鰐食令人發熱黃疾

楊梅和利五臟生津

酸甘溫去痰止喘消食下氣生津和利五臟能治腸胃除煩憤惡氣燒灰服斷下痢甚驗多食令人發熱衄血損齒及筋急生蘿同食發瘡致瘻杭州蘇州最美青時酸紅後變紫味如蜜鹽感蜜清糖收火酒浸佳樹生癟  
釘之即除根皮鮮研毒燒灰油調塗湯火傷

石榴皮瀉腸收脫肛

外用染鬚

酸瀉而溫能瀉腸止泄痢下血嫩末崩帶脫肛以石榴皮陳壁土加明礬少許濃煎薰服

烏鬚方綠雲油中用之

能緩腸成瘀痢積未盡者服之太早反為害也

忌鐵器

酸石榴治瀉痢崩中帶下

遇食損肺壞齒 榴花十葉者治心熱吐血又研末吹鼻止衄血立效亦敷金瘡出血

銀杏一名白果○瀉

甘苦收瀉熟食溫肺益氣色白屬金故入肺

定痰哮斂喘嗽縮小便止帶濁帶濁亦者熱傷血分從心小腸來白者濕傷

而帶濁者宜二味加升柴二味生食降濁解酒消毒殺虫

花夜間人不得見性陰漿澤手面浣油膩時珍曰去濁疾有小毒故能消毒殺虫

收瀉太過令人壅氣脹脹小兒發驚動疳

胡桃補命門

利三焦

味甘性熱肉潤皮瀉肺定喘固腎瀉精今藥中脂一木一火大補下焦胡桃屬木破故帝屬火有木大相生之妙古云黃柏無知母破故帝無胡桃猶水母之無胞之物三焦指分治之部而言為藏精係腎中央系著于脊下通二腎上通心肺貫腦為生命之原相火之生精氣之府人物皆有之人生生物皆由此出

內經所謂七節之旁中有一節也。難經說石門門高出生氣調肺脾心水脈陰言則起於肺利諸病三佳通利故上而虛寒喘嗽洪濤有疾疾晚對上論以胡桃三枚姜三片附時膏服即飲湯後嚼桃姜如人參胡桃湯服之食明日去喘復作仍連皮用信宿皮而唇蓋皮能飲肺也○同薑白姜茶搗頭發汗散寒下而腰脚虛痛內而心腹諸痛外而瘡脰諸毒皆可除也動風痰助腎火肺有痰熱命門火熾者勿服潤燥養血去皮殼濡速皮油者有毒故殺虫治瘡穀外青皮

### 麝油烏鵲鬚

棗益氣

甘平調中開胃益氣力寃腸胃令人不飢健行久留最易油壞以上山果類

荔枝核宣散  
寒熱

甘瀉而溫散滯氣辟寒邪治胃脘痛婦人血氣痛假存性五錢杏仁一兩為丸每服二錢益其宣散結而核肖羣丸也故治癰傷卵腫有逐氣形之義假存性酒調服加茴香青皮各炒為末酒服亦良無寒濕滯氣者勿服燒存性荔枝甘酸熟鮮煩渴止呃逆荔枝七个連皮核燒存性多食令人煩熱營溼齦腫齶血病溢及火病人尤忌之殼發痘瘡又解荔枝熱生荔枝多食則醉以殼浸水解之此花皮根喉腫痛煎汁令噙

龍眼肉  
補心

荔枝核  
宣散

甘平潤補心長智益智悅胃培脾療健忘興怔忡能安神而熟寐一切思慮過度勞傷心脾及血不歸脾諸證脾

湯用為向導者五味入口甘先歸脾也凡心脾傷而血耗致有健忘怔忡驚悸及吐血崩漏風下血等症歸脾湯能引血歸脾而主補之○道家用龍眼肉細嚼待津液生和津泊而噙此即服玉泉法也

橄欖  
清肺

甘瀉酸平清肺開胃下氣降煩生津解酒利咽喉解諸毒河豚毒煮佳及魚骨硬煮汁核王治與橄欖同凡解毒及治諸魚骨哽如無橄欖即以核磨汁或研末急流水調服亦效仁甘平而潤唇吻燥痛研爛敷之腎陰癟種核荔枝核山楂核等分燒存性研末每服二錢空心齒香湯調下

甘瀉而平殺虫小兒黃瘦有虫者宜食之 治痔消積 丹溪曰此肺家果也多食引火入肺大腸受傷 反緣豆好食茶葉面苦者勿食

海松子閏

甘溫而香潤肺開胃散水氣除諸風治肺燥欬嗽膏和熟蜜半兩收之 大便虛祕同柏子仁麻子仁等分研便溏精滑者勿與有濕痰者亦禁

檳榔鳥氣行水

破脹攻堅

苦溫破滯辛溫散邪濁心中至高之氣使之下行性如鐵石能墮諸約至於下極攻擊去脹消食行疾下水除風醒酒殺虫治痃癖癰結瘡癰瘍利水腫脚氣心者尤須用之 童便薑汁溫酒調服 大小便氣祕裡急後重或同木香調氣或同黃芩枳殼寬腸 墜諸氣至於下極氣虛下陷者所當遠避肩胛以檳榔末茶搗泄 雜心尖長破之作錦紋者良陰毛生蟲即忌火肺耳出體檳榔末吹之得丹降忌火從臍起者檳榔末醋調敷之

大腹皮渴下氣

通行水

辛泄肺溫和脾下氣寬胸行水通大小腸治水腫腳氣痞脹痰癰瘡霍亂 稍涉虛者勿用 取皮酒洗黑豆湯再洗搗鳥多棲其根用 子辛溫溫與檳榔同功而力稍緩形亦與檳榔相似腹大而扁故又名大腹皮

枳棋子一名木蜜一名木鴟一閏解酒

木鴟一名

甘平止渴除煩潤五臟解酒毒

葛根解酒而發散不如枳棋震亨曰一男子因飲酒發熱又兼房勞加葛根于補氣血藥中一貼微汗反倦怠熱如故知氣血虛不宜葛根之散也必得枳棋方可入即愈

多食發蛇虫 實拳曲如雞距故俗名經霜葉亦甚甘 木皮治五痔和五臟

落花生潤肺

補脾

辛甘而香潤肺補脾和平可貴 出閩廣藤生花落地而結實故名 炒用 以上夷果類

川椒

一名蜀椒○宣散寒濕燥故名

辛大熱有毒入肺發汗散寒治風寒欬嗽入脾暖胃燥濕消食除脹治心腹冷痛吐瀉辟痢飲水腫人右腎命

門補火治腎氣上逆能下行導火歸元陽氣冲精溲數陰汗有人令氣入陰囊腫滿痛閼欲死以布裹椒厚半寸包通經除癥安蛔虫聞椒則伏凡虫咬腹痛大通日再易以消為度或以桂末塗亦良破血

火良有寒濕者宜之陰虛火旺之人在所大忌丹溪曰食椒既久則火勞虫通血脉消癰婢行肢節利機關命門

閉口者能殺殺微炒去汗搗去裡面薑殼取紅用名椒得益良醫杏仁為健良雄黃附子防風款冬涼水麻仁中其

用涼水麻仁幾解之

人仁幾解之

椒目通行

苦辛小毒瀨行水道不行散道消水滯除脹定喘 根辛熟殺蟲煎湯洗脚氣及濕瘡

秦椒俗名花椒○宣散寒燥濕溫中

消痰

辛甘溫有毒溫中散寒燥濕除風下氣殺虫治上氣欬嗽吐逆疝瘕風濕寒癖利五臟去老血療久痢月閉腹中冷痛產後餘疾惡血痢腹痛 桂皮修治俱同川椒 比川椒味短緩低惡苦寒防葵畏雄黃手足心腫風也椒未鹽等分醋和敷

胡椒燥快膈

消痰

辛大熱有毒溫中下氣快膈消痰治寒疾食積腸滑令利陰毒腹痛冒寒吐水牙齒浮熱作痛合果皮殺一切魚肉蠶蕈毒咬傷胡椒嚼封之即不痛劉伯溫多能鄙事方蜈蚣世因快膈嗜之者眾然捐肺走氣動火動血損齒目發瘡痔臘毒必陰氣至足者方可用 舟澄茄即胡椒之大者乃一類二種主治畧同亦易憎上

吳茱萸宣散風寒燥溫疏肝下氣

辛苦大熱有毒疏肝燥脾溫中下氣除濕解鬱去痰殺虫開腠理逐風寒治厥陰頭痛陰毒腹痛在區

酸（俗名醋）亦有吐醋者宜降火清痰用吳茱萸作丸導藥中取苦棗飲十日一發頭痛滿嘔膈食積鴻刷血庫陰病斧腰癥瘕痔瘡風腳氣水腫口舌生瘡為末醋調服足心過衝脈為病氣逆裡急宜此之性雖熱而能引熱下行（段成式酉陽雜俎言椒性善下吳茱萸性上以不盡然宗奭曰此物下行衝脈為病氣逆裡急宜此之性雖熱而能引熱氣甚速東垣曰濁陰不降厥氣上逆賜塞脹滿非吳茱萸不可治也利大腸壅氣下逐後餘血損氣動火昏目發瘡病非寒滯有濕者勿用即有寒濕者亦宜酌量少用開口陳久者良湯泡苦烈汁止嘔黃連水炒治疝鹽水炒治血醣炒熟丹參硝石黑紫石英

茶湯熱清  
神消食

苦甘微寒下氣消食去痰熱除煩渴清頭目得春初生發之氣故多謂清上膈之功湯液云苦寒下行如何是清頭目藜莖曰熱下降則上自清矣醒昏睡能清神以之氣被伐而然解酒食油膩燒炙之毒（與姜等分農圃名姜茶飲治赤白痢苓助陰姜助陽使寒熱平調並能消暑解酒食毒利大小便止頭痛卒頭痛如破非中冷中風由痰厥氣上冲所致名痰厥頭痛薏茶迄飲取吐直吐出膽氣乃已渴而即瘥愈瘡瘍寒胃（農全能引吐消脂最能引吐消脂去油酒後飲茶引入膀胱腎經患消瘦之說此皆語其粗惡苦澀者爾故人薦消釋上品方有利益）芩子搗仁洗衣去油膩以上味類

瓜蒂○宣涌吐

苦寒有小毒陽明胃吐藥能吐風熱痰涎上膈宿食吐去上焦之邪經所謂其高者因而越之在上者洞之木鬱去上焦有形之物則不得舒暢天地交而萬物通矣丹溪曰吐中就有發龍之義子喉痹上曉瘡頭目濕氣喘息水腫黃疸或合赤小豆煎或蜜煎或杏仁水濕熱諸病（續篇云一女子病齁喘不止過道人教取瓜蒂如搗○凡取吐者須天氣清明巳午之時行之今病人隔夜勿食卒病者不抑損胃傷血耗氣奪神上部無邪寢者切勿輕授當吐而胃弱者代以參蘆甜瓜俗名有小毒損陽雖能解暑然夏多食之深秋未有不瓜蒂暑病者下○凡瓜皆令利早晝尤甚）參葉細髮搗汁塗之即生

西瓜熟

甘寒瓜性寒，暴之尤寒，俗言云瓜解暑除煩利便醒酒，止渴清熱。洪忠宣、杜漢紀聞云：有人苦目病或令以西瓜也。多食傷脾助濕，暑症多濕者大忌之。衛生歌云：瓜桃生令宜少食，免致秋來成瘧痢。

### 有寒濕者忌之

甘梗，和中  
潤燥

甘微寒，和中助脾除熱，潤燥消痰止渴，解酒毒利二便。

治大便燥結，外臺方嚼或搗汁服。

胃寒嘔吐，中滿滑瀉勿食。

搗汁（虛耗敗氣口乾涕唾用蔗漿升半青米四合煮粥日食二次極潤心肺）

白沙糖，補和中

甘溫。

蔗漿

火煎成

糖

則溫

補脾緩肝潤肺

和中消痰止嗽

中滿者勿服

助熱傷齒生虫

凝結作餅塊如石者

為石蜜

輕白如霜者

為糖霜

堅白如冰者

為冰糖

湯解之。

紫沙糖，補和血

甘溫。

蔗漿

火煎成

糖

則溫

補脾緩肝

緩肺

和中消痰止嗽

中滿者勿服

助熱傷齒生虫

凝結作餅塊如石者

為石蜜

輕白如霜者

為糖霜

堅白如冰者

為冰糖

湯解之。

蓮子，古名藕實○補心

脾腎

精固腸

功用與白者相仿而稍遜。

和血則紫者

為優。

今產後服之取血和而惡露自行也。

蓮子前鍊成紫黑色

其性較白

沙糖更溫

生胃

火助濕熱

損齒生虫

作湯下

小兒丸散

誤矣。

痘不落

茄沙糖調新汲水

一盃服白湯調亦可

以上

藤類

甘平而濡能交水火而媾心腎，安靜上下君相火邪。古方治心腎不交勞傷白濁有濡精氣厚腸胃治脾泄久痢白濁夢遺，女人崩帶一切血病。大便燥者勿服。去心皮蒸熟，焙乾得枸杞白朮山藥茯苓良。蓮子中青心苦寒清心，去熱眼赤作痛。蓮子末一盞粳米半升煎粥常食

石蓮子，開胃去

濕熱。

苦寒清心，除煩開胃，進食去濕熱，顯治噤口痢。同人參等分用較丹溪人參呻之為梗林濁諸症，無濕熱而虛寒者勿服。蓮

之黑而沈水者。石蓮入水必沈入齒反浮煎鹽人用以試齒浮至頂齒乃可用落田野中者百年不壞人得食之，髮黑不老。今肆中石蓮產廣中樹上其味大苦不宜入藥。杵碎。

果部 甘被

白沙糖 紫沙糖 蓮子 石蓮子

蓮花鬚滿精

甘平而濡畧與蓮子同功清火通腎益血固精烏髮黑鬚夢魂遺精吐崩諸血

小便不利者勿服忌地黃

蕩蕊

藕節瀉止

瀉平解熱毒消瘀血療產後血悶和地黃研汁入熱酒童便飲

止吐衄淋痢一切血證汁

藕熱補血散瘀生涼血散瘀

生用甘寒涼血散瘀產後忌生冷惟藕不忌為能去瘀故也○宋大官作血衄誤落藕皮血遂散漁不凝一人病

血見藕皮漁最不凝止渴除煩解酒毒解毒搗汁熱酒調服治上焦痰熱同梨生地汁煎服小便熱淋等分入蜜溫服傷寒時氣煩渴

燭金瘡傷折箭者藕汁飲多多益善熟搗塗折裂凍瘡潰粉可口煮熟甘平市中所賣熟藕俱

濕瘡甚效

荷葉輕宣升陽散瘀

苦平其色青其形仰其中空其象震盪感少陽甲膽之氣燒飯合藥裨助脾胃而升發陽氣

古枳朮凡用痘

瘡倒瘡者用此發之○僵蚕等分為散瘀血留好血治吐衄崩淋損傷產瘀一切血證洗腎風

荷葉燒飯為丸痘瘡頭面疙瘩腫痛陷寒狀熱散如傷寒酒在三陽末酒服三錢治

遺精極驗東垣曰雷頭風症頭面疙瘩腫痛陷寒狀熱散如傷寒酒在三陽不

升消散耗虛者禁之

蕩蕊古名芙蓉俗名

清暑

甘寒安中消暑止渴解酒多食傷人臟肺損陽氣

若遇食腹脹者可暖薑酒服之即愈

有兩角三角四角之殊以三角四角者王安貧武陵記

為芙蓉角者為蕩蕊花隨月而轉猶葵花之向日

芡實一名雞頭

補脾溌精

甘平而溫補脾固腎助氣滿精治夢遺滑精解暑熱潤毒療脾濁泄澀小便不禁 大小便不利者勿服小兒大小便不利者勿服小兒

宜多食其難消化蒸熟搗粉濁精藥或連穀用

華齊一名烏牛一名地栗○渴熱消食

甘寒而滑消食攻積除膿中實熱治五種噎膈氣噎食噎勞噎是噎膈亦有五憂膈恚膈氣膈熱膈寒膈消渴黃疸血證蠱毒不腹能毀銅汪機曰合銅錢食之則錢化可見為消堅削積之物故能開五膈消宿食也○誤吞銅者同胡桃食即化性極涼濕有冷氣人不可食致腹脹氣滿小兒食多臍下結痛孕婦尤為大忌小兒口瘡用華齊燒存性研末敷之

薤姑通行血

苦甘微寒主治百毒產後血悶攻心破死產難胞衣不出搗汁服一升又下石淋 多食發腸風痔漏崩中帶下脚氣癰風又使人乾嘔損齒失顏色皮肉乾燥華齊葉調拌粉塗癰癩甚良

以上水果類

本草從新卷十一

菜部董辛類 柔滑類 茄菜類

韭散瘀

辛溫微酸溫脾益胃止渴利尿散逆冷助腎補陽固精氣而暖腰膝散瘀血逐停痰入血分而行血治吐衄損傷一切血病搗汁童便和服噎膈反胃胃脫痛能消瘀血停滯在胃口致反胃及胃脫痛治反胃噎膈定用韭汁姜汁牛乳及薑汁致死血留胃中作痛者宜加韭汁桔梗入藥開提氣血鮮姜汁下氣消疾和胃牛乳解熱毒煙燭補虛也有食熱物有腎氣上攻致心痛者宜韭汁和瓦苓散為丸空心茴香湯下解熱毒濕毒狂犬蛇虫毒經曰毒物攻邪五製爲五果爲助五果桃李杏棗也五菜韭薤葱薑薑也大蒜自漢張騫使西域始得種入中國故一名葫葉杵敷之即愈

多食神昏目暗

忌鹽水韭汁日滴三次效漆瘡作瘡韭

韭子補腎

辛甘而溫補肝腎助命門暖腰膝治筋痿遺尿溲精溺血白帶白浮經曰足厥陰病則遺尿思懶無入房太甚發為筋痿及為白

淫蕪子同龍骨桑螵蛸能治諸病以其入腹陰補肝腎命門不足命門者藏精之府也

藏氣曰夢遺漏白母

十粒益

湯下

葱白輕發表和裏

宣通陽和血

辛散而平隱居曰白冷青熱傷寒方中不得用青

仲景白通湯通脈四逆湯並加之以通脈

仲景白通湯通脈四逆湯並加之以通脈

仲景白通湯通脈四逆湯並加之以通脈

疾熱狂陰毒腹痛

陰症厥逆安

脚氣奔豚益目睛白睛

屬肺利耳鳴通二便

時珍曰葱白吹鹽入玉堂中治

小便不通及轉脾危急者極效

氣通則血活氣為

血帥故治吐血衄血便血崩血折傷出血大根研封

止痛無殊

乳癰風瘻通乳安胎合香豉阿

膠治胎動通氣故能解毒殺蟲

肉毒蛇蝎毒瘻瘍大傷

多食令人神昏髮落虛氣上沖

取白連鬚用同蜜食數人

一方寒外痔者先用木

密調服其葉光滑露亦根如蒜取白

涼如病同棗食令人病愈

大椎肉令人病愈

青黛治水病足腫

日三五次炒熟研末

金瘡出血取葱

汁金瘡出血取葱

汁金瘡出血取葱

肉毒蛇蝎毒瘻瘍大傷

多食令人神昏髮落虛氣上沖

取白連鬚用同蜜食數人

一方寒外痔者先用木

密調服其葉光滑露亦根如蒜取白

涼如病同棗食令人病愈

大椎肉令人病愈

青黛治水病足腫

日三五次炒熟研末

金瘡出血取葱

汁金瘡出血取葱

汁金瘡出血取葱

薤白一名葛子

通寢辟惡

泄滯

辛苦溫滑下氣調中散血生肌泄下焦大腸氣滯治泄痢下重

好古曰下重者氣滯也四逆散加此以洩帶按裏

後重有氣虛血虛火熱風燥之不同宜隨證施

執一說胸膈刺痛肺氣喘急取其葉光滑露亦根如蒜

滑泄利之品勿滯無用補虛之說切勿信之

董氏

關格不通敷劑能達下焦消水利大小便切片灼艾灸一切癰疽惡瘍腫核李迅癰疽方論云癰疽者吳勝於用

發泄然後解散初起使用獨頭大蒜切片灸之三壯一易百壯為率但頭項以上切不可灸引氣上更生大禍

蒜即葫○宣

通寢辟惡

泄滯

辛熱有毒開胃健脾消穀化食肉食辟穀驅邪通五臟達諸敷物皆能通竅

尤驗

破癰瘍搘貼殺蛇虫蠶毒治中暑不醒

楊和地黃湯服搘貼足心能引熱下行治鼻衄不止搘納肛門能通

腸治

蒜油調敷破癰瘍搘貼亦妙

殺蛇虫蠶毒治中暑不醒

楊和地黃湯服

搘貼足心能引熱下行治鼻衄不止

搘納肛門能通

腸治

關格不通敷劑能達下焦消水利大小便切片灼艾灸一切癰疽惡瘍腫核李迅癰疽方論云癰疽者吳勝於用

發泄然後解散初起使用獨頭大蒜切片灸之三壯一易百壯為率但頭項以上切不可灸引氣上更生大禍

也史源云有火至八百壯者約艾一節初壞肉不痛直至到好肉方隔至夜大瘍滿背為早頭孔數百則素外出

否則內過五

性熱氣具生痰動大散氣耗血昏目損神伐性

味增寒澤氏以其有陽性毒故絕之也錄形水

以

之

小指大指非掌掌中指為五掌首以北非掌以南指胡荽為五葷佛家以大蒜小蒜與渠  
蒜與渠根忽名忽為五葷然易久也苔蘚山蘚也興渠西域菜即中國萎一說即阿魏也虛弱有熱之人勿勿

沾唇獨頭者佳忌宿

蓬臺一名油菜。

宣散血消腫。

辛溫散血消腫搗貼遊風丹腫孫思邈身及乳癰多食動疾發瘡子功用畧同治難產油能殺虫禾苗生蟲葉

油煎滾東熟酒掃之即降豆油亦可

白芥子宣利氣

豁痰

辛溫入肺通行經絡發汗散寒溫中開胃利氣豁痰丹溪曰痰在膈下及皮裏膜外非此不能達行韓愈三子養食開痞降氣各微炒研看所主為君消腫止瘻疾行則腫消氣行則痛止為末醋調服消癰腫治老人痰嗽喘滿懶食而氣寢者疾氣陰虛火亢氣虛久嗽者勿服疾滯北產者良煎湯不可太熱熱則力減益葉動風動氣有瘡瘍痔瘻使血者俱忘芥菜子豁痰利氣主治畧同芥菜辛熱能散能通肺開胃利氣豁痰久食則積溫成熱辛散太甚耗人真元昏目發瘡

蔓菁子即蕪菁一名諸葛菜

○渴熱利水明目

苦辛平瀉熱解毒利水明目古方治目用之最多治黃疸搗研漿汁飲或吐或下或腹脹利腹中自寬得汗愈腹脹搗敷皆良醋調敷克瘡蜘蛛咬毒能吐能下能利小便明目解毒其功甚偉世罕知用何哉根解酒毒服塗諸熱毒如萎苔根搗汁雞子清調入眼用葉搗爛帕包滴汁三兩點自出也或不用蔓菁子單鹽搗亦可搗敷陰囊腫大如斗葉利五臟消食下氣治噦飛

菜菔子宣破氣除

痰消食

辛溫長於利氣生用能吐風痰散風寒發瘡瘍炒熟能定喉嚨喘息丹溪曰治瘧有調下劑後重止內痛消食除

膨虛弱者服之氣喘難布息俗名蘿蔔子

半錢頭風生薑等分搗汁入麝少許搐鼻

菜菔宣破氣化

辛甘平生食升氣熟食降氣寬中消食化痰散淤治吐衄欬嗽吞酸利二便解酒毒制麁毒豆腐積膚瘦見菜

搗塗敷打湯火傷治噤口痢耗氣滲血白人鬚髮之○生姜能制其毒

菜菔菜辛苦溫功用異同亦甚有

生薑宣散寒發表

開疾止嘔

辛溫行陽分而祛寒發表宣肺氣而解鬱調中暢胃口而開疾消食治傷寒頭痛傷風鼻塞入肺欬逆嘔噦有聲為嘔有聲無物為噦有物無聲為吐其症或因寒因熱胸壅痰膈寒痛濕瀉消水氣行血脾通神明去穢惡殺半夏南星菌連野禽毒野禽多食半夏故貼風濕脾痛和黃明膠敷

葉食鱠成熾搗汁飲即散

薑汁

開病

辛溫而潤治噎膈反胃同荳汁梨汁竹蔗童便人乳蜂蜜膳救暴卒凡中風中暑中惡暴卒等症姜汁

和童便飲效姜汁開疾童便降火也

療狐

臭頭搗凍耳敷膏貼風濕脾痛和黃明膠敷

薑皮

和脾行水

辛涼和脾行水治浮腫脹滿以皮行皮五皮散用之○古方沒薑茶治痢熱痢留皮冷痢去皮大妙

煨薑

止嘔

用生姜懼其散用乾姜懼其燥惟此畧不燥散凡和中止嘔及與太棗並用取其行脾胃之津液而和營衛最為平妥老薑洗淨用濕粗草紙包炭火內煨令草紙純焦並姜外皮微焦中心深黃色則透矣切片

乾薑

燥溫緩逐寒宣發表通脈

辛熱逐寒邪而發表溫經燥脾濕而定嘔消痞同五味利肺氣而治寒嗽開五臟六腑通四肢關節宣諸絡脈治