

本草各要

医方集解

第三卷

細辛 辛溫散風邪故諸風痺

痛欬嗽上氣頭痛春強者宜

之治少陰頭辛散浮熱故

口瘡喉痺少陰鼻淵齒齩者

重錘宜之辛益肝胆故胆虛

驚癇風眼淚下者宜之水停

心下則腎燥細辛之辛能行

水氣以潤之腎燥者心亦躁

也經曰腎苦燥雖手少陰引

經心乃足少陰本藥賢能通

醫方集解卷二

發表之劑

此皆由中之汗者散之也表

三陰為裡而太陽陽明表之表陽明為表

表之裡少陽為半表半裡建胃之陽

人先中于表以潮而入于裡始自去

陽以及陽明少陽乃入陰經由太陰

少陰以及厥陰六經乃盡也治病者

當及其在表而汗之散之使不至于

傳經入裡則病易已矣若表邪未盡

而遽下之則表邪乘虛入裡或誤補

麻黃湯仲景治傷寒太陽症邪氣在表發熱

頭痛身痛腰痛骨節痛項背強惡寒惡

精氣利九竅故耳聾鼻齋音

鼻塞不聞香臭也風寒入腦

故氣不宜通寒宜表熱宜清

有瘧欲者倒臛便瀉者宜之

為未吹鼻倒臛便瀉者宜之

散結溫經破瘀下乳行血發

汗能發少陰之汗仲景治少

汗陰症反發熱麻黃附子細

辛湯乃治邪然味厚性烈不

在裡之表劑

可過用不通悶絕而死雖死

無傷可驗開平獄味極辛產

嘗治此不可不知

華陰者真杜衡里督郵徐棟

去雙葉者用惡黃芪山茱畏

風但有一毫頭痛無汗而喘脉浮而緊

寒邪外屬陽不得越故鬱而為熱經曰

人之傷寒則為病熱寒初中人必先

表即足太陽寒水之經太陽為諸陽去

氣乃一身絪縕本經之脉起自皆上腦

下項循肩挾脊抵腰行于身後故所過

之處無不痛也惡寒者雖無風而惡寒

惡風者當風而始惡之故惡寒必無惡

風惡寒有陰陽之分惡風雖屬陽經故

三陰無惡風之症風為陽邪寒為陰邪

也原病式曰身熱惡寒熱在表也熱在

表而後邪畏正故病熱而反惡寒或言

為寒在表及熱在皮膚寒在骨髓者誤

也凡人之傷風暑溫皆有汗惟傷寒獨

不汗出寒能瀉血又表寒也氣上逆故

喘邪在表故脉浮傷寒脉緊而傷風脉

緩者寒動急而風緩散也喻嘉言曰冬

傷寒春傷溫夏秋傷暑傷濕此四時正

病也然夏秋亦有傷寒冬春亦有傷暑

硝石滑石及黎芦

柴胡 苦平微寒味薄氣升為

陽主陽氣下陷能引清氣上

行而平少陽厥陰之邪熱用

心包三焦相火時珍曰行少

陽黃芩為佐行厥陰黃連為

佐宣暢氣血散結調經人第

知柴胡能發表而不知柴胡

最能和裡故勞藥血藥往往

用為足少陽胆表藥胆為清

之無出無人其經在半表半裡

傷濕乃四時之客病所謂異氣也冬春
正病有汗為傷風無汗為傷寒即夏秋
正病有汗為傷暑亦治太陽陽明合滿
濕無汗仍為傷寒亦治太陽陽明合滿
表邪壅盛陽氣不得宜發故逆而作喘
若心下滿腹痛為裏宜下之此胸中滿
胸中主表猶近非裡是雖有陽明然與
太陽合痛尚為在表宜汗不宜下經曰
陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜
麻黃湯又曰陽明病應發汗反下之此
為大逆或問兩經合病當用兩經之藥
何以偏用麻黃湯耶蓋邪自太陽而來
仍當提出太陽不欲其陷亦治哮喘
人陽明故不用葛根也
由風寒客于皆愈復感于寒而作此湯
散寒邪肺病哮喘者雖服麻黃而不作汗
麻黃三兩桂枝二兩杏仁七十枚甘草一
兩炙甘草先煮麻黃數沸去沫內諸藥煎

柴胡則重虛其治傷寒邪熱

表最宜詳慎仲景有大小痰熱結是虛勞

凡在寇宗奭曰柴胡本經並

月季無一字治勞藥性論曰

華子皆言稱勞傷醫家執而

用之貽誤無窮時珍曰勞有

五勞勞在肝胆心心包有熱

則柴胡乃手足厥陰少陽必

用之其勞在脾胃有熱或陽

氣下陷則柴胡為升清退熱

必用之藥惟勞在肺腎者不

可用耳寇氏一槩擯斥殊非

通論昂按楊氏秦尤扶麻湯

治肺痿成勞咳嗽聲啞休虛

自汗用柴胡為君則區吐心

肺勞亦有用之者矣口吐心

煩裡則多嘔吐言瘧寒東垣

服藥取微汗中病即止不必盡劑無汗

再服凡用麻黃去節醋湯罌泡晒乾備

始十大陽故以發汗為先汗出則愈活

人云凡發汗病症仍在者三日內可二

三汗之今腰以下周徧為度王海藏曰

表症當汗脈浮急汗之脈沉緩汗之裡

症當下脈浮緩下之脈沉急下之三陽

汗當急而下當緩三陰汗當緩而下當

急按汗有大汗解表微汗解肌之別

殊下有急下少與微和滲和之別

此足太陽藥也麻黃中空辛溫氣薄肺

家鼎藥而走太陽能開腠散寒之皮腠肺

寒從此入桂枝辛溫能引營分之邪達

仍從此出桂枝辛溫能引營分之邪達

之肌表桂入營血能解肌杏仁苦甘散

營衛和始能作汗杏仁苦甘散

之肌表桂入營血能解肌杏仁苦甘散

曰諸瘧以柴胡為君佐以引
經之藥李士材曰瘧非少陽
經慎用喻嘉言曰瘧發必有
寒有熱蓋外邪伏于半表半
裡適在少陽所主之界人與
陰爭陽勝則熱出與陽爭陰
勝則寒即純熱無寒為瘧瘧
溫瘧純寒無熱為牝瘧要皆
自少陽而造其極偏補偏救
弊亦必返還少陽之界使陰
陽協和而後愈也謂少陽而
兼他經則有之謂他經而不
涉少陽則不成其為瘧矣脉
縱屢遷而弦之一字是貫徹
之也昂按瘧之不離少陽猶
欬之不離于肺也談薺云張
知閣久病瘧熱時如火年餘
骨立醫用葶附諸藥熱益甚
孫琳授以小柴胡湯三服脫
然琳曰此名勞瘧熱從髓出加

寒而降氣甘草甘平發散而和中經曰
寒淫于內治以甘熱佐以苦辛是已
言曰麻黃發汗其力最猛故以桂枝監
之甘草和之用杏仁潤下以止喘逆正
如馭馬防其放逸耳李士材曰古云冬
不用麻黃夏不用桂枝蓋以冬主閉藏
不應疎泄夏令炎熱不宜辛溫經所謂
必先歲氣毋伐天和是也又云夏月不
用麻黃兩說相反何也或舍時從症或
舍症從時臨時變通存乎其人耳李時
珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用
桂枝未有究其精微者津液為汗汗即
血也在營則為血在衛則為汗寒傷營
管血內瀆不能外通于衛衛氣閉固津
液不行故無汗發熱而惡寒風傷衛衛
氣外泄不能內護于營營氣虛弱津液
不固故有汗發熱而惡風然風寒皆由
皮毛而入皮毛肺之合也証雖屬太陽

以剛劑氣血愈虧熱有在皮
膚在藏府在骨髓在骨髓者
非柴胡不可若得銀柴胡只
須一服南方者力減故三服
乃効也時珍曰觀此則得用
藥之妙的矣昂按據孫氏之
說是柴胡亦頭眩目赤胸痞
能退骨蒸也頭眩目赤胸痞
脇痛餘宜小柴胡湯加青皮
川芎白芍又左脇痛宜沽血
行氣右脇痛宜消食行痰
口苦耳聾皆肝胆婦人熱入
血室衝為血海即血室也男
女皆有之柴胡在藏主
血在經胎前產後俱熱小兒
主氣痘疹五疳羸熱散十二經瘡

然而亦弗鬱咳嗽有痰喘而胸滿非肺
病乎蓋皮毛外閉則邪熱肉攻故用麻
黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌
表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱
而喘者加石膏活人書夏至後加石膏
知母是皆泄肺火之藥是麻黃湯雖太
陽發汗重劑是散肺經火鬱之藥腠理
不密則津液外泄而肺氣虛虛則補其
母故用桂枝同甘草外散風邪以救表
內伐肝木以防脾佐以白芍泄木而固
脾使以姜枣行脾之津液而和營衛散
後微喘者加厚朴杏仁以和肺氣也汗
後脈沉遲者加人參以益肺氣也活人
書加黃芩為陽旦湯以泄肺熱也是桂
枝湯雖太陽解肌輕劑是為理脾救肺
之藥也王履曰傷寒即病者謂之傷寒
不即病者謂之溫暑其原不殊故一稱
為傷寒其類則殊施治不得相混仲景
之書專為即病之傷寒設不兼為不即
病之溫暑設也今人或以傷寒法治溫

疽血凝氣聚功同連翹

連翹治血

熱柴胡治氣

陰虛火炎氣升

者禁用 銀州者根長尺餘

微白治勞瘵良北產者如前

胡而軟並良南產者強硬不

堪用外感生用內傷升氣酒

炒用根中及下降用稍有汗

欬者蜜水炒前胡半夏為使

惡皂角

前胡 辛以暢肺解風寒甘以

暑不遇借用耳三陰傷寒寒症十居七
入若溫暑但一千熱耳後人誤為通治
遂疑諸熱劑不敢用是未悟仲景立麻
黃桂枝之有所主有其時矣苟知非治
溫暑之劑則群疑水釋矣又曰傷寒即
發于冬寒之時寒邪在表開其腠理非
辛溫不能散之此麻黃桂枝等劑所以
必用也溫病熱病發于暄熱之時鬱熱
自內達外無寒在表故非辛涼苦寒苦
酸之劑不能解之此桂枝麻黃等所以
不可用而後人所處水解散大黃湯干
金湯防風通聖散之類兼治內外者之
所以可用也夫即病之傷寒有惡風惡
寒之症者風寒在表表氣受傷也後發
之溫熱病有惡風惡寒之症者必重風
風寒而表氣亦受傷也若無新重之風
寒則無惡風惡寒之症故仲景曰太陽
病發熱而渴不惡寒者為溫病溫病如
此則知熱病亦如此而不渴惡寒者非
溫熱病矣或有不因新中風寒亦見惡

悅脾理胸腹苦泄厥陰用之

寒熱散太陽勝之邪微寒一

性陰而降功端下氣氣下則

火降而痰消氣有餘便是能

除寒熱治痰熱哮喘咳嗽嘔

逆痞膈霍亂小兒疳氣有推

陳致新之續明目安胎無外

感者忌用按柴胡前胡均是

前胡性降為不同肝胆皮

白肉黑味甘氣香者良半夏

風惡寒之症者蓋因表虛熱達于表而傷表氣所謂衛虛則惡風營虛則惡寒耳非傷風惡風傷寒惡寒也溫病熱病亦有先見表症而後傳裡者蓋鬱熱自內達外外不得泄還復入裡而或可攻之症非如傷寒從表而始也每見世人治溫熱病誤攻其裡亦無大害誤發其表變不可言此足明其熱之自內達外矣間有誤攻致害者乃春夏暴寒所中之疫症邪純在表未入于裡不可與溫病熱病同論夫秋冬傷寒真傷寒也春夏傷寒寒疫也與溫病熱病自是而余豈可同治况傷寒直中陰經與太陽雖傷不及鬱熱即傳陰經為寒症而當溫者又與溫病熱病大不同其可混治手至楊子曰傷寒傳足不傳手非窮理之言也草窓劉子指足經所屬水土木水遇寒而涸水土遇寒而圻裂木遇寒而周枯故寒喜傷之手經所屬金與火金遇寒而愈堅火體極熱寒不能發故寒

爲使惡皂焚忌火

麻黃

辛溫微苦

僧繼真云中
牢產麻黃地

冬不積雪性熱
故遇服泄真氣

入足太陽

膀胱

兼走手少陰陽明

心大腸

而爲

肺家需藥發汗解肌去營中

寒邪衛中風熱調血脉通九

竅開毛孔治中風傷寒

中猶傷也

頭痛溫瘧欬逆上氣

風寒入肺經

七日諸氣膈痰哮

喘宜泄

肺氣雖用麻黃而赤黑斑毒

不能傷昧者奇之將人身營衛經絡上
下截斷不相聯絡夫血氣周流瞬息周
間之旨矣夫寒邪襲人必先皮毛灼熱
鼻塞息粗肺主皮毛是手太陰肺辛金
先受病矣海藏有傷寒白皮毛入之語
先師有桂麻羌昔之設虽太陽表之表
之劑然汗法舍皮毛何自而解更衣悖
裳結閉澹泄手陽明大腸庚金病矣先
師有確黃朴實之用虽兼三陽三陰裡
之裡之劑然下法舍大腸何自而通劉
子謂金遇寒而愈堅信乎陽氣怫鬱古
胎言妄手少陰心丁火病矣先師有瀉
心散法亢極動血上下煩蒸手厥陰心
包火手少陽三焦火病矣怡有三黃柴
芩數條小便便燥秘手太陽小腸內火病
矣治有五苓導赤之例劉子謂火熱寒
不能作
熱既云病
而有金燄火凡之微
管見惑世誣人哉机要云有厥陰經下

胃熱一曰斑症表虛不得再汗非便閉亦不可下只宜清解其毒風癰瘡皮肉不仁目赤腫痛水腫風腫過劑則汗多亡陽夏月禁用汗者心之心血為之動搖乃澆悍之劑丹溪以人參麻黃同用亦攻補法也東垣曰十劑曰輕可去實葛根麻黃之屬是也和容皮毛腠理閉拒營衛不行故謂之實二藥輕清故可去之時珍曰麻黃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根陽明經藥兼入脾經脾主肌肉二藥皆輕揚發散而所入不同王好古曰麻黃治衛寔桂枝治衛虛雖皆太陽經藥其寔

利不止脉沉而遲手足厥逆唾涕膿血此難治宜麻黃湯小續命湯汗之此有表邪縮于內當泄表而愈張子和曰殮泄以風為根風非汗不出有病此者腹中雷鳴水谷不分小便滯澁服薑溫藥不効炙中脘脘下數千燥熱轉甚津液枯竭延全視之脉浮大而長身表微熱用桂枝麻黃湯加姜枣煎連進三大劑汗出終日至旦而愈欠以胃風傷和其藏府食進而安經曰春傷于風夏必殮泄故可汗而愈按風屬本脾屬土木剋土故泄也○附大黃湯大黃兩半芒硝大腹皮木通甘草各一兩桂心七錢半桃仁廿一枚治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂破棺千金湯苦參一兩酒煮取汁治天行熱毒垂死水解散防風通聖散見本方除桂枝加石膏名麻表裏門黃杏仁甘草石膏湯仲治汗下後不可

營衛藥也。心主營，為血肺主衛，為氣。故麻黃為手太明肺之劑。桂枝為手少陰心之劑。時珍曰：仲景治傷寒無汗用麻黃，有汗用桂枝，未有完其精微者。津液為汗，汗即血也。在營則為血，在衛則為汗。寒傷營，營血內濇，不能外通，于衛衛氣閉固，津液不行，故無汗。發熱而惡寒，風傷衛，七氣外泄，不能內護，于營七氣虛弱，津液不固，故有汗。發熱而惡風，然風寒皆由皮毛而入，皮毛肺之合也。蓋皮毛外閉，則邪熱內攻，故用麻黃、甘草同桂枝，引出營分之邪，達之肌表。佐以杏仁泄肺而利氣，汗後無大熱而喘者，加石羔。活人書：夏至後加石羔，知母皆泄肺火之藥。是麻黃湯雖

更行桂枝湯，汗出而喘，無大熱者，成間後不可更行桂枝湯。桂枝既不可行，麻黃可行耶？無大熱，石羔可行耶？喻嘉言曰：治傷寒先分營衛。桂麻二湯斷無混用之理。此症太陽之邪雖從汗解，然肺中熱邪未盡，所以熱雖少，止喘仍不止。故用麻黃發肺邪，杏仁下肺氣，甘草緩肺急，石羔清肺熱，即以治足太陽之藥。通治手太陰經也。倘誤行桂枝，寧不壅塞肺氣而亦治溫瘧先熱後寒本方加吐瀉膿乎。亦治溫瘧先熱後寒本方加白朮名麻黃加朮湯。治濕家身體煩痛，宜發汗。本方去桂枝，杏仁加附子名麻黃附子湯。治脉沉虛脹者為氣水。屬少陰，發其汗即止。本方除桂枝，杏仁

太陽發汗重劑寔散肺經火邪之藥腠理不密則津液外泄而肺氣虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以收表內伐肝木以防脾佐以白芍泄木而固脾使以姜枣行脾之津液而和營衛下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脈沉遲者加人參以益肺氣也活人書加黃芩為陽旦湯以瀉肺熱也是桂枝湯雖太陽解肌專劑寔為理脾救肺發汗用莖去節之藥也

煮半餘沸掠去浮沫或用醋湯略泡晒乾備用亦有用蜜炒者太發止汗用根節出汗

名甘草麻黃湯金治裏水一身面目黃腫脈沉小便不利重要取汗本方去桂用麻黃節不去杏仁皮尖甘草生用名三拗湯局治感冒風寒咳嗽鼻塞麻黃留節發中有收杏仁甘草生用補思汗諸症仲景曰陽盛中有發也愈汗之則死陰盛陽虛汗之則愈下之則死脈浮緊者常身痛宜汗之假令只脈遲者不可發汗以營弱血少故也咽燥喉乾者不可發汗津液不足也咳而小便利若失小便者不可發汗雖有表症不可發汗發汗必便血亡耗津液反增客熱也衄家亡血家不可發汗發汗則陰陽俱虛針經曰奪血者無汗奪汗者無血土海藏口仲景言衄

為自汗屬陽虛憂中出汗為盜汗屬陰虛用麻黃根蛤粉粟米等分為末袋盛撲之佳時珍曰麻黃發汗勝不能禦根節止汗効如影响物理不可測如此自汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽柔痙等症皆可加用蓋其性能行周身肌表引諸藥至衛分而固腠理○汗雖為心液然五藏亦各有汗經曰飲食飽甚汗出于胃驚而奪精汗出于心持重遠行汗出于腎疾走恐懼汗出于肝搖体厚朴白微為勞苦汗出于脾

使惡辛夷石羔

荆芥一名辛苦而溫芳香而散

家不可發汗蓋為脉微也若浮緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯活人云脉微者黃芩芍藥湯犀角地黃湯身痛不可發汗發汗則痙表虛熱聚故生瘡汗之則表益虛熱愈甚而生風故變痙少陰病脉沉細數病為在裏不可發汗少陰病但厥無汗而強發之必動其血或從口鼻或從目出是名下厥上渴難治脉動數微弱者不可發汗脉沉遲為在裏及發其汗則津液越出大便難表虛裡寔必譫語汗家重發汗必恍惚心亂汗者心之液心亡血液故亂腹中上下左右有動氣者不可發汗

傷寒傷風

辨傷寒鬱而後能發熱傷寒無汗傷風即能發熱傷寒無汗傷風

有汗傷寒無涕傷風有涕傷寒手足微厥傷風手足皆溫傷寒脉緊傷風脉緩

陰陽表裏

辨陽症之表發熱惡寒頭痛辛春強便清不渴手足溫

入肝經氣分兼行血分其性

升浮能發汗又云止冷散風

濕清頭目利咽喉治傷寒頭

痛中風口噤身強項直口面

喎邪目中黑花其氣溫散能

助脾消食氣香入脾通利血脉治

吐血腸風崩中血痢產風血

運產後血去過多腹內空虛

患不待外風襲之也荆芥最

能散血中之風華佗愈風散
荆芥三錢微焙為末豆淋酒
調服或童便服諸家云甚効

陰症之表無熱惡寒面慘息冷手足厥
逆陽症之裏唇焦舌燥煩渴掀衣揚手
擲足大便秘結小便赤澀瓜甲紅活身
輕易于轉側脉浮洪數陰症之裏不渴
倦卧引衣自蓋唇紫舌捲大便滑泄小
便清白瓜甲青黑身重難于轉側脉沉
細數惟腹痛與嘔陰陽裏症皆有之三
陽經又有陰陽表裏之分太陽以熱在
皮膚頭痛項強在經為表麻黃湯桂枝
湯九味羌活湯以口渴尿赤熱入膀胱
在府為裏五苓散陽明以熱在肌肉目
痛不眠在經為表葛根解肌湯以口渴
皆寒為熱漸入裏白虎加參湯若自汗
狂譫熱已入胃周為全入裏調胃承氣
湯少陽以胸脇之間為半表半裏表多
小柴胡湯裏多熱盛者黃芩湯以上皆
發熱太陽惡寒陽明自汗少陽多嘔皆
三陽症也大抵陽症多得之風寒暑濕
邪生于太陽也陰症多得之飲食起居
七情邪生于少陰也故曰傷寒內傷者

癰瘡瘡腫清熱散瘀破結解

毒結散熱清則為風病血病

瘡家聖藥兼治血者以其入

風水之藏即是藏血之地也

李士材曰風在皮裡膜外荆

芥主之非若防連穗用于巖

風能入骨肉也

故善治血炒黑用凡血藥用

升發地榆棧欄五靈脂等皆

應炒黑者以黑勝紅也

十居八九也

桂枝湯仲景治太陽中風陽浮而陰弱發熱

頭痛自汗惡風惡寒鼻鳴乾嘔陽衛亦

陽陽以候衛閉後為陰營亦陰陰以候

營陽脉浮者衛中風也陰脉弱者營氣

弱也傷于風者頭先受之故頭痛經曰

陽浮者熱自發陰弱者汗自出風傷于

衛營弱衛強故發熱自汗也衛虛則惡

風營虛則惡寒自汗則皮腠疎故惡風

復惡寒也惡寒雖屬表亦有虛寔之分

表虛宜解肌鼻鳴乾嘔者風寒氣逆故

息有音而作嘔也喻嘉言曰風寒並舉

義重惡風惡風未有不惡寒者所以傷

寒亦互云惡風後人謂傷寒惡寒傷風

惡風及陽明病脉遲汗出多微惡寒者

誤矣

包心心氣分而兼泄火兼除手

足少陽三焦手陽明經大腸氣

分濕熱散諸經血凝氣聚營氣

滯遏衛氣鬱利水通經殺虫

止痛消腫排膿凡腫而痛者

為寔邪腫而不痛者為虛邪

腫而赤者為結熱腫而不赤

為留氣停痰為十二經瘡家聖藥

經曰諸瘡痛痒皆屬心火

紫蘇味辛入氣分色紫入血

分香溫散寒通心利肺開胃

表未解也可發汗以微惡寒尚兼太陽

仍當從外解肌斷其入胃府之路桂枝芍藥生

薑三兩甘草二兩大棗十二枚熱服須臾

啜稀熱粥以助藥力溫裏取微似汗不

可令如水淋漓汗出病差停後服服一

劑盡病症猶在者更作服此足太陽

藥也仲景以發汗為重解肌為輕中風

不可大汗汗過則反動營血雖有表邪

只可解肌故以桂枝湯少和之也經曰

風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘緩