

可驗。若傷寒陰寒內盛，逼其浮陽之火行於面，亦發赤色。此熱證也。此爲戴陽。四逆湯加葱白。夫陽已戴於頭面，不知者，更用表藥，則孤陽飛越，危殆立見。可不慎哉！溫病無陰證，目暗不明，目赤，目黃，目瞑，目直視，目反折。目者，至陰也。五藏六府精華之所係。水足則明，察秋毫如常。而瞭瞭者，裏無邪也。至於目暗不明，乃邪熱居內，焚灼腎水，枯涸不能助照。若赤若黃，若瞑若直視，若反折，邪俱在裏也。若不急下，則邪熱愈熾矣。並宜加味涼膈散，加龍胆草。

薛氏曰：凡開目而欲見人者，陽證也；閉目而不欲見人者，陰

證也、目中不了了、目睛不和、色赤熱甚於內也、目瞑者必將

翳也、目睛黃者將發身黃也、或瞪目直視、或戴眼反折、或目

胞陷下、內多虛證或睛暗而不知人者、亦有虛證皆難治也、

加味涼膈散、溫病主方、余治溫病、雙解涼膈、愈者不詳

其數、若病大頭、瓜瓢等溫、危在旦夕、數年來、以二方救

活者、屈指以算、百十餘人、真神方也、其共珍之、

白殭蠶 酒炒三錢 蟬蛻 全十枚 廣薑黃 七分 黃連 二錢 黃芩 二錢

梔子 二錢 連翹 去心三錢 薄荷 大黃芒硝各三錢 甘草 一錢

竹葉 三十片 水煎去渣、充芒硝入蜜酒、冷服、若欲下之

量加硝黃、胸中熱、加麥冬、心下痞、加枳實、嘔渴、加石

膏小便赤數加滑石滿加枳實厚樸

連翹、荷竹葉薄而升浮、瀉火於上、芩連、梔薑味苦而無氣、瀉火於中、大黃、芒硝味厚而鹹寒、瀉火於下、殭蠶、蟬蛻以清化之品、滌疵癘之氣、以解溫毒、用甘草者、取其性緩以和中也、加蜜酒者、取其引上而導下也、

舌白胎

黃胎

黑胎

凡傷寒邪在表者、舌無胎、邪在半表半裏、白胎而滑、肺主氣而色白、故凡白胎猶帶表證、止宜和解、禁用攻下、有尖白根黃、尖黃根白、或尖白根黑、及半邊黃白而胎滑者、雖證不同、皆屬半表半裏、若傳裏則乾燥、熱深則黃、甚則黑

也然黑色止有二種、有火極似水者爲熱極、有水極似火者爲寒極、細辨之、黑色亦白不同、熱極者、色黑而胎燥、或如芒刺、再驗必小便赤澀、大承氣湯下之、寒極者、色青灰而胎滑、再驗必小便清白、或淡黃、理中湯加附子溫之、又溫病與傷寒、舌色不同、傷寒白表傳裏、舌胎必由白滑而變黃、變黑、不似溫病熱毒由裏達表、一發卽是白黃黑諸胎也、故傷寒白胎不可下、黃則下之、溫病稍見黃白胎、無論燥潤、卽以升降散、加味涼膈散下之、黑則以解毒承氣湯急下之、下後間有三二日裏證去、舌尙黑者、胎皮未落也、不可再下、務在有下證方可下、有一種舌俱黑而無

胎此經氣非下證也。妊娠多有此陰證，亦有此。

又有一

種舌，屢經汗下消導，二便已通，而舌上青灰色未退，或濕潤，或雖不濕潤，亦不乾燥，不可因其濕潤，妄投薑附，亦不可因其不濕潤而誤與硝黃。此因汗下過傷津液，其脈必虛微無力，急宜救陰爲主。炙甘草湯、左歸丸料，或六味地黃丸料，合生脈散滋其化源。又有一種舌，真陰虧損，火勝精枯，乾燥涸極，唇烈鼻燥，舌黑，宜以涼水梨漿治其標。左歸六味治其本，庶或可生。若執用承氣涼膈，則殆矣。杜清碧三十六舌法，三十五舌屬熱，惟一舌屬寒，大抵熱多寒少，三十六法已覺其煩。後廣至一百有餘，真屬蛇足。

大鵝梨截薄片於新汲水中去渣飲汁卽梨漿是也

大承氣湯

方見陽證似陰門

理中湯

方見陰證門

升降湯

方見陰證似陽門

加味涼膈散

方見目暗不明門

解毒承氣湯

方見陰證門

炙甘草湯

傷寒脈結代心動悸此方主之

炙甘草

二錢

阿膠

二錢

麻仁

去皮四錢

麥冬

去心四錢

生地

八錢

杜枝

二錢

人參

一錢

生薑

二錢

大棗

二枚

水酒各

半煎去渣入阿膠化服

薛氏加當歸酸棗仁

炒各三錢

五味子

炒研一錢

脈結心悸由血氣虛衰不能相續也緣其人汗下不解真陰
衰竭津液枯涸滋陰之藥當倍於補氣故參草桂枝薑棗補
益中氣調和榮衛阿膠麻仁麥冬生地藥味既多分兩既重
所以潤經益血復脈通心也聖劑經曰津液耗散為枯五臟
痿弱榮衛涸流濕劑所以潤之與水停心悸之治法不同汪
訥菴曰千金翼用治虛勞寶鑑用治呃逆外台用治肺痿愚

開後人滋陰降火無窮之法門此方是也

左歸丸

減兩為錢大劑煎飲名為丸料

治真陰腎水不足不能滋養榮衛漸

至衰弱或虛熱往來自汗盜汗或神不守舍血不歸元

或氣虛昏暈、或眼花耳聾、或口燥舌乾、或腰酸腿軟、或遺淋瀝痛、凡精髓內虧、津液枯涸等證、俱宜壯水之主、以培左腎之元陰、而精血自充矣、

熟地

八兩

山藥

四兩炒

山茱萸

四兩蒸去核

兔絲子

四兩酒炒

枸杞

四兩

鹿角膠

四兩打碎炒珠

龜板膠

四兩截碎炒珠無火不用此味

牛膝

三兩

酒蒸熟滑精者不用

為末揀蜜丸任下

如真陰失守虛火上炎

者宜用純陰至靜之劑去枸杞鹿膠加女貞子

三錢麥冬

三錢火燥灼金乾枯多嗽加百合三兩夜熱骨蒸加地骨皮

三錢水不利不清加白茯苓三兩大便燥結去兔絲加肉蓯

三兩蓉血虛血滯加當歸

四兩腰膝酸痛加杜仲

鹽水炒斷三兩藏

平無火而腎氣不充者去龜板膠加破故紙炒香三兩蓮肉

去心胡桃肉各三兩氣虛加人參三兩

六味地黄丸料加肉桂一錢炮附子一錢牛膝一錢車前子一錢一名

金匱腎氣丸料去牛前名腎氣丸

熟地四錢山藥二錢山萸肉二錢白茯苓一錢半丹皮二錢

五錢澤瀉一錢五分水煎溫服加黃柏知母名知柏地黄丸

生脈散方見陰證似陽門

舌白砂胎 舌紫赤色

舌上白胎乾硬如砂皮一名水晶舌乃自白胎之時津液乾燥邪雖在胃不能變黃急下之紫赤亦胃熱也亦宜下之

舌刺 熱傷津液此熱毒之最重者急下之

舌裂 日久失火血液枯涸多有此證又熱結旁流日久不治在下則津液消亡在上則邪火毒熾故有此證急下之
裂自滿

舌短 舌捲 舌硬 此皆邪氣勝真氣虧急下之舌自舒

唇燥裂 唇焦色 口臭 鼻孔如烟煤 此胃家實多有

此證急下之鼻孔煤黑溫毒在胃更甚急下之

口燥咽乾 氣噴如火 揚手擲足 小便極臭 小便赤

黑 小便涓滴作痛此皆內熱之極急下之

潮熱 邪熱在胃宜下之

善太息 此胃家實、呼吸不利、胸膈痞悶、每欲飲氣下行、故然宜下之。

心下滿 心下痛 心下滿痛 心下高起如塊 腹脹滿痛 腹痛按之愈痛 小腹滿痛 此皆胃家邪實、內結氣閉、急下之、氣通則已。

頭脹 頭脹痛 頭汗 頭痛如破 此皆胃家邪實、氣不下降、急下之、脹痛立止、頭汗亦宜下之、則熱越而徧身汗出矣。

譫語 發狂 畜血如狂 此胃家實、陽邪勝也、急下之、有氣血兩虛、燥煩如狂者、不宜下、須辨之。

溫疹 治法不外清散增損雙解散加紫萍

增損雙解散 方見陽毒陰毒門

小便閉 此大便秘氣結不舒因而小便不通也急下之大
便行小便立解

大便燥結 轉尿氣極臭 此下之無辭但有血液枯竭者
無表裏證虛燥不可下宜六味地黃丸料加麥冬五味煎
成入人乳減半飲之 一方用白菜自然汁大麻仁汁生
芝麻汁等分入蜜和服自通或用蜜煎導法

味地黃丸料 方見上舌白脰內

煎導法 陽明病自汗若發汗小便自利者此為精液內

竭便雖硬不可攻此仲景心法後人早知當自欲大便時以此法導之乃承氣之變法也

蜂蜜入銅勺內微火煎稍凝勿令焦入皂角末五分

併手作挺子長寸許令頭銳欲大便時入穀道中自下

大便膠閉其人平日大便不實一遇溫邪便蒸作極臭狀如粘膠愈蒸愈粘愈粘愈閉以致胃氣不能下行溫毒無自而出不下卽死若得粘膠一去無不愈者

協熱下利其人大便素或不調邪熱乘胃便作煩渴一如素日瀉泄稀糞而色不敗其敗色但焦黃而已午後潮熱便作瀉泄子後熱退瀉泄亦減次日不作潮熱利亦止爲

病愈若潮熱復作利不止者以增損大柴胡湯徹其餘邪而利自止

增損大柴胡湯

熱結傍流 此胃家實邪熱壅閉續得下利純臭水全然無糞日三五度或十數度急以加味六一順氣湯下之得結糞而利自止服藥後不得結糞仍稀水傍流及所進湯藥因大腸邪勝失其傳送之職知邪猶在也病必不減仍以
前湯再下之或用解毒承氣湯如虛并加人參無參以熟地一兩歸身七錢山藥五錢煎湯入前藥煎服累效蓋血不亡氣亦不散耳

加味六一氣順湯 方見陽證似陰門

解毒承氣湯 方見陰證門

脈厥 體厥 脈厥沉伏欲絕，體厥四肢逆冷，涼過肘膝，半死半生，通身如冰，九死一生，此邪火壅閉，陽氣不能四布於外，胃家實也。急以解毒承氣湯大清大下之。下後而鬱熱已解，脈和體溫，此爲病愈。若下後而鬱熱已盡，反見厥者，爲虛脫，宜補。若下後鬱熱未盡，仍見厥者，更下之。厥不回者死。

按溫病厥逆，皆下證。傷寒厥逆多兼下利，則陽熱變爲陰寒者，十之五。蓋木盛則胃土受尅，水穀奔迫，胃陽發露，能

食則爲除中，本盛則腎水暗虧，汲取無休，腎陽發露，面赤則爲戴陽，戴陽尚多可救，除中十不救一，所以溫之炙之以回其陽，仍不出少陰之成法也，但厥而下利陰陽之機甚微，不可不辨也。

解毒承氣湯 方見陰證門

下後脈反浮

裏證下後，宜脈靜身涼，今脈浮身微熱，口渴，神思或不爽，此邪熱溢於肌表，裏無大留滯也，雖無汗，宜白虎湯。若大下後，或數下後，脈空浮而虛，按之豁然如無，宜玉女煎，加人參，覆杯則汗解，以其人或自利經久，或他病先虧，或本病日久不