

孫氏醫學叢書

傷寒雜病論章句

冊四

傷寒雜病論章句卷九 治婦人

湘潭孫鼎宜撰

【經帶病】

【帶下】

【論婦人病大略一章】

金匱出婦人雜病

婦人之病

三不端

因虛

足一

婦人

病多

血虛

不積

冷

也二

女陰

物結

氣三

兼病或善懷

病故病多

結氣

陳云

三或偏

勝而為

病或為

諸經

〔水〕

斷絕

此陳

婦云

至或大病崩

下也其難

產之經

後水者

以有少

遲證

皆速或

逢期而

病至有

歷年

新病非

血寒

陳云

氣寒

則血亦

寒

積結

胞門

冷侵

不為瘀

血停

積之

數陳

云

而為

寒傷

句

經絡凝

堅

此帶

下病之

由氣

絕年

寒門

堅其

皆古

韻叶

吳

絡寒熱

虛實

之分

各異

也陳

云經

水之

來源

受傷

則病

變無

窮矣

然

又

下三

○在上

歐

寒而

傷逆

于胃

口則

為歐

客

吐涎

唾入

垂

久成

肺癰

陳云或

寒久

變熱

熱

形體

損分

寒葉

焚入

陳云

其形

體受

損則

一而

為

傷寒雜病論章句

卷九

婦人經帶病

中華書局聚

重言之上焦則足韻猶言涎涎久則肺蒸成肺體傷損唐云言血
○在中盤結繞

齊寒疝邪氣鮮陳云病若在中盤結或為繞齊寒疝之或兩脅疼痛與臧相連陳云

宮之為臧相連此或熱結中陳云或邪氣鬱痛在關元關元任脈穴陳

相搏脈數無創陳云爛脈見出數熱而創肌若魚鱗腸肺中所謂甲

狀若時着男子此謂陰易是陳云非止女身云此連元鱗身皆古叶韻陳

陰陽之交也雖胞門為寒旋變熱一而中氣素寒者以寒召言血積在邪

從寒化也中氣素熱者寒旋變熱所謂邪氣從熱化也唐云言血積在邪

又中焦或為血熱之病也○在下來多云經水來過多也○金匱作未多陳

來却不一經候不勻令陰掣痛陳云陰中掣痛少腹急寒一作惡寒或引要

脊上謂陰中痛下根氣衝氣衝足陽明穴金氣衝急痛膝脛疼煩陳云

為陰之部而衝脈與少陰奄忽眩冒狀如厥顛陳云甚則為此諸證

上狂也按厥謂如尸厥顛謂如或有憂慘悲傷多嗔語皆叶韻陳云悲

愁不樂也唐云此○此皆帶下非有鬼神陳云以下久則羸瘦脈虛

多寒言上言寒久又因虛生寒則三十六病病源是二十九云諸方說三十六傷

末節以此皆帶下總結仍陳

【論帶下六極一章】

〔師曰〕問詞脫省〔婦人〕帶下六極〔之病〕此六極專斥帶下六種言

應一脈者具如下文○脈浮則爲腸鳴一腹滿二○緊則爲腹痛

與平人之六極又異○數則陰痒四○病源作陰中痒痛○洪則生創

三○病源三十○數則陰痒生創無下節洪則二字○洪則生創

右憑脈以定帶下六極

【論帶下二門一章】

〔師曰〕問詞脫〔帶下二門〕○產後屬胞門病源四十四云謂因

未產屬龍門○未嫁屬玉門據脈經九補

【論未嫁三病一章】

問曰未嫁〔女〕有三病何謂也師曰一者一者二字當在陰中熱

經初下陰中熱二七時也或當風涼或因扇得冷因陰熱而進或易

扇者今○二者或因以寒水洗之因謂因于熱也○三者或初見月下驚

恐得病驚恐有之喜怒憂思皆同然也此謂內傷△皆屬帶下也據脈經九補

【論帶下九實劇易之期一章】

〔師曰婦人〕帶下九實中事九實未詳鼠乳蓋其一者假令得鼠乳之病鼠乳見臧

府雜病中病源三十一云鼠乳者身面忽生肉如鼠乳之狀風邪搏于肌肉所變生也劇易當有期鼠乳有期餘八

實當亦各有期也易猶差也當以庚辛爲期臧府雜病中云其病屬肺故以庚辛爲期也餘倣此據

經九補

右言鼠乳以庚辛爲劇易之期

【論五崩色象一章】

問曰五崩何等類師曰白崩者形如涕○赤崩者如絳津絳亦赤色也津

猶汁也○黃崩如爛瓜○青崩如藍○黑崩者形如𧈧血也𧈧瘀血也○據

脈經九補

右以五色分爲五崩

【崩中去血方一章】

崩中去血溫經湯主之

方在當歸輩○據金匱婦人雜病本方方下補

右溫經湯證

【帶下須以飲食分別三焦一章】

問曰婦人年五十所

許所

背痛

此常

時腹疼

有時

少食

非惡聞食

少

為飲食又非飲食如故

多厭

謂遇事多瞋怒

喜瞋張

無喜瞋

張

無喜瞋

二起也

○病源

三十七

其

脈陽微

寸陽謂

關尺小緊

虛寒

形脈不相應

此病源

下云

刪去

下焦

此病源

三十七

其

願知所說師曰當問病者飲食何如

冒下

○假令病者言我不欲

飲食聞穀氣臭者病在上焦

假臭

○我多少為欲食

言任意進食

或多或少皆

可隨便也然疑多字衍文

不食亦可者病在中焦

○我飲食如故者病在下焦

△皆屬帶下治之

總三焦言也

據脈經九補

○

【經病】

【論經不調證治五章】

問曰婦人言經少不如前者何也師曰曾更下利一若汗出二小

便利者三可平聲史記大宛傳必更匈奴中索隱更經也以亡津

液故經少○設反多于前者當所困苦損精液故恐大便難津液不潤

腸于身無復汗也○津液不潤于表

右一章二節首言亡津液則經少次言設經反多則津液愈

形不足

〔婦人〕經〔水〕過多亡津液者亦大便難也據病源四十引張仲景曰補○此言不因

二便通利及汗出單祇經水過多亦令人大便難

右言經過多則便堅申明上章次節之義據此經過少則便多澹也

〔婦人經〕一月再見者經行一次經來時時字據病源其脈欲自如

常月行兩次脈當如常洪而反微退脈微則知熱不利不下不汗出

者無是二證則津液內復不致外耗其經二月必來虛故也○據脈經九補

右言初次先期縱津液得復其二次必致後期之常

經來過多及至期不來者溫經湯主之

婦方在當歸本方下補

右溫經湯證

〔婦人〕帶下

或吳云帶下胞中病也從氣血寒熱錯雜之則為白帶從血分

也經〔水〕不利

經不利故水一月再見與

少腹滿痛

尤云瘀血不利之驗也吳

九無

〔經〕一月再見者

尤生云經月盈則暢虧則應晦復至血滿其則下血盡

畜洩失常似通非通欲止不止

土瓜根散主之

云方在抵當輦○軌在

衝脈之方陳云土瓜即王瓜也主驅熱行瘀佐以蟻蟲蠕

右土瓜根證

〔論經斷證四章〕

問曰〔婦人病〕下利而經反斷者何也

通則俱通何為師曰但當

止利

言利止經當自下也

勿怪以亡津液故經斷利止津液復經自當下也

〔據脈經〕

右言由下利而經斷者當先止利以復津液

〔婦人〕血下

先有下血病也咽乾二證

○而不渴者其經必斷過多故血此

營不足

故營血不足

本自有微寒故不引飲

明不渴之故引求也

○渴而引飲

者

微寒去而津液將生求救于水也

津液得通營衛自和其經必復下

〔據脈經九補〕

右言下血後經斷以渴為自愈之常

〔婦人〕常歐吐而胃反一

若常喘多唾

二者皆足亡津液

其經又斷

此亡津液

者之

設來者亦必少也

〔據脈經九補〕

右言亡津液則經斷即來亦必少

〔婦人〕少腹硯磊轉痛

硯磊者謂少腹轉痛時有顆粒之可捫也脈經注硯音袁磊力罪切

而復自

解猶止也發作無常

數不拘日

經反斷

久由腹中氣痛

膀胱中結堅急痛

下引陰中氣衝者

膀胱與胞中相近也氣痛發時或下引陰中或外達足陽明氣衝穴此所以有硯磊之形也氣

衝在毛際兩旁上

久必兩脅拘急

○〔據脈經九補〕甚則且上攻兩脅

右言由腹中氣痛而經斷經斷後氣痛更劇上下游走無定

【論經閉證治二章】

閉者可通也斷者通之無可通也

〔婦人〕經閉不利

此經閉而臧堅臧謂陰中也故方下云納臧中僻

不止

水僻也此僻內經即陰謂所下白物死以金辟為之瘳妄加廣頭中有乾

血乾塊黑中下白物

如乾血與白物齊下如鼻涕磬石杏仁圓主之在方

雜法原不標杏仁今添其潤又以消白物與乾血之神農本經磬石主

不須加消導惡創因其可蓄洩不故用坐藥法也尤云乾血不去則新血

不營而經閉不利由是時自下是宜先去其臧之淫

右經閉兼白帶

坐藥磬石杏仁圓證

〔婦人〕經〔水〕不利

此有瘀臧中無白帶者也不言如狂小便抵當

湯主之

右經閉有瘀血

抵當湯證

〔經水不利〕下瘀〔血〕湯亦主之

方在抵當輩○據金匱產後本方下補

右經閉有瘀血 下瘀血湯證

任二方用法略同

〔論年老行經三章〕

師曰婦人脈微瀦凡津液虧損者脈皆微瀦病者不先自法當吐

若下利以微瀦之脈主病應爾而言否者謂病者自言病也因問夫人年幾何

夫人尊夫人言七七四十九絕之天癸應時經當斷反至今不止此二句乃醫斷

之之以故致此虛也明微瀦所由然此句亦

右言四十九歲而經仍行則體虛而脈微瀦

問曰婦人年五十所絕所猶許也以明七七後天癸已病下利下利者謂

經也李崩下之利也後世乃專屬大便滑泄言由不習婦科書數十日

不止經亦不止則莫則發熱李云血結在陰陰虛故發熱莫不入于陰則反

外浮于少腹裏急痛腹滿尤云血積一行亦陰寒手掌熱尤云病在陰

云手心為陰虛故煩熱按近人通以五心煩熱唇口乾燥尤云血

則不外營按此因久崩以傷其津液又何也師曰此屬帶下曾經半

產瘀血在少腹不去其證唇口乾燥故知之蓋謂瘀能阻塞津

斷為瘀血與然不如以少腹裏急痛腹滿二證為憑之當與溫經湯

傷寒雜病論章句卷九婦人經帶病六中華書局聚

主之方在當歸輩下○此因瘀血而經不止仍不必瀋經但去其瘀而崩

中止吳茱萸丹誰敢復曰破血散寒餘則多滋養之藥也後人見經

下數十日不止此湯各溫經以瘀得溫正則行也方內皆補氣血之

寒未嘗以凝瀋不流此而瘀血自去者此此亦通因通用之法也血得溫

人崩淋無須逐瘀而瘀自去軌範注此調經總方金匱出婦人雜病

常流 屬溫經湯證

〔師曰婦人〕年六十所血年老氣虛經常自下更虛設久病利下利而

則正愈虛此一逆也少腹堅滿者既久利又經常行而腹不為難治九據脈經

右言年六十病下利復行經腹張之危

【論熱入血室二章】

肝減血血室即肝也病在肝而傷寒屬少陽者以表裏證同故也

〔婦人〕金匱論出婦人雜病中風統傷七八日一經氣續得寒熱續得者

發熱惡寒今因往來寒熱也柯云與少陽往來發作有時徐云此即

瘧如經適斷者此起在經斷之下章為輕以此為熱入血室成血室虛其血

必結徐云必血因熱結而成瘀柯云經水適斷而入其熱時血是不當止者

乾結于內故使如瘡狀〔發作有時〕〔衍四字〕小柴胡湯主之〔徐云即法以

治之柯云使結血散則寒熱除尤云仲景單用小柴胡湯不雜之血藥

一味意謂熱邪解而乍結之血亦行耳按月一行寒熱一大黃甘遂湯因經行而竟隨去也

右經斷中風熱入血室如瘡

小柴胡證此少陽兼

〔婦人中風〕〔傷寒論出太陽下金匱出婦發熱惡寒表病是也〕

此時尚未慮及月事知經適來府成不云若血室徐云彼云邪斷此云來得

之七八日婦人行其證較上章為重有七八日竟者此云七八日舉其

經後而寒熱始熱除而脈遲身涼遲非謂身寒謂較初起時之脈較外

邪內伏尤云病去表而之匈脅下滿脈經九謂即匈脅也如結匈狀謂

滿而不痛故云唐云〇〔其人〕二脈字有譫語者明病下證故即譫語

者當刺此期譫語非胃實治之詳見厥陰兼此為熱入血室也見上徐云

焦營氣所聚肝藏血心主血營血結滯則肝當刺期門軌範云期門

傷寒雜病論章句 卷九 婦人經帶病 七 中華書局聚

四寸第二肋端此等刺法最易學也常云亦可小柴胡湯汪琥曰熱入血室故譫語仲景恐人誤認為陽明府實證輕用承氣故特出刺法隨其虛實而取之則原為隨其形之實證而寫之今依脈經九〇徐云血結

陰有餘之熱則尤親切而易散按徐氏專據文寫實則一云經水斷一云與七八日相搏結于脅下八日續得寒熱一云經水來一

云經水斷一云與七八日相搏結于脅下八日續得寒熱一云經水來一

下寒一云譫語一云刺期門一云用了小柴胡譫語一云如母犯胃氣一及云上二瘡一皆自往

為注脚也學者試因此而紬繹全書思過半矣

右經來中風熱入血室如結匈刺期門證此下明二章少陽

婦人傷寒論出太陽下傷寒中風發熱據下文知經適來水初來

之日即病傷寒故晝日明了氣分無病服莫則譫語病在血分尤

邪隨血之出而晝日明了氣分無病服莫則譫語病在血分尤

亦為陰邪如見鬼狀安魂魄不此為熱入血室尤云離表汗過多

陽明經水適來邪氣離表則入血室蓋虛則易入亦惟虛者能受也

然熱雖入而不邪氣結其邪必將自解徐云晝清而夜昏者血室屬陰也

病在陰經也熱入血室之狀此二條為最詳婦人傷寒此證最多前

條證稍輕後二條傷寒方脈經小柴胡致後人疑為無犯胃氣語恐人見譫

治之勿金匱自愈證本事方用小柴胡致後人疑為無犯胃氣語恐人見譫

實及上二焦必自愈二語即明小柴胡及上刺期二門之功效知者汗多吐

在下焦故云然龐云先宜小柴胡湯不愈刺期門則徐云此為中焦營

氣之疾汗下二法俱非所宜小柴胡湯不愈刺期門則徐云此為中焦營

恐人以發熱為表邪未解譴語為陽明實也而或攻之或汗之也喻云

刺期門以發熱為表邪未解譴語為陽明實也而或攻之或汗之也喻云

舍期門及小柴胡更無他法矣必自愈者見府病用小柴胡

減病必俟經水再行其邪熱乃隨血去又非藥之所能勝耳

右經來傷寒熱入血室夜譴語證

胃氣亦不得刺之令汗以傷上焦之氣刺之出血以傷下焦之氣也

【論血分水分一章】

問曰病有血分水分何謂也師曰經前斷後病水名曰血分尤云因

為水為難治尤云血病深而難通按難治者對水分治法言非謂不

也者其治法已治也據水腫血分部有由氣血俱虛者有由氣血鬱結

不言而備○先病水後經斷各水分尤云因水而去其水經自下

【論鬱冒二章】

問曰經適下發汗則鬱冒不知人何也師曰經下為裏虛經水適

傷寒雜病論章句卷九 婦人經帶病 八 中華書局聚

中血空非發汗為表復虛謂誤汗故令鬱冒也○以表裏俱虛故

右言經來誤汗則成鬱冒

問曰婦人病如顛疾此即下文粗鬱冒鬱冒粗醫以爲人故一日二

十餘發發之頻而速無如此者師脈之反言帶下師言不後如師言其脈何

類師曰寸口脈濡而緊濡則陽氣微緊則營中寒陽

微衛氣虛血竭而凝寒蒙上二句省陰陽不和邪氣舍于營衛疾起

少年時經來合房室移時過度精感感當作減聲誤據婦人雜命

門開交合多遂致相火動難經以右經下血虛百脈皆張其源雖

其病之起則中極感陽動句有誤字或謂其身極微風激成寒本

血寒復因虛舍營衛虛謂經冷積在丹田發動上衝奔在匈端謂

衝至匈也一津液掩口入涎唾涌溢出眩冒狀如厥謂不知人

知此為氣衝髀裏熱兩處獨熱非如尸厥通身粗醫名爲顛不識

亦人不灸之因大劇據產後擬小柴胡