

醫
統
三
脈
全
書

金匱鉤玄目錄

卷第一

中風

六鬱

癰

寒

傷寒

暑

注夏

暑風

濕

內傷

火

傷風

發斑

疹

溫病

瘡

咳嗽

痰

喘

哮

痢

禁口痢

泄瀉

脾泄

霍亂

乾霍亂

嘔吐

惡心

翻胃

傷食

痞

噎氣

吞酸

嘈雜

五疸

消渴泄瀉

水腫

鼓脹

自汗

盜汗

吃逆

頭風

頭痛

頭眩

眩暈

眉痛

耳聾

卷第二

心痛

腰疼

脇痛

腹痛

痛風

勞瘵

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風

夢遺

精滑

濁

淋

小便不通

關格

小便不禁

痢

健忘

怔忡

驚悸

疰

血塊

吐蟲

癥瘕

疝

腳氣

痿

發熱

陽虛惡寒

手心熱

手麻

手木

厥

面寒面熱

喉痺

纏喉風

咽喉生瘡

口瘡

酒查鼻

肺癰

肺痿

天庖瘡

漏瘡

痔瘡

腸癰

結核

脫肛

卷第三

婦人科

經水

血崩

帶下赤白

白帶并痛風

子嗣

胎前

胎動

惡阻

束胎

安胎

胎漏

子腫

難產

催生方

產後

血暈

補虛

消血塊

泄

惡露不盡

中風

發熱惡寒

小兒科

吐瀉黃疸

急慢驚風

疳病

痘瘡

腹脹

夜啼

口糜

脫囊

脫肛

木舌

癰疹

咯紅

喫泥

痢疾食積

解顱

虬蟲

口噤

風痰

癩頭

赤瘤

鼻赤

金匱鈞玄卷二

江陰朱氏校刊本

元 丹溪朱震亨著 門人戴元禮錄

心痛 卽胃脘痛

心痛雖日數多不喫飲食不死若痛方止便喫還痛
必須三五服藥後方可喫物

大凡心膈之痛須分新久若明知身受寒氣口食寒
物而病於初得之時當以溫散或溫利之藥若曰病
得之稍久則成鬱矣鬱則蒸熱熱則久必生火原病
式中備言之矣若欲用溫散寧無助火添病耶由是

古方中多以山梔爲熱藥之向導則邪伏而病易退
正易復而病易安雖然病安之後若縱恣口味不改
前非病復作時必難治之也

山梔炒去皮每十五箇濃煎湯一呷入生薑汁令辣
再煎小沸服或入芎一錢尤妙山梔大者用七箇或
九箇大概胃口有熱而作痛非山梔子不可佐以薑
汁或半夏橘紅各五黃芩三甘草一

用二陳湯加蒼芎倍加炒梔痛甚者加炒乾薑從之
反治之法心痛輕者散之麻黃桂枝重者加石鱗川

芎蒼朮梔子必炒去皮用作丸服之

凡治病必須先問平日起居如何假如心痛有因平日喜食熱物以致血流於胃口作痛用桃仁承氣湯下之切記輕者用韭汁桔梗能開提氣血藥中兼用之

以物拄按痛則止者挾虛也以二陳湯加炒乾薑和之有蟲痛者面上白斑唇紅能食屬蟲治苦練根錫灰之類脈堅實不大便者下之

痛甚者脈必伏多用溫藥不用參朮可用附子

諸痛不可用補氣藥

客寒犯胃草荳蔻丸用之熱亦可用止用一二服

草豆蔻

一錢四分裹燒熱去皮

吳茱萸

湯泡洗去梗焙

益智仁

白殭蠶

橘皮

人參

黃芪

各八分

生甘草

歸身

炙甘草

桂皮

各六分

麴末

薑黃

各四分

桃仁

七箇去皮

半夏

洗一錢

麥蘖

一錢半炒黃

澤瀉

一錢小便多減半用之

柴胡

四分

詳膈下痛多爲用之

右一十八味除桃仁另研如泥外餘極細末同桃仁

研勻用湯泡蒸餅爲丸如桐子大每服三十九食遠
用熱白湯送下旋斟酌多少用之

又方用黃荊子炒焦爲末米飲調服亦治白帶

又方脾痛用海蛤粉佐以香附末用川芎山梔生薑
煎辣湯調服爲佳

又方單用牡粉酒調下一二錢氣實不可用

腰疼 濕熱 腎虛 瘀血

濕熱腰疼者遇天陰或坐久而發者是腎虛者疼之
不已者是也瘀血者日輕夜重者是也

脈大者腎虛用杜仲龜板黃栢知母枸杞五味之類
用猪脊髓丸

脈澀者瘀血用補陰丸中加桃仁紅花

濕熱者用蒼朮杜仲黃栢川芎

痰者用南星

凡諸痛皆屬火寒涼藥不可峻用必用溫散之藥

諸痛不可用人參蓋人參補氣氣旺不通而痛愈甚
矣

臍下忽大痛者人中如黑色者多死難治也

人面上忽有紅點者多死

脇痛

肝火盛 木氣實 有死血 肝急 有痰流注

木氣實 川芎 蒼朮 青皮 當歸

龍會丸瀉火要藥

死血 桃仁 紅花 川芎

痰流注 二陳湯加 南星 蒼朮 川芎

肝苦急急食辛以散之用撫芎蒼朮血病入血藥中

行血脇痛甚者用薑汁下龍會丸肝火盛故也

咳嗽脇痛二陳湯加南星多香附青皮青黛薑汁

腹痛 有寒 積熱 死血 食積 濕痰

戴云寒痛者綿綿痛而無增減者是時痛時止者是熱也死血痛者每痛有處不行移者是也食積者甚欲大便利後痛減者是濕痰者凡痛必小便不利

脈弦强者食 脈滑者痰

滑痰多作腹痛用苔芎蒼朮香附白芷生薑汁入湯服腹中水鳴乃火擊動其水也二陳湯加黃芩黃連

梔子

凡心腹痛必用溫散此是鬱結不散阻氣不運故病在下者多屬食宜溫散之

一老人腹痛年高不禁下者用

川芎

蒼朮

香附

白芷

乾薑

茯苓

滑石

痛風

四肢百節走痛

風熱

風濕

血虛

有痰

大法主方

蒼朮

南星

川芎

白芷

當歸

酒黃芩

在上者加羌活

桂枝

桔梗

威靈仙

在下者加牛膝

防己

木通

黃栢

血虛者多用川芎

當歸

佐以桃仁

紅花

薄桂治痛風無味而薄者獨此能橫行手臂領南星

蒼朮等治之

上中下痛風方

威靈仙

錢三

南星

兩二

蒼朮

兩一

桃仁

錢五

白芷

錢五

桂枝

錢三

防己

錢半

蒼朮

兩二

黃栢二兩 紅花一錢

羌活三錢

神麴一兩

草龍膽五分

張子元氣血虛有痰濁陰火痛風

人參二兩

白朮二兩

黃栢二兩 黑色炒

山藥一兩

海石一兩

瑣陽五錢

乾薑五錢 燒灰

南星一兩

敗龜板二兩 熟地黃二兩

粥爲丸

治臂痛

半夏一錢

陳皮五分

茯苓五分

蒼朮一錢