

唐千金類方

上海千頃堂書局發行
嚴如經署

備急千金要方卷第九 傷寒下

後學三水黃恩榮幹南編述

三男 中醫學專門畢業 廣東省中醫學院附屬醫院 醫師 校對
學生 廣州中醫學院畢業 陳景山 覆校

傷寒雜治第一 熱毒喉開口苦

攻手足乾

下利

虛腫

汗不止

盜汗附

勞復第二 理食忌

陰陽易

百合第三

傷寒不發汗變成狐惑第四

傷寒發黃第五

溫瘧第六

溪毒證第七

傷寒雜治第一 論一首 灸法一首 方五十一首

論曰凡除熱解毒無過苦酢等物故多用苦參 味苦寒。本經。治心腹結氣。青箱。味苦微寒。本經。治

後結熱在胸煩渴。青箱子丸。艾。味苦微溫。肘後方。溫疫頭痛壯。梔子。味苦寒。本經。治

青箱與黃連龍膽苦參同用。艾。熱脈盛。乾。艾水煮。頓服。取汗。梔子。味苦寒。本經。治

熱葶藶。結氣。破堅。逐邪。利水。苦酒。錄。殺邪毒。烏梅。除熱。煩渴。之屬。是其要也。夫熱非

苦酢之物不解也。熱在身中。既不時治。治之。又不用苦酢之藥。此如救火。不以水也。必不可得脫免也。又曰。今諸療多用辛甘。薑桂人參之屬。此皆貴價。難得常有。比行

求之轉以失時。而苦參青箱葶艾之屬。所在盡有。除熱解毒。取良勝於向貴價藥也。前後數參并用之。得病。內熱者。不必按約次也。便以青箱苦參艾苦酒療之。但稍與促其間。無不解也。扁鵲曰。病在腠理。湯熨之所及。病在血脈。針石之所及。病在骨髓。無可奈何。而凡醫治病。或言且待。使病成。乃頓去之。此為妄矣。當預約東家中。及所部曲。具語解此意。使有病者知之為要。

毒熱邪閉

方 治溫氣病欲死

苦參一兩。以酒二升。煮取一升。盡飲之。當吐。則除。諸毒病服之。覆取汗。皆愈。

張文仲及肘後云。治熱毒氣垂死。破棺千金湯。

毒熱邪閉。溫氣病欲死。苦參。本經。治心。腹結。氣積。聚。除寒熱。專治心經之火。與黃連功用相近。黃連去心。臟之火為多。邪在心。腹當吐。或復取汗。皆借酒力以利溫行。邪有出路。凡溫毒邪閉。深伏陽分。而不出者。宜之。

毒熱火盛

苦參湯 治熱病五六日已上。

苦參 三兩

黃芩 二兩

生地黃 八兩

右三味。㕮咀。以水八升。煎取二升。適寒溫。服一升。日再。

毒熱火盛溫病五六日已上。苦參湯。倍用苦參。治心腹結氣積聚。佐黃芩。泄濕熱。加生地。瀉陰火。酒煮易水。不必吐汗。邪已內解。凡溫毒火盛。深伏陰分。而不出者。宜之。

毒熱陽厥

凝雪湯

治時行毒病七八日。熱積聚胸中。煩亂欲死。起死人。搗湯。

芫花一升。以水三升。煮取一升半。漬故布。薄胸上。不過三薄。熱即除。當溫暖。

肢護厥逆也。

毒熱陽厥。溫病七八日。熱積聚胸中。煩亂欲死。厥逆至危。

陰陽氣不相順接。手足逆冷。時脈還。手足溫者生。脈不

還者死。非氣逆也。凝雪湯。芫花破積聚痰水。性味辛溫。却利其攻下之力。漬薄胸上。熱因

寒用。故湯有凝雪之名。以止煩亂。熱解。四肢煖。而時行毒病。陽氣厥逆不通。欲死亦除。

毒熱斑出

猪膽湯

治傷寒五六日斑出。

猪膽

苦酒各三

雞子一枚

右三味。合煎三沸。強人盡服之。羸人須煎六七沸。分為二服。汗出即愈。

傷寒五六日毒熱斑出。前論除熱解毒。無過苦酢等物。猪膽湯。猪膽味苦而滑。苦酒味苦而酸。除熱解毒。以勝肝膽之火。雞子味甘而平。清氣涼血。能去心胞之熱。合煎內服。由肝膽直達肌肉。汗出即愈。方意與上傷寒宜吐第七酒膽湯及下毒熱瘡盛。

酢膽湯同。足補仲景陽毒發斑升麻煎甲所不及。

毒熱瘡盛。方二十三首

方 治內發瘡盛。

酢四合

大猪膽一具

右二味合煎三沸。服一合。日五服之。良驗。方後有猪膽和芒消塗去可以通檢。

摩方 治時行病發瘡。

取好蜜。偏身摩瘡上。亦可以蜜煎升麻摩之。并數數食之。

方 治豌豆瘡。初發覺欲作者。

煮大黃五兩。服之愈。

又 治熱病後發豌豆瘡。

黃連三兩。以水二升。煮取八合。頓服之。

又方

真波斯青黛。大如棗。水服之。瘡。

又方

青木香二兩。以水三升。煮取一升。頓服之。

傳方

小豆屑。雞子白和傅之。

傅方

苦赤黑發。如疥大。一作疾火者。煎羊脂摩傅之。

洗方 治人及六畜時氣熱病。豌豆瘡。

濃煮黍穰汁洗之。一莖是稌穰。即不瘡。瘡若黑者。搗蒜封之。黍穰小米之粘者。稌穰即高粱。

洗方

煮芸臺洗之。

拭方

婦人月水帛拭之。

浴方

小兒著。取月水汁和水浴之。

灸法

熱病後發。豌豆瘡。灸兩手腕研子骨尖上。三壯。男左女右。

木香湯 治瘡出煩疼者。

青木香 二兩

薰陸香

丁香

礬石 各一兩

麝香 半兩

右五味咬咀。以水四升。煮取一升半。分再服。熱毒盛者。加犀角一兩。無犀角。以升麻代。病輕者。去礬石神驗。

塗方

瘡上與芒消和猪膽塗。勿動。痂落無痕。仍卧黃土末上良。此病小便澀有血者。內壞瘡。皆黑靨。不出膿者。死不治也。

漏蘆連翹湯 治時行熱毒。變作赤色癰疽。丹疹毒腫。及眼赤痛。生鄴醫。

漏蘆

連翹

黃芩

麻黃

白斂

升麻

甘草

各二兩

枳實

大黃

各三兩

右九味咬咀。以水九升。煮取三升。分三服。相去五里久。更服。熱盛者。可加芒消二兩。

時行熱毒。發於週身。則赤癰丹疹。發於頭面。則赤痛目賢。漏蘆連翹湯。以漏蘆連翹。鮮皮膚。熱毒升麻。麻黃。白斂。發頭面。熱毒黃芩。大黃。枳實。瀉腸胃。熱毒甘草。解臟腑熱毒。熱盛毒深。更藉芒消。鹹潤。以助大黃。所不及。為毒熱陽癰第一法。

塗方 治毒熱攻手足。赤腫焮熱疼痛。欲脫。

猪膏和羊屎塗之亦佳。

漬方

煮馬屎。若羊屎汁漬之。日三度。

漬方

濃煮虎杖根。適寒溫。以漬手足。令至踝上一尺止。

漬方

取酒煮苦參。以漬之。

漬方

稻穰灰汁。漬之。

漬方

取常思草。絞取汁。以漬之。一名蒼耳。

毒熱喉閉

方 治傷寒熱病。喉中痛閉塞不通。

生烏扇切一斤 猪脂一斤

右二味合煎。約成去滓。取如半雞子。薄綿裹之。納喉中。稍稍咽之。取瘥。

又方

升麻 三兩

通草 四兩

射干 二兩

芍藥

羚羊角各三兩

生蘆根切一升

右六味。㕮咀。以水七升。煮取二升半。分三服。

烏扇即射干。葉叢生。橫鋪一面。如鳥翅及扇狀。俗呼扁竹。謂其葉扁生。而根如竹。花有白有黃有紅有紫。丹溪獨取紫花。必有試驗。近人呼為紫蝴蝶。開葯種紫蝴蝶根。又曰紫花扁竹根。即是此物。本經。主治喉痺咽痛。首方佐猪膏。以潤肺和胃。其力專。次方。加升麻。羚羊。解毒熱。蘆根通草。開痰熱。為藥瀉陰熱。其力厚。均良法也。

虛熱浮腫

方 治病後虛腫。

豉五升。醇酒一斗。煮三沸。及熱頓服。不耐酒者。隨性覆取汗。

虛熱自汗方五首

方 治汗不止。

地黃三斤。切。以水一斗。煮取三升。分三服。

又方

白朮方寸匕。以飲服之。

又方

白朮葉作飲飲之

汗之與血異名而同詞。汗不止即血不止。故重用地黃滋血以止汗。又脾統血脾虛不攝致汗。則用白朮補脾。或白朮葉之流走四肢者以攝之。血有所統則汗自斂。

方 治卒得汗不止。

溫酒服牛羊脂。

卒汗不止則非陰血不攝。由風濕毒氣鬱於肌膚。蒸為熱汗。取牛羊脂之甘潤去風熱毒者。借酒力以溫行。膚表散風熱而汗自收。

又方

服尿亦止。

虛熱盜汗

方六首

牡蠣散 治卧即盜汗風虛頭痛。

牡蠣

白朮

防風

各三兩

右三味治下節酒服方寸匕。日二止汗之驗。無出於此方。一切泄汗服之三。日皆愈。神驗。

虛熱盜汗。陽越頭痛。牡蠣散。防風。開肺表。杜虛風。白朮

本經止汗除熱

補脾土。除虛熱。牡蠣

斂心。陽

汗為液

止虛汗。酒服溫行一散。一斂。為風虛陽越盜汗之妙法。

方止汗。

牡蠣

杜仲等分

右二味治下節。夜臥。以水服五錢匕。

虛熱盜汗。陰虧津泄。前方去防風白朮易杜仲。補腎陰。仍用牡蠣。斂心陽。水服和濟。為風虛陰虧盜汗之妙法。

粉方

麻黃根

牡蠣

雷丸各三兩

乾薑

甘草各一兩

米粉二升

右六味治下節。隨汗處粉之。

盜汗不可無粉法。麻黃根。

麻黃發汗。根節止汗。衰以其屬。

能關能闔。雷丸。

別錄作摩膏。逐邪氣。惡風汗出。乾薑。本經溫中。

止汗。

一寒一熱仍用牡蠣。別錄一散一斂。甘草米粉和濟。粉汗之方。無以易此。

通治方

方治盜汗。及汗無時。

韭根四十九枚。水二升。煮取一升。頓服。

又方

豉一升。以酒二升。漬三日。服。不瘥更合服。不過三劑止。

洗方

死人席緣灰煮汁洗身瘡。

虛熱口苦

方 治熱病口苦下氣除熱喉中鳴煎。

石膏半升

蜜一升

右二味以水三升煮石膏取二升乃納蜜復煎取如飴含如棗核盡復合之。
大良。

熱病口苦非膽汁之上溢即胃火之上炎苦從火化其理宜然石膏甘寒清胃更藉
蜂蜜甘緩潤喉使熱氣下行口苦去而鳴煎亦止。

虛熱口乾

方 治傷熱病後口乾喜唾咽痛。

大棗二十枚

烏梅十枚

右二味合搗蜜和含如杏核大咽其汁甚驗。

熱病後口乾廉泉開陰津溢喜唾咽痛烏梅酸平斂肺生津合大棗甘平和胃止唾
更和蜂蜜潤喉止痛凡喉舌病千金多主甘潤不主苦泄此秘法也。

虛熱乾嘔方四首

枯樓湯 治傷寒中風五六日已上。但胸中煩乾嘔。

枯樓實 一枚

黃芩

甘草 各三兩

生薑 四兩

大棗 十二枚

柴胡 半斤

右六味。以水一斗二升。煮取五升。絞去滓。通寒溫。服一升。日三。

虛熱乾嘔。傷寒中風五六日已上。胸中煩。少陽火鬱。枯樓湯。即小柴胡湯。活法。柴胡生薑止嘔逆。去半夏人參用黃芩。加枯樓實。除煩滿。小柴胡加減例。若胸中煩而不嘔。不必用半夏。煩不可用人參。今并去半夏。以煩嘔津乾。惟生薑辛潤得止之。枯樓實除胸痺。小胸胸法也。甘草大棗調脾胃。上焦得通。津液得下。胃氣因和。而胸中煩乾嘔自愈。

蘆根飲子 治傷寒後嘔穢反胃及乾嘔不下食。

生蘆根 切

青竹茹 各一升

粳米 三合

生薑 三兩

右四味以水七升。先煮千里鞋底一隻。取五升。澄清下藥。煮取二升半。隨便飲。不瘥重作取瘥。

虛熱乾嘔。傷寒後反胃不下食。陽明火燥。蘆根飲子。輕用生薑止嘔穢。重用生蘆根。青竹茹清痰熱。多取粳米養胃津。尤妙。千里鞋底。即草鞋底。俗名草鞋為千里馬。取陳草以退餘熱。并履地親下。得土氣最多者。助蘆根竹茹所不及。而嘔穢反胃及乾嘔不下食亦除。

方 治傷寒後嘔穢

通草 三兩

生蘆根 升切 一

橘皮 一兩

粳米 三合

右四味㕮咀。以水五升。煮取二升。隨便稍飲。不瘥更作。取瘥止。

虛熱乾嘔。傷寒後。陽明火燥。如上法易味。生薑橘皮。止嘔噦。重用生蘆根佐通草。開痰熱。多取粳米。養胃津。而傷寒後嘔噦亦除。

方 治傷寒後。虛羸少氣。嘔吐。

石膏 一升

竹葉 二把

麥門冬 一升

人參 二兩

半夏 一升

右五味㕮咀。以水一斗。煮取六升。去滓。納粳米一升。米熟湯成。飲一升。日三

服。一方加生薑五兩。此方正是仲景竹葉湯方。前卷汁後。門中已有此方。仍少甘草。分兩小別。

虛熱乾嘔。傷寒後。虛羸少氣。陽明火燥。變上法。生薑易半夏。止嘔吐。蘆根通草。易竹葉石膏。清痰熱。麥冬人參。益虛羸。仍用粳米。養胃津。而傷寒後。虛羸少氣。嘔吐亦愈。

虛熱衄血

方 治傷寒鼻衄。肺間有餘熱。故也。熱因血自上不止。用此。

牡蠣 半兩

石膏 一兩 六銖

右二味治下篩。酒服方寸匕。日三四。亦可蜜丸。服如梧子大。用治大病瘥後。

小勞便鼻衄。

虛熱衄血。大病瘥後。肺間有餘熱。小勞血自上不止。太陰火逆。肺竅於鼻。屬太陰。石膏。清燥救肺。牡蠣。退熱。飲陰酒以行之。蜜以和之。丸以緩之。而傷寒後。小勞血自上不止。鼻衄自除。

虛熱下利方三首

方 治溫毒及傷寒內虛外熱攻胃下黃赤汁及爛肉汁赤滯下伏氣腹痛諸

熱毒

梔子二十枚

豉一升

薤白一握

右三味以水四升煮梔子薤白令熟納豉煮取二升半分三服頻服取瘥

虛熱下利溫毒及傷寒內虛外熱下黃赤汁及爛肉汁赤滯下伏氣腹痛諸熱毒仲景大病瘥後勞復原有枳實梔子豉湯今用梔子豉清心腹虛熱去枳實易薤白開腸胃滯痛而溫毒攻胃下黃赤汁及爛肉汁赤滯下伏氣腹痛諸熱毒以除

方 治傷寒後下利膿血

阿膠一兩

黃蘗二兩

黃連四兩

梔子十四枚

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓納阿膠更煎令消

分為三服

甲乙方無黃藥有黃芩

虛熱下利傷寒後但純膿血陽盛陰虛仲景婦人產後下利虛極原有白頭翁加甘

草阿膠湯今去白頭翁秦皮用黃連黃蘗加梔子吐熱以止利徐洄溪古方梔子皆人作湯以梔子炒黑不復吐全失梔子之意終當從古法生用為妙去甘草用阿膠降火以滋陰陽盛陰虛治法同而不同如此

麻黃升麻湯治傷寒六七日其人大下後脈沈遲手足厥逆下部脈不至咽

喉不利唾膿血泄利不止為難治

麻黃 知母 姜莖一作蔞蒲 黃芩各三

升麻 芍藥 當歸 乾薑

石膏 茯苓 白朮 桂心

甘草 麥門冬各二兩

右十四味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升分服

一升微取汗愈

虛熱下利傷寒六七日大下後津竭脈沈遲陽虛手足厥逆下部脈不至陰絕咽喉不利唾

膿血泄利不止上熱下寒為傷寒壞症仲景厥陰病誤下泄利原有麻黃升麻湯今

用其法麻黃升麻合桂心開發伏陷之邪黃芩石膏知母清降鬱蒸之熱姜莖麥冬

養陰津芍藥當歸排膿血白朮乾薑救厥逆茯苓甘草止泄利法微取汗邪有出路

而大下後脈沈遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止亦除

虛脫下利

赤石脂禹餘糧湯 傷寒服湯藥而下利不止心下痞堅服瀉心湯竟復以他藥下之利不止醫以理中與之而利益甚理中治中焦此利在下焦此湯主之

赤石脂

禹餘糧各一斤碎

右二味以水六升煮取二升分三服若利不止當利小便

虛脫下利心下痞堅治痞痢不止理中利益甚上熱下寒亦傷寒壞症赤石脂禹餘糧湯赤石脂禹餘糧溫下固脫培土以制水利仍不止更濬川以防河小便利而大腸亦固前方開鬼門而此則兼潔淨府矣

蟲積下利

納方 治赤白膿小兒得之三日皆死此有蠶蟲在下部

麝香

礬石

巴豆

附子

真珠

雄黃

右六味等分治合取桑條如箭籜長三寸以綿纏頭二寸唾濡綿展取藥著綿上納穀道中半日復易之日再神效

蟲積下利赤白膿小兒得之三日皆死礬石雄黃真珠清濕熱麝香辟蟲毒經本附子巴豆攻堅積綿著納穀道不傷元氣足見神奇