

外台秘要
(七)

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十五卷目錄

痢三
門

水穀痢方一十首

水痢方六首

久水痢不差腸垢方四首

冷痢方二十二首

冷痢食不消下方六首

白痢方八首

重下方六首

卒暴冷下部疼悶方二首

冷熱痢方七首

熱毒痢方三首

熱毒血痢方六首

赤痢方四首

久赤痢方二首

卒下血方七首

血痢方六首

久血痢方三首

蠱注痢方三首

腸蠱痢方一首

膿血痢方七首

赤白痢方六首

久赤白痢方四首

疳痢方六首

久疳痢及久痢成疳方九首

數十年痢方一十一首

休息痢方五首

腹肚不調痢方一首

洩痢不禁不斷及日數十行方三首

下焦虛寒及遠血近血方二首

下痢食完出及上入下出方一首

尚德按
今有方
八首

下痢腸滑方三首

大注痢及赤白困篤腸滑方二首

痢兼渴方二首

許仁則痢方七首

唐王燾先生外臺秘要方第二十五卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

進

新安後學程衍道敬通父訂梓

水穀痢方一十首

病源水穀痢者由體虛發理開血氣虛春傷於風邪氣留連在肌膚之間後遇脾胃虛弱而邪氣乘之故為水穀痢也亦與胃為表裏者脾之府也為水穀之海脾者胃之藏也其候身之肌肉而脾氣主消水穀水穀消其精化為榮衛以養其藏充實肌膚大腸肺之腑也為傳道之

病源
本同

按其
病源

通按
頭多
汗本
作頸
多汗

官化物出焉水穀之精化爲血氣者行於經脉其糟粕行於大腸也肺與大腸爲表裏而肺主氣其候身之皮毛春陽氣雖在表面而血氣尚弱其飲食居處運動勞役血氣虛者則爲風邪所傷客在肌肉之間後因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱者不能尅制水穀故糟粕不結聚而變爲痢也又新食竟取風名爲胃風其狀惡風頭多汗膈下塞不通食飲不下腹脹形瘦腹大矢衣則臍滿食寒則洞泄洞泄者痢無度也若胃氣竭者痢絕卽死診其脉小手足寒難療也脉大手足溫易療也下白沫脉沉則生浮則死身不熱脉不懸絕滑大者生懸濇者死以

尚德按
孝病源
作案

藏期之也脉絕而手足寒晬時脉還手足溫者生脉不還者死脉緩時小結者生洪大數者死懸絕而澁者死細微而滑者生緊大而滑者死得代絕脉者不死養生方云秋三月此謂客平天氣以急地氣以明早臥早起與雞俱興使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應養收之道也逆之則傷肺冬爲殭洩又云五月勿食未成核果及桃李發癰癰不爾發寒熱變黃疸又爲洩痢

出第十七卷中

廣濟療赤白水穀冷熱等痢方

地榆

六分

白朮

五分

赤石脂

七分

厚朴

六分

九字下
宋本有
急海藻
茹菜猪
同生冷
等十字

乾薑 六分

熟艾 四分

龍骨 七分

甘草 四分

黃連 十分

烏梅 六分

人參 六分

當歸 五分

右十二味擣篩為末蜜丸以米飲汁服二十九丸如梧桐

子大日三服加至三十丸 出第四卷中

集驗論黃帝問曰人若澹洩下痢者何也對曰春傷於風

夏生澹洩腸澼久風亦為澹洩也

又療熱水穀下痢黃連阿膠湯方

黃連 炙各二兩 阿膠 三十枚

烏梅 二十枚

黃蘗 一兩

右五味切以水七升煮取二升半分為再服神良 備急

用後名烏梅湯療熱下

又方

黃連

一升金
色者

陳米

五合

右二味以水七升煮取二升分再服

肘後文傳同並出
第四卷中

刪繁療中焦熱水穀下痢藍青丸方

藍青

汁三升

黃連

八兩

黃蘗

四兩

阿膠

五兩

白朮

地榆

地膚子

烏梅肉

各三兩

右八味搗篩為散用藍汁和微火上煎取可為丸丸如

杏子大飲進三丸

出第四卷中

崔氏療水穀痢方

宋本無
大字飲
字上有
滑白二

兩字下
宋本有
五水五

字凡字
下有亦

不得停

留忌猪

肉冷水

桃李

寒等十

五字

之字下

来本有

忌猪肉

冷水

乾薑 三分

雞子 二枚

小豆 二百粒

黃連 三分

右四味搗篩三味內雞子黃白中熟攪令相得微火上炒令可丸一服五十丸如小豆大旦以飲服差即停出

第三卷中

禾太香字下有中食二字停字下有忌食脂膩生冷猪肉魚蒜葱十一字

文仲療因仲夏熱多令人發水穀痢腸中鳴轉一瀉五六升水方

黃連 去毛

厚朴 各三兩

右二味切以水三升煮取一升頓服之

出第三卷中

必効療水穀痢方

小豆 一升煮臘 二兩煮

藥性論

作蠟三

疑當作

二證類

引此方

作小豆

一合和

蠟三兩

服字下
宋本有

忍猪肉
水五

字

服字下
宋本有

右三味和頓服之即愈

又方

櫻蘭皮

燒灰

尚德按
疑當作摺

右一味研以水和服三方寸匕

並出第二卷中

古今錄驗療熱水穀下痢方

黃連

阿膠

各二兩

梔子

二十枚

右三味切以水七升煮取二升分為三服

又方

黃連

當歸

甘草

炙各二兩

酸石榴皮

二兩

右四味切以水二升煮取一升半分為三服

並出第十一卷中

水痢方六首

廣濟療水痢及霍亂崔氏方同云冷痢食不消化及有白膿日夜無節度但疑是冷悉主之方

白石脂

乾薑

各八分

右二味擣篩爲末以沸湯和少許麴薄糊和藥併手捻作丸如食法下不止加乾薑八兩忌如常法

又療水痢腹中氣方

茯苓

八分

白龍骨

八分研

訶梨勒皮

八分

黃連

八分

酸石榴皮

八分

右五味擣篩爲末蜜丸空心以飲服如梧子大三十九丸

忌猪肉
油膩生
冷等八
字

之字下
宋本有

忌猪肉
冷水五

尚德按
字

牛骨灰
三字疑

當經書
連亦得

二字在
朽骨灰

日二服差止 出第四卷中

文仲療水痢百起者馬蘭散方

馬蘭子

乾薑

黃連

原無分兩

右三味為散熟煮湯取一合許和二方寸匕入腹即斷

冷熱皆治常用神效不得輕之

又方

朽骨灰

牛骨灰

亦得

神麴

炒黃

炒字上宋本有六月六日造五字

右三味等分為散空腹飲服一方寸匕無六月六日麴

時用常麴亦得御傳

並出第三卷中

經心錄主水痢方

下三味
疑當作
時珍本
草中骨
下引之
無朽骨
灰止二
味

雞子 二枚

黃臘 一兩

尚德按臘
疑當作臘

右二味熬熟食之宜空肚食之日三服佳

又方

黃連

倉米 各三兩

右二味作散和雞子七枚令熟併捻作丸煮赤豆作漿
粥服三十丸日三服若渴但飲豆漿粥

竝出第二卷中

久水痢不差腸垢方四首

病源腸垢者腸間津液垢膩也由熱痢蘊積腸間虛滑所

以因下痢而使腸垢也

出第十七卷中

肘後療水下積久不差腸垢已出者方

校下
衆本有
研字

烏梅

二
枚

右一味以水二升煮取一升頓服之

又方

石榴

一枚

右一味合皮搗絞取汁隨多少服之最良

備急療水下積久不差腸垢已出者方

赤石脂

桂心

乾薑

附子

炮

右四味等分搗篩蜜丸如小豆每服三丸日三服飲下

附後同出第六卷中

文仲治久水痢難斷方

黃連 二兩

黃蘗 二兩

阿膠 二兩
炙

右三味擣篩爲散以苦酒蜜各半升煮內阿膠令烊又
內諸藥令可丸飲服三丸日四此是古方極要

冷痢方二十二首

病源冷痢者由腸胃虛弱受於寒氣腸虛則泄故爲冷痢
也凡痢色青色白色黑皆爲冷也色黃色赤竝是熱也故
痢色白食不消謂之寒中也診其脉沉則生浮則死

出第

十七 卷中

廣濟療冷痢青白色腹內常鳴其痢行數甚疎出太多此
是冷痢宜服調中散方