

足本
大字

壽世保元

上海廣益書局
印行

增補醫林狀元壽世保元 目錄

甲集

醫說

五臟六腑脈病虛實 凡十一條

五臟補瀉主治例

十二經絡

奇經八脈

診脈

七表八裏總歸四

論五臟見四脈應病詩

內因脈

外因脈

不內不外因脈

定死脈形候歌

脈辨生死

診雜病生死候歌

診暴病歌

諸脈宜忌生死類

扁鵲華陀察聲色秘訣

診五臟六腑氣絕症候

臟腑論

血氣論

脾胃論

五運六氣論

五運主病

六氣為病

亢則害承乃制體用說

醫論

本草門

藥論

二一

藥有五法

二二

藥性歌括

共四百味

二三

乙集

中風

一

預防中風

九

傷寒

十

四時感冒

二一

中寒

二三

瘟疫

二四

瘴氣

二五

中暑

二六

中濕

二九

火症

三十

內傷

三一

飲食

二四

丙集

嗜酒傷身

三七

鬱症

三八

痰飲

一

咳嗽

四

喘急

六

哮喘

七

瘧疾

九

痢疾

十一

泄瀉

十四

霍亂

十七

嘔吐

十九

翻胃

二一

呃逆

二三

噎氣

二四

吞酸

二五

丁集

餽雜	二六
諸氣	二六
痞滿	二八
腹脹	二九
水腫	三一
積聚	三五
五疸	三八
補益	一
老人	十二
瘡冷	十五
斑疹	十六
發熱	十七
癆瘵	十九
吐血	二四
衄血	二六

戊集

咳血	二七
咯血	二七
嘔血	二七
唾血	二七
便血	二八
溺血	二九
惡熱	三十
惡寒	三十
汗症	三十
眩暈	一
麻木	二
癲狂	四
癰症	七
健忘	九
驚悸	十

怔忡	十一
虛煩	十一
不寐	十二
厥症	十二
心胃痛	十三
腹痛	十七
腰痛	十八
脇痛	二十
臂痛	二十一
肩背痛	二十一
痛風	二十二
脚氣	二十四
癩疔	二十八
瘰癧	三十
消渴	三十一
瘰癧	三十一
瘰癧	三十一

乙集

濁症	三三
遺精	三五
淋症	三七
關格	三八
遺溺	三九
小便閉	四十
大便閉	四一
二便閉	四三
痔漏	四三
體氣	四五
脫肛	四六
諸蟲	四七
頭痛	一
鬚髮	二
面病	四

耳病

五

鼻病

七

口舌

九

齒唇

十一

牙齒

十二

眼目

十五

喉痺

十九

結核

二五

癭瘤

二六

肺癰

二七

肺痿

二八

心漏

二八

庚集

婦人科

一

婦人總論

一

調經

二

經閉

七

崩漏

八

帶下

十

虛煩

十三

求嗣

十五

妊娠

十八

妊娠傷寒

二六

產育

二六

產後

二八

小產

三三

乳病

三四

乳巖

三五

通乳

三七

斷乳

三七

通治

三七

雜病

三九

痲病

四十

辛集

小兒科

論歌脈症
十五條

一

急驚

四

慢驚

五

慢脾

六

諸疳

七

積癖

八

熱症

九

感冒

十

脾胃

十一

傷食

十一

吐瀉

十二

痢疾

十四

瘧疾

十六

痰喘

十六

咳嗽

十七

發痧

十八

通治

十八

小兒初生七十症

十九

小兒五宜

十九

浴兒法

十九

斷臍法

二十

變蒸論

二十

初生雜症論方

二十

胎熱

二十一

胎寒

二十一

胎肥

二十一

胎怯

二十一

胎黃

二十一

胎驚

二十一

鎖肚

二十一

不乳

二二

撮口

二二

噤風

二二

臍風

二二

客忤

二三

不尿

二三

夜啼

二三

中惡

二四

天吊

二四

驚口

二四

口瘡

二四

重舌

二四

木舌

二五

弄舌

二五

牙疳

二五

吃泥

二五

丹毒

二六

赤遊

二六

喉痺

二六

乳癰

二六

眼疾

二六

耳膿

二六

鼻瘡

二七

頭瘡

二七

腰瘡

二七

蟲痛

二八

尾骨痛

二八

陰腫

二八

疝氣

二八

盤腸

二八

氣痛

二八

脫肛

二九

遺尿

二九

尿濁

二九

便血

二九

下淋

二九

吐血

二九

衄血

二九

小便閉

三十

大便閉

三十

水腫

三十

黃疸

三十

汗症

三十

解顱

三一

鶴節

三一

行遲

三一

語遲

三一

齒遲

三一

龜胸

三二

龜背

三二

滯顱

三二

顱陷

三二

顱填

三三

手拳

三三

脚拳

三三

痘瘡

三三

麻疹

四五

壬集

外科

癰疽

一

附骨癰

六

臀癰

六

腸癰

七

囊癰

七

懸癰	七
瘰癧	八
疔瘡	十
便毒	十
下疳	十一
楊梅瘡	十二
疥瘡	十四
癬瘡	十五
疥瘡	十六
癩風	十六
癩風	十七
癩風	十八
諸瘡	十九
膏藥	二十三
杖瘡	二十四
打傷	二十四

癸集

破傷風	二六
湯火	二七
蟲獸	二八
單品雜治	一
雜方	四
療病囊篇圖	六
神仙接命秘訣	七
通治	七
絕糧失食饑憊欲死方	十
金瘡	十
齒傷	十二
中毒	十二
骨骺	十三
邪祟	十四
五絕	十六

井塚

十七

蠱毒

十七

救荒辟穀

十八

灸法

二十一

增補醫林狀元壽世保元

戊集卷五

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

眩暈

風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩其脉風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛脉則無治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨症治

眩者言其黑暈言其轉冒言其昏眩暈之與冒眩其義一也其狀目閉眼眩身轉耳聾如登舟車之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩暈也淫慾過度腎家不能納氣歸原使諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄崩漏肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之生於血虛也又明矣以至新產之後血海虛損或瘀不行皆能眩暈是不可不推尋致病之因乎治法隨機應敵其間以升降鎮墜行焉最不可妄施汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自汗者此虛極而脫也識者將有採薪之憂

清暈化痰湯

主方治眩暈之總司也

陳皮

白半夏

白茯苓

防風

羌活

分

甘草

枳實

川芎

黃芩

白芷

細辛

南星

右剉一劑

生薑

各七分

各七分

各七分

各七分

各七分

各七分

三片水煎服。以此作丸亦可。○氣虛加人參七分白木去蘆一錢○血虛加當歸倍川芎○有熱加

黃連姜炒七分

一論頭旋眼黑。惡心煩悶。氣短促上喘。無力言語。心神顛倒。目不敢開。如在風雲中。頭若裂。身重如山。四肢厥冷。不得安臥。此乃胃氣虛損。停痰而致也。

半夏白朮天麻湯方見頭疼

一論勞役之人。飢寒眩暈者。脉虛弱也。

補中益氣湯方見內傷依本方加半夏天麻白芍熟地黃。一眩暈屬氣虛有濕痰者。依本方去

升麻柴胡加白茯苓川芎

一論陰虛大動眩暈者。脉必數也。

清離滋坎湯方見癆瘵依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許。

一論真陽不足。上氣喘急。氣短自汗。眩暈欲倒。如坐舟車。手足冷。脉沈細也。

參附湯人參錢五大附子炮三錢右剉一劑。生姜三片。水煎熱服。

一論眩暈之症。因氣虛痰火炎上故也。

清陽除眩湯人參錢六白朮去蘆一錢白茯苓一錢陳皮一錢半夏湯炮一錢明天麻八分檳榔八分旋覆花八分

甘草分四右剉一劑。生姜三片。水煎服。

一論肥白人。日常頭旋目花。卒時暈倒者。名曰痰暈。

清痰祛眩湯

天南星

姜炮半夏製姜汁

天麻

蒼木

米泔浸

川芎

陳皮

茯苓

去皮桔梗

枳壳

去穢烏藥

酒苓

羌活

各八分

甘草

分三

右剉一劑

生姜水煎

臨服入竹瀝

姜汁同服。

一論虛體之人。一時為寒所中。口不能言。眩暈欲倒。手足厥冷。

薑附湯

乾薑

兩大附子

生去皮臍一兩

右剉

每五錢

水煎

溫服。

一論一切失血過多。眩暈不醒者。

芎歸湯

川芎

當歸

各等分

右剉一劑

水煎服。

○虛甚加炮過大附子。

一論氣血兩虛而挾寒。作頭目眩暈者。

十全大補湯

方見補益

依本方

如有痰

加陳皮

半夏。

一治一人形體魁梧。不慎酒色。因勞怒頭暈仆地。痰涎上湧。手足麻痺。口乾引飲。六脉洪數。

而虛。予以為腎經虧損。不能納氣歸原而頭暈。不能攝水歸原而為痰。陽氣虛弱而麻痺。

虛火上炎而作渴。以補中益氣湯。合地黃丸料。治之而已。

一人氣短痰暈。服辛香之劑。痰盛遺尿。兩尺浮大。按之如無。予以為腎家不能納氣歸原。香

燥致甚耳。用八味丸料。三劑而愈。八味丸見補益。

一人形體豐厚。勞神喜怒。面帶陽色。口渴吐痰。或頭目眩暈。或熱從腹起。左三脉洪而有力。

予以為足三陰虧損。用補中益氣湯。加麥門冬五味。及加減八味丸而愈。

一大方痰暈湯

法半夏

錢一

橘紅

錢一

赤茯苓

錢一

黃芩

酒洗

白朮

錢一

川芎

錢一

黃連

酒炒

分七知母

分七石膏

錢一

薄荷

分五

甘草

分五

右剉一劑

生薑三片

水煎臨臥服

一生員形體魁梧。不慎酒色。因勞怒頭暈仆地。痰涎上湧。手足麻痺。口乾引飲。六脉洪數而

虛。予以為腎經虧損。不能納氣歸原而頭暈。不能攝水歸原而為痰。陽氣虛熱而麻痺。虛

火上炎而作渴。補中益氣合六味丸料治之而愈。其後或勞役。或入房。其病即作。用前藥

而愈。○一孟都憲者。氣短痰暈。服辛香之劑。痰盛遺尿。兩尺浮大。按之如無。余以為腎家

不能納氣歸原。香燥致甚耳。以八味丸料三劑而愈。○一孫都憲形體豐厚。勞神喜怒。面

帶陽色。口渴吐痰。或頭目眩暈。或熱從腹起。左三脉洪而有力。右三脉洪而無力。余謂足

三陰虧損。用補中益氣加麥門五味。及加減八味丸而愈。

十全大補丸

見補血

補中益氣湯

見內傷

八味丸

六味丸

俱見補益

麻木

脉浮而濡屬氣虛。關前得之。麻在上體。關後得之。麻在下體也。脉浮而緩屬濕。為麻痺。脉緊

而浮屬寒。為痛痺。脉澀而芤屬死血。為木。不知痛癢。內經曰。風寒暑三氣合而為痺。故寒

氣勝者為痛痺。濕氣勝者著痺。河間曰。留著不去。四肢麻木拘攣也。經又曰。痛者寒氣多

也有寒故痛也。其不痛不仁者。病久入深。榮衛之行澁。經絡時疏。故不痛。皮膚不榮。故為不仁。夫所謂不仁者。或周身。或四肢。唧唧然麻木。不知痛癢。如繩扎縛初解之狀。古方名為麻痺者是也。丹溪曰。麻是氣虛。木是濕痰死血。然則曰麻曰木者。以不仁中而分為二也。雖然。亦有氣血俱虛。但麻而不木者。亦有虛而感濕。麻木兼作者。又有因虛而風寒濕三氣乘之。故周身掣痛。兼麻木并作者。古方謂之周痺。治法宜先汗而後補。醫者亦各以類推而治之。不可執一見也。

一論麻木遍身手足俱麻者。此屬氣血兩虛。宜

加味八仙湯

當歸酒洗 川芎

熟地黃各六分 白芍酒炒八分

人參六分 白朮去蘆二錢

陳皮八分 半夏七

白茯苓

去皮一錢

桂枝三分 柴胡四分

羌活五分 防風五分

秦艽六分 牛膝六分

甘草分三

右剉一劑。生姜

一片。棗一枚。水煎。食遠服。○氣虛加黃芪蜜炒八分。

一論麻是渾身氣虛也。

加減益氣湯

黃芪蜜炒 人參

白朮去蘆 陳皮

當歸各一錢 升麻

柴胡

木香各五分

香附

青皮去穢 川芎各七分

桂枝

甘草各三分

右剉一劑。生姜棗煎服。

一論十指盡麻。并面目皆麻。此亦氣虛也。

補中益氣湯

依前方去青皮。川芎。桂枝。加麥冬。羌活。防風。烏藥。共十四味。

一論木是濕痰死血也

雙合湯 當歸 川芎 白芍 生地黃 陳皮 半夏姜炒各一錢 桃仁去皮尖八分 白茯苓去皮一錢

紅花分三 白芥子錢一 甘草分三 右剉一劑。姜十片。水煎熟。入竹瀝姜汁同服。

一論手足麻痺。因濕所致也。

香蘇散 方見感冒 依本方。加蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木瓜。

一論感風濕。手膊或痛或木。或遍身麻木。

五積散 方見中寒

一論婦人七情六鬱。氣滯經絡。手足麻痺。宜

開結舒經湯 紫蘇 陳皮 香附 台烏 川芎 蒼朮米泔浸 羌活 南星 半夏 當

歸分各八 桂枝分四 甘草分三 右剉生薑三片。入姜汁竹瀝服。

一論口舌麻木。延及嘴角頭面亦麻。或嘔吐痰涎。或頭暈眼花。惡心遍身麻木。宜

止渴消痰飲 黃連 半夏 瓜蒌仁 黃芩 白茯苓 桔梗 枳殼麸炒 陳皮 天麻

細辛 南星 甘草 右剉。生薑三片。水煎服。血虛加當歸。氣虛加人參。亦有十

指麻木。胃中有濕痰死血。加蒼朮白朮。少佐熟附子。行經中死血者。四物湯加紅花桃仁

韭菜。忌生冷魚腥。發風發熱之物。