

腰脇門

痿痺

附鶴膝陰毒

疝氣

附木腎白液偏墜陰挺

脚氣

附濕火脚心痛骨疽

厥症

附暴死急救

下竅門

泄瀉

痢疾

便血

附腸澼毒

溺血

便濁附精濁

遺精

附夢遺

淋症

附小便類

癃閉

轉胞附癰閉格

遺溺

閉結

附脾約陰結

脫肛

證治彙補 卷八

痺

證治彙補目錄

申江李用粹修之甫著

首卷

提綱門

中風

似中

傷風

附胃風

中寒

附外感陰毒
內傷真陰

暑症

附症夏濕
溫煎厥說

濕症

附風濕痺火
寒濕濕熱

燥症

火症

二卷

內因門

氣症

血症

痰症

飲症

傷食

附惡食不能食

傷酒

鬱症

附失精脫營

脾胃

勞倦

虛損

癆瘵

附傳尸癆鬱癆風癆

蟲症

三卷

外體門

發熱

惡寒

附產後惡寒呻吟

汗病

附盜汗心汗頭汗陰汗飲食汗

瘡疾

水腫

附肺脹身腫

痺症

瘰癧

四卷

上竅門

眩暈

附鬱骨頭重肝厥

頭風

附雷頭風大頭風

鼻病

附腦砂

咽喉

附伏氣疫氣

卷五

胸膈門

咳嗽

附肺痿胸痺肺癰痰火肺脹

喘急

吐血

附衄血咯血嘔血唾血咳血痰涎血齒衄血肌衄

嘔吐

附漏氣走哺食庫

痞滿

反胃

吞酸

附吐清水

曹維

附噯氣

班症

附妊婦發班發疹

破傷風

痛風

附鬼箭辨

黃病

癰風

附滇南傳歸秘方鵝掌風

麻木

頭痛

附眉棱痛腦痛

目疾

附偷針眼倒睫奉毛雀目眼

口病

附唇病齧舌舌病

面病

附類頰

耳病

附耳鳴耳痛聾耳耳聾停耳耳痒耳聾

齒病

附走馬疳齒蝕

哮喘

呃逆

噎膈

附梅核氣

惡心

消渴

癲狂

附中邪心風

癰症

驚悸怔忡

附卑慄失志

健忘

附驚恐

卷六

腹脇門

心病

附胃脘胸痛

腹痛

附腹中窄狹小腹

霍亂

積聚

脹滿

附虫蠱脹

脇痛

腰痛

附腎著

卷七

腰脇門

痿痺

附鶴膝風解休陰毒

疝氣

附木腎白液偏墜陰挺腎囊風

脚氣

附濕大脚心痛骨痛

厥症

附暴元急救法

卷八

下竅門

泄瀉

痢疾

便血

附腸風臟毒腸癖蠱毒血痔

溺血

便濁

附精濁

遺精

附夢遺鬼交

淋症

附小便類數

癰閉

附轉胞胞痺闔格

遺溺

閉結附脾約陰結

脫肛

門大唐王書翰文

倪天麒聖祥

姪邦俊彦章

上海李惺菴先生著

男 謨丕文

痿躄章

誥揆文全較

大意

肺熱葉焦五臟因而受之發為痿躄經內肺主諸氣畏火者也脾主四肢畏木者也嗜慾無節則水失所養火寡於畏而侮所勝肺得火邪則熱矣肺既受熱則金失所養木寡於畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺傷則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿作矣溪丹

內因

諸痿有皮脈筋肉骨五痿之名應乎五臟肺主皮毛脾主肌肉心主血脈肝主筋膜腎主骨髓惟喜怒勞色內藏虛耗使皮膚血脈肌肉筋膜骨髓無以運養故致痿躄補彙

外候

皮痿者色枯毛落喘呼不已肺受熱也脈痿者色赤脈溢脛縱不任地心受熱也筋痿者色蒼口苦爪枯筋攣肝受熱也肉痿者色黃肉腠肌痺不仁脾受熱也骨痿者色黑耳焦腰膝難舉

腎受熱也補

脈法

痿屬肺熱傳於五臟其脈多浮而大或尺脈虛弱或緩濇而紫要

痿挾標症

內熱成痿此論病之本也若有感發必因所挾而致有濕熱者有濕痿者有氣虛者有血虛者有陰虛者有死血者有食積妨礙升降道路者當明辨之

濕熱痿

濕熱痿者雨濕浸淫邪氣蒸脾流於四肢自覺足脛逆氣上騰或四肢痠軟腫痛或足指麻木頑痺小便赤澀脈來沉濡而數此皆濕熱在下之故所謂濕熱不攘大筋痠短小筋弛長痠短為拘弛長為痿也宜升陽燥濕禁用填補之劑補

濕痿痿

濕痿痿者肥盛之人血氣不能運動其痰致濕痰內停客於經脈使腰膝麻痺四肢痿弱脈來沉滑此膏酒色之故所謂土太過令人四肢不舉是也宜燥脾行痰補

氣虛痿

氣虛痿者因飢餓勞倦胃氣一虛肺氣先絕百骸溪谷皆失所養故宗筋弛縱骨節空虛凡人病後手足痿弱者皆屬氣虛所謂脾既病不能為胃行其津液四肢不得稟水穀氣而不用也

宜補中益氣補藥

血虛痿

血虛痿者凡產後失血後面色痿黃手足無力不能行動者也宜滋養榮血然血生於脾往往用養血藥而痿如故者脾虛不能生血也能補其脾則血自旺而痿自愈矣補藥

陰虛痿

陰虛痿者酒色過度下焦肝腎之火燭灼筋骨自覺兩足極熱上衝腿膝痠弱痿軟行步艱難不能久立脈來濡弱或左脈雖大按之無力宜峻補精血以扶肝腎補藥

血瘀痿

血瘀痿者產後惡露未盡流於腰膝或跌撲損傷積血不消四肢痛而不能運動致脈濇而乳者宜養血行瘀補藥

食積痿

食積痿者飲食大過妨礙道路升降失常脾氣不得運於四肢手足軟弱或腹膨脹痛或惡心噯氣右手脈洪弦滑者宜運脾消導從食積治俟食消積化然後補脾補藥

痢後痿

痢後腳軟脛疼或膝腫者此下多亡陰所致宜補脾兼升舉之劑若作風治則反燥其陰而痿難愈間有痢後便澀太早積瘀不清下注隊道經絡而成痿者此又當行氣逐瘀與前症迥異

矣補

痿症總辨

痿與柔風脚氣相似但彼因邪實而痛痿屬內虛而不痛三因其痿症亦有作痛者必挾火挾痰挾濕挾痰而起切不可混同風治補

治法

治痿獨取陽明因陽明經為水穀之海主化津液變氣血以滲灌溪谷而潤筋脈者也況陽明之經合於宗筋會於氣街屬於帶脈而終於督脈故陽明虛則五臟無所稟不能行血氣濡筋骨利關節則宗筋弛縱帶脈不引而為痿故古人治痿首重陽明此為氣虛者立法也其專重腎肝因腎主骨而藏精肝主筋而藏血故腎肝虛則精血竭精血竭則內火消燬筋骨為痿治當補養腎肝此為陰虛者立法也善治者辨其孰為氣虛孰為陰虛合宜而用至於七情六慾所挾多端或行痰痰或清濕熱瀉實補虛是在神而明之補

肺熱禁溫劑

若肺金壅塞陽氣不能下達兩足畏冷重綿裹蔽而外附仍熱小便澀數者宜清肺和胃若認陽虛妄投剛劑其痿必甚六要

胃虛禁寒劑

至於食少飢瘦或泄瀉者雖有內熱血虛之症必以芳香甘溫之品先復胃氣為主蓋胃為萬

物之母。質生氣血之鄉。飲食進而痿弱自健。若拘於瀉南補北之說。久任寒涼。則穀氣益衰。四末益枯矣。稟補

痰熱禁厚味

脾胃虛症。誠宜藉五味以養之。若濕痰濕熱成痿者。必須嚴戒厚味。以免生痰。蓋天產屬陽。膏梁發熱。若不淡泊。難以安全。可見虛症與實症不同。非但用藥各別。即服食亦異也。稟補

死候

骨痿久卧不能起於床者死

用藥

血分虛者。主以四物湯。加牛膝、秦艽、杜仲。獨活。有火者加黃柏。知母。有瘀血者加桃仁、紅花、丹皮、牛膝。玄胡索等。氣虛者用四君子湯。虛熱者補氣和中。湯腎虛者地黃丸。或丹溪補陰丸。虛熱者虎潛丸。虛寒者還少丹。加鹿茸。食積成痿者二陳湯加神麴。山查、麥芽、枳實。濕痰痿者二陳二朮加竹瀝、姜汁。痰火痿者二陳湯加黃芩、山梔。或黃柏、竹瀝。濕熱痿者東垣健步丸。清燥湯。膏梁壅熱者承氣湯。

附鶴膝風症

鶴膝風乃調攝失宜。虧損足三陰經風邪乘虛而入。以致肌肉日瘦。內熱食減。肢體攣痛。久則膝大而腿細。若傷於脾胃者。補中益氣湯為主。傷於肝腎者。六味地黃湯為主。若欲作膿或潰。

後十全大補湯為主皆佐以大防風湯初起須用葱熨可以內消若見症日乾頭暈並用補中益氣湯飲食少胸膨脹大便泄並用六君子湯熱來復去有時而動膿水清稀肌肉不生並用八珍十全大補湯臍腹冷疼脚膝無力頭暈吐痰小便頻數並用八味丸立齋

附陰痿症

腎乃坎象水火具焉陰陽交濟伎巧生焉故有房勞太甚宗筋弛縱發為陰痿者乃命門火衰譬之嚴冬百卉凋殘也亦有思想無窮氣鬱心腎而為陰痿者乃下焦火鬱譬如炎暑而草木下垂也火衰者桂附八味丸火鬱者知柏六味丸如腎經火鬱而陰痿者合服知柏清火堅腎之品立見其效須臨症審察不可偏認為火衰也補藥

附解休

解休者脊脉痛而少氣懶言內經形跡懈怠筋脉弛解坐行不任尺脉緩濇此即痿類也醫統

選方

虎潛丸

龜板 黃柏各四兩 知母 熟地各二兩 牛膝三兩 白芍一兩 瑣陽一兩 陳皮七錢 當歸 虎脰骨各一兩

兩 冬月加乾姜五錢末之羊肉為丸鹽湯下加附子治痿如神

清燥湯東垣治濕熱成痿

人參三錢 黃芪一錢 蒼朮 白朮各一錢 陳皮五錢 澤瀉五錢 茯苓 升麻各三錢 當歸二錢 生地

黃栢 柴胡 麥門冬 甘草 神麴 猪苓 各二 黃連 錢一 水煎服

補氣和中湯 即補中益氣湯加蒼朮黃栢白芍茯苓

東垣健步丸 治濕熱痿症

羌活 柴胡 錢各五 防風 錢三 川烏 錢一 滑石 兩 澤瀉 錢三 防己 兩 酒洗 一兩 苦參 錢一 肉桂 甘草 炙

瓜萸根 酒製 各半兩 為末酒糊丸每服煎愈風湯下愈風湯見中風

神龜滋陰丸 治足痿

龜板 酒炙 兩 黃栢 知母 兩 炒 各二 枸杞子 五味子 瑣陽 兩 乾姜 兩 末之猪脊髓為丸

小丹 珠 去風釋冷補勞益血強筋壯骨漆精固髓活血駐顏安神益智種子溫經延年益壽

熟地 肉苁蓉 酒洗 各六兩 五味子 兔絲子 酒洗 各五兩 栢子仁 天門冬 心 去蛇床子 炒 覆盆子

巴戟 酒浸 去心 石斛 兩 續斷 澤瀉 人參 山藥 遠志 心 炒 去 山茱 菖蒲 桂心 白茯苓

苓 杜仲 炒 去絲 各二兩 天雄 兩 炮 去皮 煉蜜丸溫酒下

換骨丹 治風症兼治鶴膝風

防風 牛膝 當歸 虎骨 一兩 煎 炙 各 枸杞 兩 羌活 獨活 龜板 秦艽 單薢 松節

蚕沙 兩 各一 苧根 兩 洗 二 蒼朮 兩 或酒浸或為末或酒糊丸俱可服

大防風湯 治足三陰虛外邪乘虛而入成鶴膝風症或附骨疽腫痛或不痛者

川芎 錢半 肉桂 黃芪 錢各五 白芍 附子 牛膝 錢各一 白朮 羌活 人參 防風 錢各二 炙甘

草 杜仲 熟地各五水煎服三五劑後再服調補之藥

疝氣章

大意

疝本濕熱痰乘虛下流復加外寒所束經脈收引相搏而痛丹溪專主於肝與腎絕無干涉以肝主筋下環陰器故也然究竟腎主下焦腎氣若旺客邪烏能停滯故疝症必以腎虛為本濕熱為標至於外寒則稍末耳補藥

內因

因醉飽遠行房勞忿怒激發五志之火或涉水處濕衝風冒雨外着陰冷之邪濕熱得寒內收血隊或乘虛下聚流於肝經肝性急速火復暴烈鬱極而發丹溪揆其大端有痰飲食積死血水氣鬱結之實者有氣虛血虛陰虛陷伏之虛者補藥

外候

有痛在睪丸者痛連小腹者痛在五樞穴邊者或無形或無聲或有形如瓜或有聲如蛙丹溪或攻刺腰脇或遊走胸腹或繞臍痛或搶心痛丹小腹急疾小便頻併升於上為嘔為吐墜於下為腫為脹繩墨

疝分七種

七疝者寒水筋氣血狐癩也寒疝囊冷結硬如石陰莖不舉脛痛引凡此坐卧濕地寒月涉水

冒雨或勞碌熱極坐卧磚石或風冷處使內過勞而得宜溫經散寒水疝腎囊腫痛陰汗時出

或腫

如水晶或發痒而搔

流黃水或小腹按之作水聲此醉酒行房或汗出遇風寒溫之氣聚於囊中而

得宜利水除濕筋疝陰囊腫脹或潰或痛或筋縮裏急或挺縱不收或莖中痛極作痒或白物

隨洩下流此房術丹藥積鬱不散所致宜清火解毒血疝狀如黃瓜在小腹兩傍橫骨之端俗

云便毒或罨丸偏大陰分作痛甚則血溢氣聚流入疝囊結成瘰腫此醉飽入房或撲損積怒

血流尿道所致宜和血消瘀氣疝上連腎區下及陰囊遇恚怒悲哀則氣滯而脹脹罷則散或

勞役坐馬摩擊罨丸致令腫脹此肝氣拂鬱所致宜散氣疎肝小兒每患此俗名偏氣因父精

怯弱強力入房乃胎病惟灸築賓穴可消狐疝狀如仰瓦在小腹立則出囊而腫脹疼痛卧則

歸腹而悶苦皆消上下無定如狐之晝出夜入此脾氣下陷所致宜升陽降陰令人帶鉤鉗者

是也癰疝陰囊腫硬如升如斗不痛不痒此感地氣卑濕所生故江淮之間湫澹之處多有此

疾宜導濕利水若暴發而疼痛者必兼前六症宜參治之又有得於有生之初父子相傳習以

為常此稟先天之氣非三因所致之疾不可治也

疝若在女子則前陰突出後陰痔核亦皆疝

類但不名疝而名瘕故經云任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕瘕

疝病分辨

疝必罨丸先痛次連小腹次攻胸脇有自下而上之象若小腸氣者臍傍鈞痛連及腰脊膀胱氣者腫脹溺澀手按有聲腎氣脹者臍下遶身撮急引痛或連胯內三症之發必從腹而下及

畢九有自上而下之象其偏墜木腎者惟畢九為病而無攻衝諸症

補

疝分寒熱

疝病本熱標寒言熱者言其本言寒者論其標大要熱多者遇熱即發二便赤澀小便肛門俱熱外腎累垂玉莖挺出寒多者遇寒即發二便清利小腹腰脇清冷外腎緊縮玉莖痿軟門又寒多則痛熱多則腫濕多重墜然虛疝亦下墜不可不知也

補

內外虛實

大抵外遇寒邪必兼頭疼寒熱內鬱濕熱必帶陰囊紅腫勞傷肝脾者兼下血黃瘦勞傷肝腎者必腰痠遺濁上下而痛者多邪氣之衝逆下墜而痛者多元氣之下陷

補

疝分左右

畢九有兩左屬水水生肝木木生心火三部皆司血統納左之血者肝也右屬火火生脾土土生肺金三部皆司氣統納右之氣者肺也故諸寒收引則血泣而歸肝下注於左九諸氣臃鬱則濕隊而歸下注於右九其患左者痛多腫少患右者痛少腫多

補

疝分氣積

疝痛無形走注不定者七情四氣內搏而然疝痛有形不移其處者痰瘀食積下聚而成

補

疝久成積

凡疝久則成積盤附臍之上下左右為癥為瘕作痛不已或變瘰癧或發奔豚

補

脈法

肝脈大急而沉為疝寸脈弦緊為寒疝跌陽脈虛遲亦為寒疝疝脈牢急者生弱急者死

治法

外寒束熱者開散外寒疏通內熱祛逐肝經之濕熱消導下焦之瘀血以寒因熱用之法立方處治則邪易伏而病易除傳若寒積下焦者非大熱之劑則不能愈諫如熱鬱肝經者非滲利之品則不能痊補

治禁預補

諸疝皆屬於肝肝欲散急食辛以散之此疾雖因虛而得然不可虛而驟補所謂邪之所湊其氣必虛留而不去其病為實故必先滌其所蓄之邪然後議補本事方

溫散

疝因陰邪湊腎寒氣上攻小腹結塊下墜羣丸堅緊如石得煖漸消得寒愈脹其氣併入前後腰臍各道筋中上攻入胃則大嘔大吐戰慄畏寒此下焦地氣上衝宜以參附薑桂大劑非尋鬱熱比也補

補虛

有勞役而發者其脈不甚沉緊而豁大無力其痛不甚猖蹶而重墜牽引羸瘦少氣嘔吐少食瀉利胸滿洒淅寒熱者當以參朮桂附為君略以疏導藥佐之若泛用剋伐必變攻胃冲心而

死
補

危症

症久虛甚上為吐逆下有遺精者危咬牙戰慄冷汗反汗者凶

用藥

主以二陳湯寒症加肉桂小茴玄胡香附吳萸川椒水疝猪苓澤瀉蒼朮防已筋疝黃柏山梔赤芍甘草胆草大豆血疝赤芍玄胡歸尾香附丹皮牛膝氣疝青皮香附枳實木香烏藥橘核川棟狐疝柴胡升麻乾葛蒼朮癰疝或得於胎元或經年久病者不必治之如遇外感而發痛甚者參前六法治之痰加桃仁痰加海石鬱加木香虛加故紙紅腫加山梔赤芍冰冷加吳茱乾姜積濕過多陰汗如雨倍蒼朮加白芷溫鬱成熱皮寬燥痒加木通澤瀉中焦虛疝脈濡者四君子加川練下焦虛疝脈沉細者八味茴香丸或八珍湯加肉桂至於濕熱為病俱宜瀉南補北不可妄用剛劑如烏頭附子之類

附木腎症

木腎者外腎堅硬頑痺不痛不痒陰莖不垂常如麻木便溺之時悶脹不順此腎家虛憊陰陽不交水火不濟而沉細癰冷凝滯其間未可純用燥藥當行溫散溫利以逐其邪俾水火交媾榮衛流行如寒回春谷自然得愈間有跌蹠驚恐痰氣瘀滯者當消瘀行氣佐以溫散之品補藥

附偏墜症