

济世良方



戒鴉片煙癮盡絕根株良方

梔子肉

殺虫潤肺
宜通諸竅

拾兩搗為細末用柳寄生

驅除筋絡毒氣
身體則不作痛

五錢煎水浸梔末三日後攤開晒乾為廣柳寄生惟四川省

最多如本處難覓即在柳柯中栽種忍冬藤根護微土待發

新枝葉

取用

北瓜乾

能解鴉片
毒性

三兩又名金盞

瓜去子皮削片晒

乾研末用灸升麻

提氣升陽
不致洩泄

三錢煎水浸瓜末五日

大生

地

滋陰
生血

五兩咀片生搗細膩各藥忌火炒名為雙合法製

黑紗糖

消臍疔
積垢

八兩合煉為小丸癮重者每服三錢輕者二

錢用生芪為引

壯脾
益氣

壹錢煎湯半茶杯癮前吞服食烟幾遍

服丸幾次。無論遠年近日。癮之大小。不須半月。毒癮莫不解。淨永無後患。此丸本宅布送十餘年。百服百效。此方於道光十六年八月初一日。會呈稟。

兩廣總督鄧蒙。批仰各屬刊示廣布。并在督署內合藥施散。嗣於道光十八年九月初三日。復抄此方呈稟。

兩江總督陶亦蒙。批仰各屬照此刊刻曉示。卽承江寧。

沈太守。在本省救生局。並天喜祠。兩處製藥。設局施散。當此功令森嚴之際。凡吸食者。莫不盡絕根株。然鴉片流毒天下。至大。人數至多。聞現賣戒烟丸內。每用參茸。價值昂貴。不便貧家。

且以烟膏烟灰爲引致滋息酸之弊所以戒烟者往往旋戒
乃旋思吸食若不吸食則慙慙待斃欲斷絕淨盡又無良方
可憑輾轉遷延痛恨無地倘一疎漏勢被查拏若逾限期立
遭惡戮之苦余不忍坐視重刊前方廣爲激勸並製藥丸施
送但此藥工只費三四百文可解數人之癮伏冀

仁人君子垂鑒照此推行廣布濟救迷途不惟活無窮民命抑且保
無數身家天相吉人功德無量

今又附方專治悞服烟膏烟灰爲癮之丸并解毒癮經驗

生番瓜四兩去皮切片 白蜜壹兩五錢 真燒酒壹兩 三

台爲一用砂鉢隔水蒸燉一炷香每日癰前食不須半月毒

癰盡絕

神效良藥久聞古人也
江寧顧氏撰刊製藥奉送

凡人患此症者宜早服此藥
其效如神

此藥乃藥上只費三四百文
凡患此症者宜早服此藥

凡人患此症者宜早服此藥
其效如神

凡人患此症者宜早服此藥
其效如神

凡人患此症者宜早服此藥
其效如神

凡人患此症者宜早服此藥
其效如神

濟世良方目錄

卷一

急救五絕
自縊
墻壓
溺死
魘魅
凍死
餓死

斷腸草
中砒八
鹽鹵二
河豚毒三
白果毒二

雷擊
水銀毒
鉛粉毒
中蠱三
中煤
洋烟毒

解諸毒二
湯火傷六
中風中痰十一
中暑等九

藥酒二
半身不遂
骨痛四
中寒
傷寒五
感冒二

中濕
骨痛三
陰症
縮囊二
瘟疫十八
痰飲四

諸咳九
哮喘五
瘧疾三方
瘧疾六
痢疾十五

霍亂十四
胃冷熱吐三
噎膈七
痞積四
酒驚

鼓脹十三
黃黑疔六
癆嗽
吐血
灸癆疔方

臟毒四
火症
熱毒
大便血四
溺血
血淋五

諸汗五
驚悸
不寐三
風狂顛三
猪羊顛二
三消

四
赤白濁四
夢遺三
久淋二
小便頻數
血淋

大小便閉十一
脫肛五
偏正頭風九
頭眩
雀班點

六
眼疾十
耳聾四
虫入耳六
鼻疾七
酒瘡三

鼻疳
鼻瘡
唇瘡
舌腫舌瘡五
口臭三
牙痛十五

走馬疳五
固齒
烏鬚
落牙
喉症十八
尖音

心胃痛十二 心腹不快 小兒虫積肚痛二 腹扁瀉

護臍丸 酒肉過多脹滿 腰痛三 脇痛 疝氣八

骨節腰痛 腿膝 鶴膝三 脚氣寒濕 綉毬風 鷄眼

癩瘡 手指鵝掌風四 手指蛇頭三 凍瘡 金蓮方

卷二

腫毒灸法二 四妙湯 二妙湯 陽和湯 九 鐵筆圈

赤金箍 紫金箍 葱歸湯 透膿散 梅花五氣丹

三生散 肺癰 疔毒 對口 發背反搭 一筆消治發

背各疔等方三十 爛腿脚三 收口二 馬齒莧治法十五

對口 四

楊梅結毒 三

一便毒 十一

爛膝

赤白遊毒 七

風濕乳癰乳吹 八

大麻風 五

癩串 八

痔漏 十二

疥瘡 七

癩疥 三

癬 十三

癩瘡

坐板瘡

汗斑

白蛇纏

天蛇寄毒

蠟燭瀉

久濁

狐臭

杖瘡 五

杖撻 六

跌打損傷 十四

刀傷 四

金瘡鉄扇散等 十

破傷風

人咬

狗咬

虫獸咬

蛇咬 十

蝎咬 七

蜈蚣咬 六

黃蜂咬

蜘蛛傷

蚯蚓傷

鼠傷

辟蚊蚤

三

除臭虫 三

誤吞針錢鉄等 十

誤吞螞蝗

吞木屑

鷄魚骨硬 十一

治酒醉

鬼箭風

尿坑

狐媚

脫頰

飛絲入目 魔魘 明目 保養 禿髮再生 生鬚髮
廣濟丹 陰症 頭痛 痲痧 爛喉 天地交禁忌
食諸毒須知

卷三

兒科慈幼編各類 稀痘神方 不出痘方 急慢驚風
眼內生痘 達生編真言 難產七因 種子丸 八仙糕
調經至言 回生方論 資生丹方 資生丹治法

天醫日 馬猪狗病 避水鬼

卷四

竹林寺女科凡九十一症

絮酒加味芎歸湯 佛手散 生化湯 愈風散 難產方

安胎催生方 通乳方 砭石丸

急救五絕良方

一曰自縊。二曰墻壁壓。三曰溺死。四曰魘魅。五曰凍死。
凡五絕者。皆以半夏爲末。冷水爲丸。如豆大。納鼻中。卽愈。心溫者。一曰可治。又治倅死。此丸納鼻中愈。

一救自縊死。凡自縊高懸者。徐徐抱住。解繩。不可絕斷。上下安被。放倒。微微搥正喉嚨。以手掩其口鼻。勿令透氣。一人腳踏其兩肩。以手挽其頂髮。常令絀急。勿使緩縱。一人以手摩盪其胸臆。屈伸其手足。若已殪直。漸漸強屈之。人以脚裹衣。抵其糞門。

若婦人併陰門勿令洩氣。又以竹管吹其兩耳。候氣從口出。呼
吸眼開。仍引按不住。須臾以小薑湯。或清粥灌合喉潤。漸漸能
動乃止。此法自旦至暮。雖已冷可治。自暮至旦。陰氣盛難救。心
下微溫者。雖一日以上亦可治。自發百中。一法半夏末吹鼻
中。一法氣已脫極重者。只灸湧泉穴。男左女右脚心。灸三壯
卽活。一法男用雌雞刺雞冠血滴入口中卽活。不可將茶水
灌。

救水溺死。凡溺死者。先以刀幹開溺者口。橫放筋一隻。令其牙
啣之。使可出水。又令一健夫屈溺人兩足。著肩上。以背相貼。倒

駢而行令其出水仍先用燥土置地上將溺者仰卧其上更以土覆之止露口眼自然水氣瀉入土中其人卽醒仍急用竹管於口耳鼻臍糞門內迭更吹之令上下相通又用半夏末搗其鼻又用皂角末綿裹塞糞門須臾出水卽活一方艾炙臍中卽活一方將溺死之人用梯乘其人倒放用鹽塞滿鼻又填滿臍鹽化卽醒

一救凍死凡凍死及冬月落水微有氣者脫去濕衣隨解活人熱衣包煖用米炒熱囊盛熨心上冷卽換之或炒灶灰亦可候身漏煖日開氣回後以溫酒或薑湯粥飲灌之若先將火炙必死

一法用雄黃煇硝各等爲末點兩眼角。倘或微笑須急掩其口。如不掩則笑不止不可救矣。

一救壓死凡壓死及墜跌死。心頭溫者。急扶坐起。將手提其髮。用半夏末吹入鼻內。少甦。以生薑汁同香油攪勻灌之。次取散血藥服。如無藥小便灌之。一取東向桃柳枝各七寸煎湯灌下。一救魘魅。凡中惡魘死者。不可近前呼叫。但唾其面。不醒卽咬脚。

跟及拇指。畧移動臥處。徐徐喚之。原無燈不可用燈照。待少醒。以皂角末吹鼻取嚏。凡溺縊魘死。急取韭菜汁灌鼻中。得。

角末麝香同灌更快捷。一男子被鬼擊。身有青痕作痛者。用。

金銀花二三兩煎湯飲之極效。一治客忤倖死還魂湯方

麻黃去節二兩 杏仁去皮尖七十粒 甘草兩 水二碗煎至一碗灌之。諸倖死

者通用。溺死。魘死。諸厄。暗中雖牽。擾鬼祟。然非無因。至前若寬

救良方。因刊印行世。凡七孔出血者不治。

俾共知之存誠附識。

救餓死餓俄將死之人切不可驟與粥飯。食恐臟腑不常反速其

死。須先用稀米湯緩緩灌下。候甦醒時。漸與粥食。亦須少與。又

用布浸熱水。熨其臍腹。以回元氣。勻可回生。

救食斷腸草急以生羊血灌之。即愈。遲則腸斷不救矣。

救中砒霜毒。防風末水調服。或石膏調冷水服。或刺羊血服。或飲

生藥豆汁或搗烏柏樹根汁服或用降香末四兩濃煎服皆驗

白礬末西新汲水調灌下喉卽活凡服砒之人不可睡卧恐毒

流四肢用葉豆粉兩銀硃一錢雞蛋清箇油半盞調服連砒吐出愈

或生麻油一碗灌之立愈

中鹽滷毒飲生豆腐漿卽解或服生豆汁或鴨旦數個打爛連

黃生吃卽吐吐出愈

中河豚毒飲胡麻油或大豆汁或橄欖汁均可解

中白果毒用木香滾水磨入麝少許服之卽解或白果殼

搗爛煎服