

傷寒雜病論

傷寒雜病論卷第八

漢長沙太守南陽張機仲景述

問曰。病有結胸。有臧結。其狀何如。答曰。按之痛。寸脈浮。關脈沉。名曰結胸也。

何謂臧結。答曰。

通行本錯簡在
如結胸狀條

臧結者。五

藏各具。寒熱攸分。宜求血分。血凝結而氣

阻。雖有氣結。皆血為之。假令肝藏結。必在
左。左脇下痛而嘔。脈沉弦而結。宜吳茱萸
湯。若發熱不嘔。此為實。脈當沉弦而急。宜
桂枝當歸丹皮桃核枳實湯主之。
通行
本佚

吳茱萸湯方

吳茱萸

洗一升

人參

三兩

生薑

六兩

大棗

十枚
二擘

右四味。以水七升。煮取二升。去滓。溫服。

七合。日三服。

桂枝當歸丹皮桃核枳實湯方

桂枝 二兩
當歸 二兩
丹皮 三兩

桃核 二十枚
去皮尖
枳實 二兩

右五味。以水八升。煮取三升。溫服一升。五合。日再服。

心藏結。必心中痛。鬱鬱不樂。脈大而澹。宜連翹阿膠半夏赤小豆湯主之。若心中熱痛而煩。脈大而弦急。此為實。宜黃連阿膠

半夏桃核茯苓主之。

通行
本佚

連翹阿膠半夏赤小豆湯方

連翹

二兩

阿膠

一兩

半夏

半升

赤小豆

三兩

右四味。以水四升。先煮三物。取二升。去

滓。內膠烱消。溫服七合。日三服。

黃連阿膠半夏桃核茯苓湯方

黃連 三兩 阿膠 二兩 半夏 半升

桃核 二十枚 茯苓 三兩

去皮尖

右五味。以水五升。先煮四味。取二升。去滓。內膠烱消。溫服一升。日再服。

肺藏結。胸中閉塞。喘咳善悲。脈短而澹。宜百合貝母茯苓桔梗湯主之。若咳血胸中

痛。此為實。宜葶藶半夏丹皮大棗湯

主之。

通行
本佚

百合貝母茯苓桔梗湯方

百合

七枚

貝母

三兩

茯苓

三兩

桔梗

二兩

右四味。以水七升。煮取三升。分温三服。

葶藶半夏丹皮大棗湯方

葶藶

一

葶藶

丸熬令黃色搗如雞子大括萋實大者一枚搗一

半夏 一升

牡丹皮

三兩

大棗

十二枚

右五味以水六升。煮取三升。分溫三服。

脾藏結。腹中滿痛。按之如覆杯。痛甚則吐

黃水。食不化。脈伏而緊。宜白朮枳實桃仁

乾薑湯主之。若腹中脹痛不可按。大便初

溘後鞭。轉失氣。此為實。宜大黃丹皮厚朴。

半夏茯苓甘草湯主之。
本通行

白朮枳實桃仁乾薑湯方

白朮二兩枳實一兩桃仁二十枚乾薑二兩

右四味。以水五升。煮取二升。溫服一升。

大日再服。

大黃丹皮厚朴半夏茯苓甘草湯方

大黃三兩牡丹皮二兩厚朴三兩

半夏一升茯苓四兩甘草二兩

右六味。以水六升。煮取三升。溫服一升。

日再服

腎藏結。少腹鞞。隱隱痛。按之有核。小便時

清時濁。脈沉細而結。宜桂枝附子茯苓丹
皮湯主之。若小腹急痛。小便赤數。此為實。

脈當沉緊而急。宜附子桂枝黃柏丹皮茯苓

苓湯主之。通行本佚

桂枝附子茯苓丹皮湯方

桂枝二兩 附子

一枚

茯苓

三兩

丹皮

三兩

右四味。以水五升。煮取二升。溫服一升。

附子桂枝黃柏丹皮茯苓湯方

附子炮一枚桂枝二兩黃柏皮二兩

牡丹皮三兩茯苓三兩

右五味。以水六升。煮取二升。溫服一升。

師曰。如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸脈

浮。關脈小細沉緊。名曰藏結。舌上白胎滑者。難治。

藏結無陽證。不往來寒熱。一云寒而不熱其人反

靜。舌上胎滑者。不可攻也。

病發於陽。而反下之。熱入。因作結胸。病發

於陰。而反下之。一作汗出因作痞也。所以成結

胸者。以下之太早故也。結胸者。項亦強。如
柔瘕狀。下之則和。宜大陷胸丸方。

大黃 半斤

葶藶子

半斤 熬

芒消

半斤

杏仁

半斤 去皮 尖熬黑

右四味。搗篩二味。內杏仁芒消。合研如

脂。和散。取如彈丸一枚。則搗甘遂末一

錢七。白蜜二合。水二升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下更服。取下為效。

禁如藥法。

結胸證。其脈浮大者。不可下。下之則死。

結胸證。悉具。煩躁者亦死。

太陽病。脈浮而動數。浮則為風。數則為熱。

動則為痛。

通行本多數則為虛四字

頭痛發熱。微盜汗

出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數

變遲。膈內拒痛。

一云頭痛即眩頭

胃中空虛。客氣動

高。短氣躁煩。心中懊懣。陽氣內陷。心下因

鞭。則為結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但

頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身