

中焦

葉氏
增批

溫病條辨

附歌括

溫病條辨目錄

卷首

原序 四首

凡例 十四條

原病篇 引經十九條

卷一

上焦篇 法五十八條方四十六首

風溫

溫熱

溫疫 溫毒 冬溫

暑溫

伏暑

濕溫 寒濕

溫瘧

秋燥 霹靂散方

卷二

中焦篇

法一百零二條方八十八首外附三方

風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

暑溫 伏暑

寒濕

濕溫 瘧痢疽痺附

秋燥

卷三

下焦篇

法七十八條方六十四首圖一首共二百三十八法一百九十八方

風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

暑溫 伏暑

寒溫 便血咳嗽疳癆附

濕溫 瘡痢疽痺附

秋燥

卷四

雜說

汗論

方中行先生或問六氣論

傷寒註論

風論

醫書亦有經史子集論

本論起銀翹散論

本論粗其規模論

寒疫論

僞病名論

溫病起手太陰論

燥氣論

外感總數論

治病法論

吳又可溫病禁黃連論

風溫溫熱氣復論

治血論

九竅論

形體論

卷五

解產難

解產難題詞

產後總論

產後三大證論一

產後三大證論二

產後三大證論三

產後瘀血論

產後宜補宜瀉論

產後六氣爲病論

產後不可用白芍辯

產後誤用歸芎亦能致癰論

產後當究奇經論

下死胎不可拘執論

催生不可拘執論

產後當補心氣論

產後虛寒虛熱分別治論

保胎論一

保胎論二

卷六

解兒難

解兒難題詞

兒科總論

俗傳兒科爲純陽辯

兒科用藥論

兒科用藥禁

瘵因質疑

濕瘵或問

瘵有寒熱虛實四大綱論

小兒瘵病瘵共有九大綱論

小兒易瘵總論

瘵病瘵病總論

六氣當汗不當汗論

疳疾論

痘證總論

痘證禁表藥論

痘證初起用藥論

治痘明家論

痘瘡稀少不可恃論

痘證限期論

行漿務令滿足論

疹證

瀉白散不可妄用論

萬物各有偏勝論

草木各得一太極論

新評

溫病條辨卷二

吳塘鞠通氏著

朱武曹先生點評

楊州葉霖批

紹何廉臣先生增註

汪慈菴先生參訂

興馬小琴先生參閱

徵以園先生同參

中焦篇

風溫

溫熱

溫疫

溫毒

冬溫

暑溫

(二)面目俱赤。語聲重濁。呼吸俱粗。大便閉。小便濇。舌苔老黃。甚則黑。有芒刺。但惡熱。不惡寒。日晡益甚者。傳至中焦。陽明溫病也。脉浮洪躁甚者。白虎湯主之。脉沉數有力。甚則脉體反小而實者。大承氣湯主之。暑溫濕溫溫瘧。不在此例。

陽明之脉榮於面。傷寒論謂陽明病。面緣緣正赤。火盛必克金。故目白睛亦赤也。語聲重濁。金受火刑而音不清也。呼吸俱粗。謂鼻息來去俱粗。其

論陽明當下證亦頗精確。辨

呼吸來去。其
粗平等。尤覺
仔細。然須腹
滿耕痛。方可
用承氣也。

外感風溫熱
陽明實證。宜
用承氣。大下
者。甚少。設挾
濕。尤不當下。
溫疫則非下不
可。蓋蘊鬱疫
邪。必須釜底

粗也平等。方是實證。若來粗去不粗。去粗來不粗。或竟不粗。則非陽明實證。當細辨之。粗則喘之漸也。大便閉。陽明實也。小便濇。火腑不通。而陰氣不化也。口燥渴。火燦津也。舌苔老黃。肺受胃濁。氣不化津也。按靈樞論諸臟有舌苔之明文。餘則無有。可見舌苔乃胃中濁氣。薰蒸肺臟。肺氣不化而然。甚則黑者。黑水色也。火極而似水也。又水勝火。大凡五行之極盛。必兼勝已之形。芒刺苔久不化。熱極而起堅硬之刺也。倘刺軟者。非實證也。不惡寒但惡熱者。傳至中焦。已無肺證。陽明者。兩陽合明也。溫邪之熱。與陽明之熱相搏。故但惡熱也。或用白虎。或用承氣者。證同而脉異也。浮洪躁甚。邪氣近表。脉浮者不可下。凡逐邪者。隨其所在。就近而逐之。脉浮則出表為順。故以白虎之金。以退煩熱。若沉小有力。病純在裏。則非下奪不可矣。故主以大承氣。按吳又可溫疫論中云。舌苔邊白。但見中微黃者。即加大黃。甚不可從。雖云傷寒重在誤下。溫病重在誤汗。即誤下不似傷寒之逆之甚。究竟承氣非可輕嘗之品。故云。

抽薪。故吳氏達原飲後。多用下法也。通於溫熱。溫疫。模糊莫辨。反。謾又可之非。外感風寒。風熱。之邪。由皮毛。傷經。布周身。孫絡中之營衛。其孫絡中之氣。血行遍一身。併入絡脉。而至心。遞出於肺。伏邪內發。由經脈之營衛。而出諸氣街。而達經。布周身。孫絡。以出。毛竅。經言絡谷。是血氣出入所由之徑也。足太陽周繞一身。而手太陰亦主皮毛。麻黃湯。為太陽表劑。而皆瀉肺之藥也。其義可

舌苔老黃。甚則黑有芒刺。脉體沉實的。係燥結痞滿。方可用之。

或問予言溫病以手經主治。力闢用足經藥之非。今亦云陽明證者何。陽明特非足經乎。曰。陽明如市。胃為十二經之海。土者萬物之所歸也。諸病未有不過此者。前人云傷寒傳足不傳手。誤也。一人不能分為兩截。總之傷寒由毛竅而谿。谿肉之分理之小者。由谿而谷。谷肉之分理之大者。由谷而孫絡。孫絡。絡之至細者。由孫絡而大絡。由大絡而經。此經即太陽經也。始太陽終厥陰。傷寒以足經為主。未始不關手經也。溫病由口鼻而入。鼻氣通於肺。口氣通於胃。肺病逆傳。則犯心包。上焦病不治。則傳中焦。胃與脾也。中焦病不治。即傳下焦。肝與腎也。始上焦終下焦。溫病以手經為主。未始不關足經也。但初受之時。斷不可以辛溫發其陽耳。蓋傷寒傷人身之陽。故喜辛溫。甘溫苦熱。以救其陽。溫病傷人身之陰。故喜辛涼。甘寒甘鹹。以救其陰。彼此對勘。自可瞭然於心目中矣。

知。然熱邪傷氣。肺主氣。故先傷乎肺也。逆傳入心包。順傳入胃府。自然之理。外感由毛竅而孫絡。而谿谷。而絡脈。而藏府。而伏氣由藏府而經脈。而谿谷。而孫絡。而皮毛。而通。而營衛血氣。循行之道。亦不知伏氣內發之因。故孫絡谿谷顛倒若是耳。

白虎湯

方見上焦篇第七頁

大承氣湯方

大黃 六錢

芒硝 三錢

厚朴 三錢

枳實 三錢

水八杯。先煮枳朴。後納大黃芒硝。煮取三杯。先服一杯。約二時許。得利止後服。不知再服一杯。再不知再服。

（方論）此苦辛通降。鹹以入陰。法承氣者承胃氣也。蓋胃之爲腑。體陽而用陰。若在無病時。本係自然下降。今爲邪氣蟠踞於中。阻其下降之氣。胃雖自欲下降。而不能。非藥力助之不可。故承氣湯通胃結。救胃陰。仍係承胃腑本來下降之氣。非有一毫私智穿鑿於其間也。故湯名承氣。學者若真能透徹此義。則施用承氣。自無弊竇。大黃蕩滌熱結。芒硝入陰軟堅。枳實開幽門之不通。厚朴瀉中宮之實滿。

厚朴分量不似傷寒論中重用者。治溫與治寒不同。畏其燥也。

曰大

陰瀉亢甚之氣。陽也。瀉亢甚之氣。不用芒硝。而亦名承氣者。是承制胃府太。過之氣。所以通泄小腸。而上承胃氣者也。乃調和胃氣。而承上君火之熱者。也。以未成糟粕。故無用枳。樸之去留。滯也。此三承氣之義也。

承氣者。合四藥而觀之。可謂無堅不破。無微不入。故曰大也。非真正實熱。蔽竈。氣血俱結者。不可用也。若去入陰之芒硝。則云小矣。去枳朴之攻氣。結。加甘草以和中。則云調胃矣。

（二）陽明溫病。脉浮而促者。減味竹葉石膏湯主之。

脉促謂數而時止。如趨者過急。忽一蹶然。其勢甚急。故以辛涼透表重劑。逐邪外出則愈。

減味竹葉石膏湯方

辛涼合甘寒法

竹葉 五錢

石膏 八錢

麥冬 六錢

甘草 三錢

水八杯。煮取三杯。一時服一杯。約三時令盡。

（三）陽明溫病。諸證悉有。而微脈不浮者。小承氣湯微和之。

以陽明溫病發端者。指首條所列陽明證而言也。後凡言陽明溫病者。做

不有陽識有燥識者語則則經可虛識
渴下而語火者語是。虛實曰。僅實語
而利識者。裁固也。虛。則實精邪承分證
識清語有汗。涸傷鄭則氣氣。
語穀者。亡而然尿寒聲識奔盛。非有

此諸證悉有。以非下不可。微則未至十分亢害。但以小承氣通和胃氣。則愈。無庸芒硝之軟堅也。

(四)陽明溫病。汗多譫語。舌苔老黃而乾者。宜小承氣湯。

汗多。津液散而大便結。苔見乾黃。讞語。因結糞而然。故宜承氣。

(五)陽明溫病。無汗。小便不利。讞語者。先與牛黃丸。不大便。再與調胃承氣湯。

無汗而小便不利。則大便未定成鞭。讖語之不因燥屎可知。不因燥屎而讖語者。猶係心包絡證也。故先與牛黃丸。以開內竅。服牛黃丸。內竅開。大便當下。蓋牛黃丸亦有下大便之功能。其仍然不下者。無汗則外不通。大小便俱閉。則內不通。邪之深結於陰可知。故取芒硝之鹹寒。大黃甘草之甘苦寒。不取枳朴之辛燥也。傷寒之讖語。舍燥屎無他證。一則寒邪不兼穢濁。二則由太陽而陽明。溫病讖語有因燥屎有因邪陷心包。一則溫多。

語者。有下血而識。氣可治。豈皆承。傷寒。誤語。而以。燥尿。無他。證。舍。語。論。之。是。傷。寒。論。未。全。讀。耳。外。感。風。溫。自。上。焦。而。來。多。傳。心。包。溫。疫。初。由。內。發。多。聚。胃。府。此。則。微。言。溫。多。兼。穢。而。自。上。焦。心。肺。而。來。風。溫。溫。疫。不。分。其。幾。希。不。歧。路。亡。羊。者。

在溫疫為內發。伏邪。乃陽鬱熱。厥。氣。道。壅。閉。極。之。危。候。自。宜。大。承。氣。急。下。存。陰。若。風。溫。證。乃。熱。邪。內。蘊。與。三。焦。相。火。相。煽。走。竄。心。包。

兼穢二則。自上焦心肺而來。學者常須察識。不可歧路亡羊也。

(六)陽明溫病。面目俱赤。肢厥甚。則通體皆厥。不瘧癰。但神昏不。大便七八日以外。小便赤。脉沉伏。或並脉亦厥。胸腹滿堅。甚則拒。按喜涼飲者。大承氣湯主之。

此一條。須細辨。其的是火極似水。熱極而厥之證。方可用之。全在目赤。小便赤。腹滿堅。喜涼飲定之。

大承氣湯 見前第二頁

(七)陽明溫病。純利稀水無糞者。謂之熱結旁流。調胃承氣湯主之。

熱結旁流。非氣之不通。不用枳朴。獨取芒硝入陰以解熱結。反以甘草緩。芒硝急趨之性。使之留中解結。不然。結不下而水獨行。徒使藥性傷人也。吳又可用大承氣湯者。非是。

偏亂神明。而閉塞絡脈。致厥。宜泄熱通絡。內外之因不同。不可混治。

溫疫以胃家實。之協熱利。用大承氣下結。而利自止。午後潮熱而利者。為伏邪傳裏。不能稽留。宜小承氣以撤餘邪。若外感溫邪。傳裏而口渴下利者。宜苦寒燥濕。或稍兼涼潤。以調胃承氣可以賅治也。

在傷寒陽明證。語下利。為脾液不收。而氣陷於下。多不黃。識語而自利。

(八)陽明溫病。實熱壅塞為噤者。下之。連聲噤者。中焦。聲斷續。時微時甚者。屬下焦。

金匱謂噤。而腹滿。視其前後知何部不利。利之則愈。陽明實熱之噤。下之裏氣得通則止。但其兼證之輕重。難以預料。故但云下之而不定方。以俟臨證者。自為採取耳。再按中焦實證之噤。噤必連聲緊促者。胃氣大實。逼迫肺氣不得下降。兩相攻擊而然。若或斷或續。乃下焦衝虛之噤。其噤之來路也遠。故其聲斷續也。治屬下焦。

(九)陽明溫病。下利譫語。右脉實或滑疾者。小承氣湯主之。脉不實者。牛黃丸主之。紫雪丹亦主之。

下利譫語。柯氏謂腸虛胃實。故取大黃之濡胃。無庸芒硝之潤腸。本論有脉實脉滑疾。脉不實之辨。恐心包絡之譫語。而誤以承氣下之也。仍主芳香開竅法。