

嘔血

卷之八

丹毒水腫黃疸痛氣

鷄屎體鼓脹鼻

嘔吐

瘡滿

反胃

噎膈

惡心

吞酸嘈

呃逆

萬方新編丙集第三卷目錄

通治部

嘔吐門

翻胃門

噎膈門

惡心門

吞酸嘈雜門

呃逆門

痞滿門

哮喘門

失血門

諸氣門

痰飲門

虛損門

勞瘵門

鬱證門

結核門

鼓脹門

水腫門

黃疸門

丹毒門

萬方新編丙集卷三

通治部

嘔吐門

嘔吐陽厥

卒死者飲新汲水
三升佳 千金方

乾嘔不息

葛根搗汁服一
升瘥 肘後方

○蔗汁溫服半升日三次
入薑汁更佳 肘後方

諸般吐逆

陰陽丸用硫黃半兩水銀一錢研墨薑汁
糊丸小豆大三歲三丸冷水下大人三四

十丸 鄭
氏小兒方

吐逆不止

火麻仁杵熬水研取汁着少鹽喫
立效李諫議常用極妙 外臺

嘔逆不止

不拘男女連日粥飲湯藥不能下者即效
五靈脂治淨爲末狗膽汁和丸芡子大每

服一九煎生薑酒磨化猛口熱吞不
得漱口急將溫粥少許壓之
經驗

○真火酒一杯新汲井水
一杯和服甚妙
瀕湖

嘔噦不止

厥逆者蘆根三斤切水煮濃汁頻飲二升
必效若以童子小便煮服不過三升愈

肘後方

溫病冷嘔

因熱甚飲水成暴冷嘔者茅根切枇杷葉
拭去毛炙香各半斤水四升煎二升去滓

稍稍飲之
龐安
常傷寒卒病論

溫病熱噦

乃伏熱在胃令入胸滿則氣逆逆則噦或
大下胃中虛冷亦致噦也茅根切葛根切

各半斤水三升煎一升半每溫
飲一錢噦止即停
卒病論

暴得吐逆

不下食者生滑石末二錢匕溫水服
仍以細麴半錢押定
寇氏衍義

肺癰得吐

黃芪二兩為細末每服二錢水一中錢
煎至六分溫服日三四服
聖惠方

食入即吐

人藳半夏湯用人藳一兩半夏一兩五錢
生薑十片水一斗以杓揚二百四十遍取

三升入白蜜三合煮一升
半分服
張仲景金匱方

食已即吐

胸中有火也大黃一兩甘草二錢半水
一升煮半升溫服
仲景金匱玉函方

食後喜嘔

鹿角燒末二兩人藳一兩為末
薑湯服方寸匕日三
時後方

嘔逆酸水

羊屎十枚酒二合煎一合頻
服未定更服之
兵部手集

口吐清水

乾蘄艾煎湯啜
怪證奇方

嘔吐痰水

白檳榔一顆煨熱橘皮二錢半炙為
末水一盞煎半盞溫服
千金方

胃冷嘔逆

氣厥不通母丁香三箇陳橘皮一塊去白焙水煮熟服十便良方

胃冷有痰

脾弱嘔吐生附子半夏各二錢薑十片水二盞煎七分空心溫服一方竝炮熟加木

香五分○

奇效良方

支飲作嘔

嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憤憤竝宜

小半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一升五合分服張仲景金匱

要略

虛寒嘔噦

飲食不下細辛去葉半兩丁香二錢半爲末每服一錢柿蒂湯下

胃弱嘔逆

不食用草蔻仁二枚高良薑半兩水一盞煮取汁入生薑汁半合和白麴作撥刀以

羊肉臠汁煮熟空
心食之
普濟方

痰壅嘔逆

心胸滿悶不下飲食厚朴一兩薑汁炙黃芩為末不拘時米飲下二錢匕 聖惠方

卒嘔不止

香蘇濃煮頓服三升良千金方

乾嘔脇痛

傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之

芫花熬甘遂大戟各等分為散以大棗十枚水一升半煮取八合去渣納藥強人服一錢贏人半錢平旦服之當下利病即除如其不除明日再服即有驗也

仲景傷寒論

嘔噦眩悸

穀不得下半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎一升半分

溫服之○金匱要略

嘔吐反胃

大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升水一斗二升和揚之一百二十遍煮取三

升半溫服一升日再服亦

治膈間支飲 金匱要略

嘔逆厥逆

內有寒痰半夏一升洗滑焙研小麥麴一升水和作彈丸水煮熟初吞四五枚日三服稍增至十五枚旋煮旋吞覺病減再作思羊肉飴餚此乃許仁則方也 外臺秘要

乾嘔厥逆

頻嚼生薑嘔家聖藥也

上氣嘔吐

芥子末蜜丸梧子大并華水寅時下七丸申時再服 千金方

心痞嘔噦

心下痞堅生薑八兩水三升煮一升半夏五合洗水五升煮一升取汁同煮一升半

分再服 千金方

頭運吐逆

胃冷生痰也用川乾薑炮二錢半甘草炒一錢二分水一鍾半煎減半服累用有效

○傳信

適用方

嘔吐胸滿

吳茱萸湯用茱萸一升棗二十枚生薑一大兩人浸一兩以水五升煎取三升每服

七合日服三

次仲景方

嘔逆不食

訶黎勒皮二兩炒研糊丸梧子大空心湯服二十九日三服廣濟方

病後嘔逆

天行病後嘔逆食即反出用青羊肝作生痰食不過三度食不出矣外臺

嘔吐不藥

必有蛇蟲在膈聞蛇聞藥則動動則藥出而蛇不出但於嘔吐藥中加炒川椒十粒

良蓋蛇見椒則頭伏也觀此則張仲景治蛇厥烏梅丸中用蜀椒亦此義也

腎氣上噦

腎氣自腹中起上築于咽喉逆氣連屬而不能出或至數十聲上下不得喘息此由

寒傷胃脘腎虛氣逆上乘于胃與氣相併難經謂之噦素問云病深者其聲噦宜服

萬方斤扁

卷三嘔吐

四

此方如不止豕期門關元腎俞穴用吳茱萸酢炒熱橘皮附片各一兩爲末麴糊丸

梧子大每薑湯下七

上丸 孫氏仁存方

諸藥引吐

時珍曰噦逆用吐藥亦反胃用吐法去痰積之義吐藥不一常山吐瘧痰瓜蒂吐熱

痰烏附尖吐溼痰萊菔子吐

氣痰藜蘆則吐風痰者也

諸病應吐論

張機曰病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞硬氣上衝咽喉不得息者此

爲胸中有寒也當吐之太陽中喝身熱頭痛而脉微弱此夏月傷冷水水行皮中也宜吐之少陽病頭痛發寒熱脉緊不大是膈上有痰也宜吐之病胸上諸實鬱鬱而痛不能食欲人按之而反有濁唾下利日十餘行寸口脉微弦者當吐之懊憹煩躁不得眠未經汗下者謂之實類當吐之宿食在上脘者當吐之並宜瓜蒂散主之惟

諸亡血虛家不可吐也上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死也飲食內傷填塞胸中食傷太陰風木生發之氣伏于下宜吐之若尺脉絕者不宜用此恐損真元令令人胃氣不復也

瓜蒂散

治證見上其方用瓜蒂二錢半炒黃赤小豆二錢半爲末每用一錢熟水調量人虛實服如無瓜蒂藜蘆代之

嘔吐不止

陽台頭一兩生薑一兩水二盃煎一盃去滓加甜酒每飲一呷陸續送下卽止

○又方板栗花炮薑

藿香甘草水煎服

○廣藿香公丁香

煨薑五片水煎服

○枯礬雞內金沙仁公丁香共爲末兌陰陽水喫效

五

五

五

五

五

五

五

五

翻胃門

翻胃吐食

男婦皆治白善土煨赤以米酢一升淬之再煨再淬酢乾為度取一兩研乾薑二錢半炮為末每服一錢調水下服至一斤以止為妙 千金翼方

翻胃轉食

地龍糞一兩木香三錢大黃七錢為末每服五錢無根水調服忌煎炒酒酢椒薑熱物一二服有效○邵真人經驗方

翻胃吐食

○取羸螂一斗水浸取泥晒乾每服一錢火酒調下 時珍
竈中土年久者為末米飲服三錢經驗 百一選方

○白礬硫黃各二兩銚內燒過入朱沙一分為末麴糊丸小豆大每薑湯下十五丸極效○普濟方

翻胃嘔吐

飲食入口即吐困弱無力垂死者上黨人
漫三大兩拍破水一大升煮取四合熱服

日再兼以人蔘汁入粟米雞子白
薤白煮粥與嗽 李絳兵部手集

翻胃吐食

大棗一枚去核用斑貓一枚去頭翅入
在內煨熟去蟄空心食之白湯下良

○廣陳皮以日照西壁土炒香爲末每服
二錢生薑三片棗肉一枚水二鍾煎一鍾

溫服○
直指方

○戴原禮方用胡椒酢日乾如此七次半
夏等分爲末薑汁糊丸梧子大每薑湯下

三十
九

翻胃吐食

吐出黑汁治不愈者用畢澄茄爲末米糊
丸梧子大每薑湯下三四十丸日一服愈

後服平胃散三
百帖 永類方

翻胃吐食

朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者用甘蔗汁七升生薑汁一升和勻日日細呷之梅

師方

○蠶繭十箇煮汁烹雞子三枚食之以無灰酒送下日二服神效普濟方

○用鯉魚一頭童便浸一夜炮焦研末同米煮粥食之壽域方

翻胃吐食

大鯽魚一尾去腸留鱗入綠礬末令滿泥固煨存性研末每米飲服一錢日二本

事方

○以反毛雞一隻煮爛去骨入人蔘當歸食鹽各半兩再同煮爛食之至盡出乾

坤生

脾虛吐食

羊肉半斤以蒜薤醬枝五和拌空腹食之心鏡

翻胃吐食

不拘男婦老少遠近用五靈脂末黃狗膽汁和丸龍眼大每服一丸好酒半錢磨化

服不過二服即

效 本事方

一切翻胃

○羊糞五錢童子小便一大錢煎六分去滓分三服 聖惠方
虎脂半斤切清油一斤瓦瓶浸一月密封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一錢溫

服以瘥為度油盡再添 壽域神方

○翻胃結腸甚者難治常食兔肉則便自行

○狢皮燒灰酒服或煮汁或五味淹炙食 普濟方

脾疼翻胃

辰沙一兩蚌粉一兩同炒赤丁香胡椒各四十九粒為末自然薑汁煮半夏粉糊丸

梧子大每薑湯下 二十丸 普濟方