

蓮子肉温而瀉脾之集也。脾者黃宮故

能交水火而媾心腎。安靖上下君相火

邪。古方治心腎不交勞傷白濁。有

牙蓮子清心飲。補心腎。有瑞蓮丸。益十

二經脉血氣。瀉精氣。厚腸胃。除寒熱。治

脾泄久痢白濁夢遺。女人崩帶及諸血

病大便秘者勿服。去心皮蒸熟焙乾

用得茯苓山藥白朮枸杞良黑而沉水

者爲石蓮清心除煩開胃進食。治噤

口痢淋濁諸症。石蓮入水則沉入肉則

浮至頂。肉乃可煎。落中者百年不

醫方集解卷之四

祛寒之劑

寒中于表宜汗。寒中于裏宜溫。蓋人之一身以陽氣爲主。經曰陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰。寒者陰慘肅殺之氣也。陰盛則陽衰。迨至陽竭陰絕則死矣。仲景著書先從傷寒以立論。氣欲以寒病爲綱。而明其例也。其在三陽者則用桂麻柴葛之辛溫以散之。其在三陰者非假薑附桂黃之辛熱。參朮甘草之甘溫。則無以祛其陰冷之邪。診而復其若天與日之元陽也。諸傷寒濕者皆視此爲治矣。

仲景

治傷寒太陰病自利不渴寒多而嘔腹痛糞

或厥冷拘急或結胸吐衄及感寒霍亂太

陰

者爲石蓮清心除煩開胃進食。治噤口痢淋濁諸症。石蓮入水則沉入肉則浮至頂。肉乃可煎。落中者百年不于外則手足厥冷拘急寒凝于中則結胸泄瀉吐衄霍

喪人得食之髮黑不老。脾中石蓮產廣亂者陰陽不和而揮霍撩亂。或吐或瀉亦有寒熱二症

中樹上其味大苦不宜入藥。蓮心為末飲下。瘰癧

後血渴

蓮莖鬚甘溫而瀉。清心通腎。益血固精。

烏鬚黑髮止夢遺精吐崩諸血略與

蓮子同功。

藕節瀉平解熱毒消瘀血止吐衄淋痢

一切血症。和生地汁童便服良藕生甘寒涼血散

痰。宋大官作血蝕誤落藕皮血遂渙散草人滿嘔吐去白朮加半夏薑汁

以髮灰二錢藕汁調服三日而愈止渴

除煩。聖惠方藕汁蜜和解酒毒蠱毒爛

若陰寒所致者宜此湯。○三陽傳陰經而下利者為協熱利。陰寒直中陰經而下利者為寒利。外邪傳裏而腹痛者其痛不常。陰寒在內而腹痛者痛無休止。時欲作利。大腹屬大陰。少腹屬少陰。臍下屬厥陰。亦有挾食積與痰火者。三陽下利身熱。太陰下利手足溫。少陰厥陰下利身冷。其大數也。下利雖有表症不可發汗。以下利為邪氣內攻走。洋液而胃虛也。

白朮陳壁土炒二兩人參乾薑炮甘草炙一兩每服四錢。自

利腹痛者加木香。不痛利多者倍白朮。渴者倍白朮。

益氣燥濕。能生津。臥沉重利不止加附子。此兼少陰症。腹滿去甘

草人滿嘔吐去白朮加半夏薑汁。白朮甘壅薑夏散逆臍下動氣

去朮加桂。白朮補氣桂泄奔豚悸加茯苓。飲停則悸茯苓利水寧心陰黃加茵

陳寒結胸加枳實。本方等分蜜丸。名理中丸。仲景曰大病瘳後喜

熱酒煮熟甘溫益胃補心多孔止瀉能實寒宜理中丸溫之

大腸止怒久服令人權益心生搗番金瘡

傷折熟搗塗折裂凍瘡肘後方卒中毒箭煮藕汁飲多

多益善孟詵曰產後忌生冷獨藕不忌為能散瘀血也澄粉亦佳

安神益胃

荷葉苦乎其色青其形仰其中空其象

震震仰感少陽甲膽之氣燒飯合藥裨

助脾胃而升發陽氣潔古枳木丸用荷葉燒飯為丸痘

瘡倒壓著用此發之蠶垂等分為末胡

勝于人能散瘀血留好血治吐衄崩淋牙龍腦

六方精要 菓蓮並鬚 藕節 荷葉

此足大陰藥也人參補氣益脾故以為君白朮健脾燥

濕故以為臣甘草和中補土故以為佐乾薑溫胃散寒

故以為使以脾土居中故曰理中王海藏曰上吐下瀉不止當渴而反不渴

脈微細而弱者理中湯主之經又曰傷寒下之利不止

醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦

石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便○宋徽宗食冰太過病脾疾國醫不效召楊允進大理中丸上

曰服之屢矣介曰疾因食冰臣請以水煎此湯是治受病之源也果愈

本方三兩加附子一枚名附子理中湯亦可作丸即四逆湯加參朮

治中寒腹痛身痛四肢拘急漸傷曰傷卒中曰中有中藏中府中經絡皮肉筋脉

之殊治之當分微甚微則不換金正氣散加附子附子五積散甚者臍腹痛四肢厥附子理中湯薑附湯入肝

方集解 寒 本四 理中湯

損傷產瘀救香一切血症洗腎囊風東垣

曰頭風症頭面疔瘡腫痛憎寒壯熱
狀如傷寒病在三陽不可適用寒藥重

劑不伐無過處清震湯治之荷葉一枚
升麻蒼朮各五錢煎服鄭真一日荷葉

研末酒服三錢
治遺精極驗

芡一名雞頭子甘瀼固腎益精補脾去濕

治心瀉帶濁小便不禁夢遺滑精同金櫻膏故加椒梅

為丸名水腰膝痺痛吳子野曰人之食

陸子仙丹艾必枚嚙而細嚼之使華液流通轉相崔既其功勝于乳

石也經驗後方煮熟和膏合粳米煮粥
食益蒸熟搗粉用漳精藥或連殼用

李惟熙云菱寒而芡暖

菱花背目芡花向日

加木瓜入肺加桑白皮本方加枳實茯苓蜜丸名枳實

理中丸崔行治寒實結胸欲絕胸膈高起手不可近用

大陷胸不瘥者崔曰此是下後虛逆氣已不理而毒復

具氣次瘥諸疾用之如神渴者加花粉自汗者加牡蠣本方去甘草加茯苓川椒

烏梅名理中安蚘丸陶仲文治胃寒吐蚘蚘得甘則動故

靜得辛則伏本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯仲景治

大陽表症不除而數下之協熱而利心下痞鞭表裏不

解者欲解表裏之邪全藉中氣為敷布故用理中以和

先表之意也大抵陽熱為邪則腹滿而吐利本方加黃連茯苓

名連理湯治傷暑瀉而作渴若外感盛暑內傷本方加

甘寒和中助脾除熱潤燥止渴
治消

消痰解酒毒利二便
外臺方噦嘔或搗汁治發熱口

乾便治嘔噦反胃
梅師方薑汁和服大便燥

結廕汁熬之名石蜜即白霜糖唐大厯
間有鄒和尚始傳造法性味甘溫補

脾緩肝潤肺和中消痰治嗽多食
助熱損齒生蟲紫砂糖功用畧同

一名烏芽一名地乎
甘微寒滑益氣安中開胃

胃消食
飯後宜食之**除胸中實熱治五種噎**

膈憂膈
五種氣噎食噎勞噎憂噎思噎**泄瀉**

黃疸血症蠱毒
木服能毀銅汪機曰金

則錢化可見為消堅削清之物
故能開五膈消宿食治誤吞銅也

陳皮枳殼名補中湯治泄瀉瀉不已者加附子惡食食

不化加砂仁本方加當歸白芍陳皮厚朴川椒入薑煎

名溫胃湯治憂思鬱結脾肺氣凝脹滿上衝飲食不下

本方加黃耆白芍陳皮藿香名黃耆湯
治藏亦出理中例法

加青皮陳皮名治中湯治前症腹滿痞悶兼食積者

仲景四逆者四逆厥逆也
治三陰傷寒
四逆湯為

太陰主藥然三陰通用之
身痛腹痛下利清穀惡寒不

渴四肢厥冷或反不惡寒面赤煩燥裏寒外熱或乾嘔

成因痛脉沉微細欲絕
腹痛自利裏寒也三陰自利居

逆內寒故惡寒不渴四肢者諸陽之本寒則血脉凝滯
傷氣不能敷布故一身盡痛而手足厥冷也反不惡寒

菱

一名菱音菱俗名菱角

甘寒安中消暑止渴

解

酒

有兩角三角四角老嫩之殊

武陵記以

三角四角者為菱兩角者為菱
菱花隨月而轉猶葵之向日

西

甘寒解暑除煩利便醒酒名天生

白虎湯

西瓜甜瓜皆屬生冷多食傷
助濕衛生歌云瓜桃生冷宜少

食免致秋來成瘡痼瓜性寒曝之尤寒
稍含賦云瓜曝則寒油煎則冷物性之

也

穀菜部

梗

梗硬也
糯糯也

甘涼得天地中和之氣和

止脉不出加人參二兩以助陽補氣血嘔吐加生薑三

二兩以斂陰咽痛陰氣上結也加桔梗一兩以利咽利

至亡陽不用表藥外邪不
服故用前湯加蔥為治

腹痛者真陰不足也加芍藥

也加葱九莖以通陽

喻嘉言曰陽虛之人雖有表症方
汗仍出其手足必厥逆用表藥方

附子

一枚

乾薑

一兩

甘草

炙二

冷服面赤者格陽於土

耳宜深
祭之

回赤發躁者陰盛格陽于外也寒留胸中故食入即吐
膈有寒飲故逆而乾嘔虛火上炎故咽痛脉沉者寒則
伏藏也按少陰脉有沉有緊有數而仲景統以微細言
之蓋沉必重按始得緊數亦在沉細中見不似陽症浮
大而緊數也薛慎齋曰人知數為熱不知沉細中見數
為寒甚真陰寒症脉嘗有七八至者但按之無力而救

胃補中色白入肺除煩清熱煮汁止渴

兩以散逆氣

以上皆通脉四
逆湯加減法也

仲景白虎湯桃花湯竹葉石膏湯並用之以清熱補不足張文潛粥記粥能暢胃氣生津液每晨空腹食之所補不細昂按令人終日食粥不知其妙迨病中食之覺與藏府相宜迨非他物之所能及也

梗乃稻之絕

名有早中晚三收晚者得金氣多性涼

尤能清熱

北梗涼南梗溫白梗涼紅梗溫新米食之動氣

陳

廩米冲淡可以養胃煮汁煎藥亦取其

調腸胃利小便去濕熱除煩渴之功

集成

云陳米飯緊作團火煨存性麻油膩粉調傳一切惡瘡百藥不效者

稻

本草名稻果按詩黍稷稻梁禾麻菽麥各八穀此稻與禾所以異乎

甘溫補脾肺虛寒堅大便縮小便收自

此足少陰藥也寒淫于內治以甘熱故以薑附大熱之

劉仲發陽氣表散寒邪

附子生用亦能發表

甘草亦補中散寒之

品又以緩薑附之上僭也

甘草為君乾薑為臣附子為佐

必冷服者寒

盛於中熱飲則格拒不納經所謂熱因寒用又曰治寒

以熱涼而行之是也

此奇制之大劑也肝腎位遠非大劑不能達仲景云傷寒醫下之續

得下利清穀腹滿身痛者急當救裏宜四逆湯清便自

調身痛者急當救表宜桂枝湯蓋身痛尚屬表症急則

先救裏而後解表也厥陰篇曰大汗出熱不去內拘急

四肢痛又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之按厥逆症

四肢厥冷指甲青脉沉沉疾按之有力者為陽厥當下之
宜大承氣湯如脉沉遲按之無力者則為陰厥宜四逆
湯更須速灸之凡傳經熱邪則為陽厥厥赤而四肢熱
直中真寒謂之陰厥陰縮而四肢冷程郊倩曰世言傳
經為熱厥直中為寒厥斯言甚謬三陽之厥多傳于失
下此為熱厥少陰之厥悉屬于寒厥陰之熱厥仲景書

汗同龍骨牡蠣
為粉能模汗
發痘瘡
解毒化膿
然性粘滯

病人及小兒忌之

糯米釀酒則熱熬錫尤甚錫即飴糖潤肺

和脾化痰止嗽仲景建中湯用之其
甘以補脾緩中多食發溫熱動痰火損
齒

穀芽甘溫開胃快脾下氣和中消食化

積炒用

大麥鹹溫能助胃氣上行而資健運

補脾寬腸和中下氣消食除脹散結去

痰鹹能化一切米麵食積通乳下胎

心臺方麥芽一升蜜一升服下胎神驗

使有傷寒一二日至四五日而厥者必發熱一條果如
傳邪之說則在四五日固得矣論中何云一二日不知
何經之邪而神速若此其曰厥應下之者下其熱非下
其厥也遇發熱則可下遇厥則萬不可下矣推原其故
厥陰與少陽一府一藏少陽在三陽為盡陽盡則陰生
故有寒熱之往來厥陰在三陰為盡陰盡則陽接故有
寒熱之勝復凡遇此症不必論其來自三陽起自厥陰
只論熱與厥之多少熱多厥少知為陽厥厥多熱少知
為陰厥熱在後而不退則陽過勝而陰不能復遂有倏
痺便血等症厥在後而不退則陰過勝而陽不能復遂
有除中亡陽等症仲景所以調停二治法須合陰陽進
退之機陽勝宜下小承氣湯中已去芒硝之寒而有厚
朴之溫在厥陰中破陽以行陰陰勝宜溫縱有陽邪一
見厥利便宜烏梅丸聚辛熱之品而加苦寒之佐在厥
陰中破陰以行陽雖有上熱如篇首消渴氣上衝心之
症亦不慮其為打擦也扶陽抑陰之旨微矣又曰烏梅
丸于辛酸入肝藥中微加苦寒納逆上之陽邪而順之
使下也名曰安蛔實是安胃故併主下利見陰陽不相
順接而下利之症皆可以此方括之也經曰凡陰陽不

散氣如此良方云神麴亦善下胎皆不相順接則手足厥冷也。○附俞嘉言論桂附丸曰藏為

可輕久服消腎氣王好古白麥芽神麴陰可勝純陽之藥府為陽必加陰藥一二味制其僭熱經絡之淺又當加和營衛併宣導之藥

用戌己腐熟水穀李時珍曰無積而服之消人元氣與白米諸藥消補兼施則無

也害炒用豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥五及中寒發厥心痛本方除甘草名乾薑附子湯仲景治下

味為使後復汗晝躁夜靜不嘔不渴無表症脉沉微無大熱者

小麥味甘微寒養心除煩利溲止血時珍晝日煩躁虛陽擾亂外見假熱也夜安靜不嘔渴脉沉

曰素問麥屬火心之穀也鄭玄屬木許微無大熱陰氣獨治內係真寒也凡陰虛之極陽必厥

養心與素問合當以素問為準按麥秋回陽不當以晝日煩躁而疑之矣又治中寒厥逆眩仆

種夏熱備受四時之氣南方地暖下濕無汗或自汗淋漓中寒之症身強口噤眩運無汗或自

不如北產之良仲景治婦人藏燥症悲中寒不發熱以此為異仲景于傷寒則詳之而中寒未

傷欲哭狀若神靈用大棗湯大棗十枚之及何也曰陽動陰靜陰寒既鬱而成熱遂從乎陽傳

小麥一升甘草一兩每服一兩亦補脾變不一靡有定方故極推其病不得不詳也不及外熱

氣聖惠方小麥飯治煩熱少睡多渴熱者陰邪一定而不移則不變故不必詳也

麥芽小麥四逆湯五

麵甘溫補虛養氣助五藏厚腸胃然能

壅氣作渴助濕發熱陳者良

寒食日紙袋盛懸風

處名寒食麵年久不熱入藥尤良

浮小麥

即水淘成浮起者鹵

涼止虛汗盜汗勞熱骨蒸

汗為心液麥為心穀浮者

無肉故能涼

心麥麩同功

麥麩醋拌蒸能散血止

痛熨腰脚折傷風濕痺痛寒濕脚氣互

易至汗出良

麥之涼在皮故麵去皮即熱凡瘡瘍痘瘡潰爛不能

着席者用麥麩裝褥臥性涼而軟誠妙法也

稷甘平益氣和中宜脾利胃

陶弘景曰稷米人亦

不識書記多云黍與稷相似又註黍米云黍米與黍米相以而粒殊大食之不

煩躁陰盛格陽

陰症似陽

薑附湯加當歸肉桂人蜜和服名

薑附歸桂湯

喻嘉言曰服薑附湯後繼服此湯因薑附專主回陽而卒中寒邪先傷營血故加歸

桂逐營分之邪始得藥病相當也

再加人參甘草名薑附歸桂參甘湯

加薑煎

喻氏曰服前湯後繼當服此兼補氣血

本方除甘草加葱四莖名

白通湯

復陽通脈

再加人尿猪膽汁名白通加人尿猪胆汁

湯

仲景見後

本方加人參二兩名四逆加人參湯

仲景治惡寒

脉微復利利止亡血

惡寒脉微復利陽虛陰勝也利止則津液內竭故云亡血與四逆溫

經復陽加人參生津益血

再加茯苓六兩名茯苓四逆湯

仲景治汗下

後病不解而煩躁

過汗則亡陽而表虛誤下則亡陰而裏虛陰陽表裏俱虛乃生煩躁故用

茯苓人參人心以除煩

本方除乾薑加芍藥三兩名芍

此八穀也。俗猶不能辨證。況芝英乎。按黍稷辨者類多。皆無權義。時珍曰。黍稷一類。二種。粘者為黍。不粘者為稷。昂謂詩人既云八穀。何必取一類者。強分二種。是仍為七穀矣。蓋稷稷同音。故世妄謂粳為稷。不知稷乃黍類。似粟而粒大疎散。乃北方下穀。南方全無。北方亦不之重。安能越度。粳糯而高。踞八穀之上也。乎。陶氏所說。因是稷黍所以疑也。若稷當屬高大如蘆。世之所謂蘆稷者。實既香美。性復中和。乾又高大。所以能為五穀之長。而先正以之名官也。况稷黍所生不偏。而蘆稷薄海蕃滋。本草乃指蘆稷為蜀黍。其名義亦不倫矣。此實從來之誤。敢為正之。以質明者。又蘆稷最能和中。煎湯溫服。治霍亂吐瀉如神。昂嘗病腹中啾啾。經兩月。有友人見招。飲以蘆稷燒酒。一醉而積疴暢然。性之中和。又可見矣。

藥甘草附子湯。治傷寒發汗不解。反惡寒者。虛故也。汗出表不解而惡寒。獨曰反其為過汗。陽弱可知。汗出為營虛。惡寒為衛虛。若重補其陰。則惡寒愈甚。但回其陽。則陰愈却矣。故用附子以回陽。而加芍藥以斂陰。此營衛兩虛之救法。李挺曰。汗後亡陽。惡寒者。表虛也。芍藥附子甘草湯。下後惡寒者。裏虛也。四逆湯。其有表裏未盡者。必兼發熱。柴胡加桂湯。又有裏實熱伏于內。陽微于外。而惡寒便堅者。猶須下之。傷寒百問。本方除附子。用甘草四兩。乾薑二兩。名甘草乾薑湯。治傷寒脉浮自汗。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。用桂枝湯。誤攻其表。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆。以此湯以復其陽。自汗便數。惡寒。陽不足也。攻表重虛其陽。得湯便厥。胃之津液傷也。故以甘草益氣。乾薑助陽。尤慮辛熱有傷其陰。隨與白芍甘草湯。益其陰血。復其津液。故症雖邪于少陰。而不敢用四逆也。若厥愈足溫者。

粟甘鹹微寒養胃益氣治胃熱消渴止更作芍藥湯以和其陰其脚即伸芍藥甘草各四兩仲景

霍亂利小便千金方粟米粉水丸梧子大煮七枚內醋中細吞之和解門別見本方加吳茱萸名茱萸四逆湯治厥陰少陰腹病

治反胃吐食即梁米有青黃赤白黑諸色本方加當歸木通名當歸四逆湯治感寒手足厥冷肝

陳者良細欲絕及男婦寒疝臍下令引腰膝而痛寒傷營血故加當歸木通

蕎麥麵甘寒降氣寬腸治腸胃沉積孟詵能通血脉仲景當歸四逆湯見後本方加茵陳名茵陳四逆湯治陰黃

曰能鍊五藏垢穢泄痢帶濁傳痘瘡潰本方加生脉散陳皮名回陽返本湯治陰盛格陽本方

爛湯火灼傷脾胃虛寒人勿服加官桂良薑半夏名漿水散潔古治虛寒水瀉冷汗脉微

黑大豆甘寒色黑屬水似腎腎之穀也甚者嘔吐此為急病漿水者泄利漿水澄澈清令也又白加漿水煎之

豆有五色故能補腎鎮心腎水足則火寧明當歸四逆湯仲景治厥陰傷寒手足厥冷脉細欲絕成氏

目腎水足利水下氣古方治水腫每散足厥寒者陽氣外虛不溫四末脉細欲絕

熱祛風危篤及妊娠腰痛兼能發表干

金云一以去風活血產書云熬令烟絕

一以消血結酒淋服下產後餘

解毒蘇頌曰古稱大豆解百藥毒試

之不然又加甘草其驗乃奇

消腫止痛搗塗一切腫毒煮食稀痘瘡

緊小者良

小者名馬料豆每晨鹽水吞或鹽水煮食補腎

畏五參龍胆猪肉忌厚朴犯之動氣得前胡

杏仁牡蠣石蜜諸胆汁良

赤小豆甘酸

思邈鹹冷

色赤心之穀也性下

行通小腸利小便

心與小腸相表裏

行水散血

消腫排膿清熱解毒治瀉痢脚氣

昔有患脚

棗二十枚

仲景又曰其人素有久寒者加吳茱萸二生

薑半斤酒六斤和煮名四逆加吳茱萸生薑湯

此足厥陰藥也成無已曰脉者血之府也諸血皆属于

心通脉者必先補心益血苦先入心當歸之苦以助心

血心苦緩急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急

急食甘以緩之大棗甘草通草以緩陰血

四逆之名多矣而有因寒

因熱之不同此則因風寒中血脉而逆故以當歸辛溫血中之氣藥為君通脉散逆必先去血中之邪故以桂枝散太陽血分之風細辛散少陰血分之寒為輔未有管衛不和而脉能通者故以芍藥甘草大棗調和營衛通草利九竅通血脉關節諸藥藉之以破阻滯而厥寒散矣周揚俊曰四逆湯全從回陽起見曰逆散全從和

本草精要 穀粟 蕎麥 黑豆 赤小豆

當歸 桂枝 芍藥 細辛 甘草 通草 二兩 大

氣者用赤小豆袋盛朝夕踐踏之遂愈
同鯉魚煮食汁能消水腫煮粥亦佳

傳一切瘡疽

雞干白調末搗之性極粘
乾則難揭入芋根末則不

粘宋仁宗患疔腮道士贊能取赤小豆

四十九粒呪之雜他藥傳之而愈中貴

任承亮親見後任自患惡瘡傅永投以

藥立愈問之赤小豆也承亮始悟道士

之呪偽也後過豫章見醫治脇疽甚捷

任曰莫非赤小豆耶醫驚拜曰用此活

三十餘口止渴解酒通乳下胎然滲津

液久服令人枯瘦

十劑口燥可去濕聚
白皮赤小豆之屬是

也按二藥未可言燥蓋取其行水之功

然以木通防己為通劑通燥二義似重

故本集改熟藥為燥

劑而以行水為通劑

綠豆甘寒行十二經清熱解毒一切草

解表裏起見當歸四逆全從養血通脉起見不欲入辛
熱之味恐劫其陰也蓋少陰藏中重見真陽陽不回則

邪不去厥陰藏中職司藏血不養血則脉不起即遇久
寒之人亦不用乾薑附子止用吳茱之走肝者自上而

下生薑之辛散者
自內達外足矣

自內達外足矣

四逆散

仲景此和解之寒劑
因名四逆附次于此

治傷寒少陰症陽邪入裏

四逆不溫或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下

重

陽邪傳裏熱結于裏故四肢逆而不溫氣逆挾痰故
致氣虛挾飲故悸裏有結熱故小便不利腹痛下利

傷寒邪在三陽則手足必熱至太陰則手足溫至少
陰則熱邪漸深四肢逆而不溫至厥陰則手足逆冷經

曰熱深厥亦深熱微厥亦
微與此湯以散傳經之熱

柴胡

芍藥

炒枳實

炙甘草

炙

炙

等分為末水調飲欬

加五味子乾薑併主下利
五味收逆氣乾薑散肺寒肺
與大陽自表裏上欬不利治

利濕重
皆治之
利小便止消渴治瀉痢連皮

用其原粉撲瘡瘻潰爛良一市民誦觀音經其誠出

行折一足哀叫菩薩夢僧授一方綠豆粉新銚沙紫色并水調厚設紙貼杉木

效如神

百菰豆甘溫腥香色白微黃脾之穀也

調脾暖胃通利三焦降濁升清消暑除

濕能消脾胃之暑止渴止瀉專治中宮之病土強

濕去正解酒毒河豚毒情急方新汲水調未服能解砒

毒什多食壅氣子粗圓色白者入藥連

皮炒研用亦有浸去皮及生用者

子以補虛散寒泄利下重加薤白能通大腸以泄氣滯

此足少陰藥也傷寒以陽為主若陽邪傳裏而成四逆

有陰進之象又不敢以苦寒下之恐損其陽經曰諸四

逆不可下也故用枳實泄結熱甘草調逆氣柴胡散陽

邪芍藥收元陰用辛苦酸寒之藥以和解之則陽氣敷

布於四末矣此與少陽之用小柴胡意同有兼症者視

加減為治陶節菴曰病在一經有用熱藥又用寒藥者如少陰症有用白虎湯四逆散寒藥者有用

具武湯四逆湯熱藥者庸醫狐擾詎能措手不知寒藥治少陰乃傳經之熱症也熱藥治少陰乃直中之寒症

也昂按仲景傷寒論陽明症熱藥僅一茱萸湯少陽症藥主初解亦有加乾薑者其餘四經用薑附萸桂者衣

淡豆豉苦泄肺寒勝熱

陳藏器曰豆性生乎炒熱熟煮

可勝數宜必一一皆直中之邪乎陽用少陽二經並為

食寒作

發汗解肌調中下氣治傷寒頭

者有矣並無直中者獨不中此二經乎况仲景書中說傳經

痛煩燥滿悶懊懣不眠發斑嘔逆

凡傷寒論也

逆煩悶宜引吐不宜用下藥以逆之

血

痢虛瘕

時珍曰黑豆性平作豉則溫既經蒸暑故能升能散得葱則發

汗得鹽則能吐得濟則治風得薤則治

盜汗炒香漬酒辰時後合葱白煎名葱

豉湯用代麻黃湯通治傷寒發表亦治

病造淡豉法用黑大豆水浸一宿淘

淨蒸熟攪勻蒿覆候上黃衣取晒簸淨

真武湯

仲景治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重疼痛

自下利者此為有水氣或欬或嘔或小便利

傷寒脈見

吐心煩但欲寐五六日利而渴者為少陰症凡人喘則氣行于陽寐則氣行于陰然必自少陰始故少陰症但

欲寐陰氣勝也一有陽擾則反是矣周揚俊曰但欲寒非能寐也昏昏如夢耳六經中惟少陰症難辨少陰屬

腎腎病不能制水水飲停為水氣腹痛者寒濕內甚也四肢沉重疼痛寒濕外甚也小便不利自下利者濕勝

而水穀不別也或及太陽病發汗汗出不解仍發熱心

悸或嘔皆停飲也