

經驗良方卷上目錄

卷上

頭部

面部

眼部

鼻部

耳部

口部

牙部

喉部

心部

乳部

肚部

前陰部

後陰部

血部

風痰部

汗部

手部

脚部

週身內外部

癰疽部

瘋部

經驗良方卷下目錄

卷下

癩癬部

疥部

瘡部

婦科部

兒科部

服毒部

損傷部

膏丹部

丸散部

雜部

經驗良方卷下

癩癬部

治癩經驗

楓子肉一分 麝香一分 水片一分 蟾酥五厘 胡椒一錢 水銀一錢錢 樟腦六分 共為細末

老生薑汁調勻用粗麻布包之擦癩立即效如痛加花粉有膿加白芷有水加枯礬各少許或用烟骨水先洗後用油開

塗亦妙

又 大楓子一錢 蛇床子一錢 皂角一錢 胡椒八分 硫黃八分 水銀一錢錢 麝香三分 水片三分 共

為細末清油調塗

又 土茯苓一兩 白茯苓一錢 生芪二錢 歸身一錢 生甘草八分 銀花蕊一錢 柴胡六分 芥穗八分 癩皮

一錢 地夫子一錢 茯苓一錢 洋參一錢 先用水多些煎土茯苓待煎好去渣後入各藥煎好去渣再煎好作

茶隨便服 外用文頭那即王不留行 二錢生煅硫黃一錢為末油開塗二方合用方驗

癩藥 黑芝麻四錢 硫黃一錢 共搗爛用煎尾芋挑開孔將藥和茶油放入孔內燒炭圍至四邊煨至芋乾為度取

出芋內藥油塗之立效

不論乾癩濕癩經驗方 硫黃 生豬膏 長顯加仔 右三味共搗爛塗患處立效癩輕重參用可也

又 雄黃二文 硫黃少許 芝麻一文 信石少許 共為細末清油調塗

乾癩 川連一錢 三仙丹五分 水片一分 牛黃一分 共為細末開清油調塗

又 川椒二錢 雄黃一錢 蒲黃一錢 更茶二錢 石膏二錢 銀花三分 白芷三錢 粒花二錢 草節八分

共為極細末先用老薑擦熱即將此薑點散再擦之立見神效

乾癩皮枯週身作癢 地松銀碎煎水洗甚驗此松茅草船常有

洗癩方 蒼朮 皮硝 花椒 苦參 香附 甘草節 各味同煎水洗

坐板癩經驗方 木芋頭去皮切絲曬乾用桐油煎至黑色後落雄黃即化成稀膏常時放在地下遇此症將膏塗之立愈

合掌散專治各種疥瘡 樟腦二錢 水銀一錢 蛇床子一錢 白芷一錢 花椒一錢 白礬一錢 楓子十粒

共研末核桃肉為丸手掌擦鼻聞之

大癩及爛頭脚小兒胎毒 核桃肉一兩 硫黃三錢 水銀二錢葉燻 入生猪膏二兩和勻搗爛塗患處自效

藥應癰藥 正川槿皮一錢 正鐵錫粉一錢 輕粉六分 硫黃六分 砒石三分 枯礬一錢 穿山甲一錢 雄黃

一錢 皮烟一錢 麝香五分 水片一分 共為末老薑汁點藥擦之

又 蛇床子一錢 大楓子一錢 血餘灰二分 川槿皮八分 為末用粗布色擦之

又 錫粉一錢 硫黃二分 水片一分 麝香一分 人言一分 川槿皮五分 共為細末用薑擦之

梁氏應驗癰方 錫粉三錢 三或三分 雄黃三分 胡椒一分 川槿皮一錢 麝香一分 水片三分 海桐皮一錢

分五 共為細末用白醋開塗即愈

牛皮癬 川槿皮 土槿皮 白鮮皮 地骨皮 雄黃 白芷 川椒各一兩 斑茅二十隻 為粗末酒浸七日調塗

又 石榴皮蘸明礬末擦切勿用醋

又 雄黃為末入輕粉和猪膏塗之

對門癰 洋丁香一分 木香一分 當門麝一分 鐵錫粉一分 共為末搗葱頭取汁調塗二三次日

將荔枝皮磨去癰皮先用醋味草刷仍用前藥再塗無不見效至坐馬癰牛乾癰前藥加白信二四分牛皮烟八分同為

末塗之無不有效

頭上白癰 楮植存性 水片五厘 為極細末和勻用清油調塗數次即愈

又 水瓜葉 鴉胆 同搗爛擦患處

頭上爛癰 鹹攪二枚去枝存性 蛇床子二錢 枯礬一錢 吳茱萸一錢 皮烟二錢 白芷一錢 水片二分 共研

細末清油調塗先刺去患處頭髮用茶仔煎水洗淨然後塗藥即十年久患者俱效

面上白癰 鐵錫粉一錢 胆礬一分 共為末以薑汁調擦之

白禿癰 正鐵錫粉五分 硫黃三分 正胆礬三分 雄黃三分 三賴五分 麝香二分 水銀五分 用正望

斗錫五分溶化入水銀和勻並各藥末柳油開塗

疔部

疔瘡方 黃苓二錢 花粉二錢 甘草五分 八角五分 白朮五分 黃連一錢 荊芥二錢 連翹四錢 銀花三

錢 梔子二錢 歸尾二錢 皂角刺一錢 土茯苓三兩 將土茯苓煎水四碗入各藥同煎二碗空心服後服連翹

敗毒散

連翹敗毒散 連翹二錢 黃芩八分 黃柏八分 黃連一錢 苦參一錢 歸尾二錢 木通一錢 枳殼五分 銀

花五分 殭蠶一錢 大黃一錢 朴硝一錢 防風八分 荊芥五分 石羔五分 菖蒲一錢 胡麻子八分 蔓

荊子八分 黑牽牛八分 用水三碗煎至一碗半空心服忌食魚腥毒物

疔方屢驗 鮮皮 羌活 香附 連翹 桑寄生 皂角_{皮去淨} 生軍 黃柏 薄荷 地龍_{各二錢存性去} 共為細

末每服一錢用土茯苓煎湯送下又將此藥末三錢加入正蟾酥二分麝香二分用米飯餵為丸硃砂為末如萊豆大先

服藥末一錢次服此丸十四粒不宜多服一過疔症用紫貝浮草一觔防己二兩煎湯每日洗一次洗過之水不宜再用

後用清毒丹調麻油塗患處如疔初起時宜食毒物服藥丸及散後不宜食矣此藥末丸散並能解打丹毒不拘各等

疔疔二服即愈倘係疔症將前藥十味另加槐花蒼耳子大黃各二錢用水同煎服亦用浮萍四兩防己二兩煎水重浸

如龜頭有水及爛先用兒茶一錢水片一分共為細末摻於患處倘症過重清毒丹調麻油塗之自然收口矣

清膏丹 白礬 明雄 石磺 水銀 牙硝_{各五錢} 共為細末放於鍋內上用磁碗四圍封固文武火煉之以三柱香

為度取碗上花紅色者為佳或作別色其丹生矣不宜塗而塗之則痛其丹甚難成十料或一二成耳

疔疔神效 用家園菊花取汁一碗服下即愈無花時取根葉搗汁亦可

又 硃砂 辰砂 水銀 錫花 百草霜 黃丹_{以上各五分} 共為細末用黃明紙捲線分作八九條為率先以冷水含

于口而後薰之每日用一條三四日即見功但其口含之水熱即換之十日全愈戒食生雞赤鯉及酒與房事服藥時宜

食管樹根嫩猪小肚或猪肉如無管樹根用土茯苓嫩猪小肚或肉亦可

再服湯頭方 歸尾 黃芩 山甲 梔子 連翹 生大黃 防風 朴硝 蟬蛻_{各一錢} 蜈蚣_{一條去} 蛇蛻_{一條}

再服方 防風 連翹 荊芥 梔子 白芷_{各一錢} 歸尾 枯芩 蟬蛻 金銀花 地骨皮 生地_{各一錢} 俱用水

酒煎服

疔疔疔同 北細辛三錢 紅棗七枚 銀硃三錢 各存性研末用草紙分燃三條下帳摻于枕畔數天可愈

若重此藥線須先煎萊豆湯待冷取含俟熱即吐出另含可也

治疔毒 疔瘡毒可隨生發無定在起時多有寒熱往來及麻木不痛極惡之症凡指節手心面土骨節各處筋頭胸背皆

有瘡起疔或紅或紫甚則黑紫或白疔紅絲不等急用巴豆一粒飯一粒搗如泥貼疔瘡上拔出疔毒神效 用菊花葉

搗自然汁一碗冲酒服則毒不歸心諸疔毒俱可解 菊花葉汁冲酒服取醉為度蓋被出汗將渣數患處輕者煤炭研

末調敷即愈 入心疔不拘在面上面四肢指頭脚指用指甲煨存性清油調塗疔頭立即止痛消散不塗則毒氣冲

心即死

新染疔毒立效方 生鴨一隻令破 輕粉五錢 先將輕粉五錢用西豆腐兩角已藏輕粉再用夏布已裏煎兩枝玉

香久然後取出為末用飯一茶盅將輕粉豆腐攪勻與生鴨食之片時俟飯已入鴨臟將鴨殺之去其腸臟不取或煮或

蒸任意食之五日後必不發但其毒歸臟未能洗清須要服約後膏湯臟腑方無後患倘不服藥膏後病復發非徒無

益而又害之令將藥膏方列左

生土茯苓一斤先熬加猪 龜板二兩 金蟬退三錢去 槐角四錢 川椒五錢 角刺四錢 生地六錢 穿山甲

打炒 連喬五錢 銀花二錢五分 草節二錢五分 土龜一隻 鍾乳石五錢研 土靈芝一兩即羊屎 同熬成膏服倘

服涼藥過多入弱者再加黨參一兩北芪一兩此方經驗多人服三兩料即可無復發且生子強壯永無胎毒

洗疔方 銀花 九里明 五梧子 草節 明礬 白信 土茯苓 栢子油 共為粗末同搗十片煎水日洗數次

又 連喬二錢 草節二錢 銀花二錢 黃栢一錢 五梧子一錢 大黃二錢 白礬少許 九里明四錢 暗山公

葉四錢 煎水洗日三次又方鴨脚艾葉旱蓮草桃葉槐葉柳葉取汁浸炒 共為細末用猪胆調塗爛疔處

翠雲散 熟石膏一兩 輕粉五分 真胆礬一兩 共為末用猪胆調塗爛疔處

搽疔藥散 滑石二錢 硃砂一錢 冰片二分 共為末搽疔爛患處

疔瘡走黃 丁香四分 木香四分 沉香四分 乳香五分 麝香五厘 共為細末挑破瘡頭用醋先點一點醋調

藥塗之加膏藥貼之三日即愈慎房室飲酒大葷一月方可

立時拔疔毒 草麻子一粒 滴乳香一分 共研細末軟飯或棗肉搗如泥為餅放疔瘡上外加膏藥貼之一時即拔

出其根 試疔瘡食生豆覺無豆味者便是否則非疔

馬嘴疔瘡及玉環疔瘡如起在人中其症最重對時即死倘起在兩邊口 急取生現數枚去壳以生蛻肉搗爛連蛻肉汁

敷之即愈

馬嘴疔

用仁面子不拘解鹹和鳳尾魚頭存性搗敷即愈

又面上生火疔

桑螵蛸七隻存性放在地下一刻去火毒研末用茶油調塗立效

又瘡用之亦可

瘰癧疔頭項心忽生小瘡或紅或白甚者紫黑色其人咽喉

木槌子存性加水片三四厘共為末吹咽喉內即吐痰出又木

槌煎水含引其吐痰然後覓方治之亦有吐痰而愈者

閉口疔

生在人中將起時頭痛身

生鳳尾魚頭煨灰將醋浸仁面去核入魚頭灰於肉咬患處立效無生鳳尾魚即鹹的亦

可鳳尾魚俗名馬條魚

又用生雞冠血點之又用生公雞糞門吸疔頭連換數次即愈

楊梅瘡

珍珠三分 梅片三分 琥珀三分 麝香二分 硃砂三錢 辰砂三錢 活骨三錢 雄黃精三錢 共

為細末分作十二包

天花粉二錢 槐花二錢 黃柏二錢 穿山甲二錢 沒仁二錢 薄荷一錢 苦參二錢

角刺二錢

共為細末亦分作十二包 另用土茯苓一觔四兩分作十二次每次煎湯一茶碗約末調勻服每日

早晚各食一包極驗

疔疳方

土茯苓二兩 甘草六分 雙杏仁六分 大茴六分 九里明葉一錢 將土茯苓先煎好後入各藥同肥

肉五六兩同熬食之更妙

疳疔痔方

防風二錢 荊芥一錢 薄荷四錢 川芎三錢 當歸尾二錢 半夏二錢 滑石二錢 槐花二錢 甘

草一錢

木通二錢 如患係日久加大黃三錢同煎服

瘡部

生瘡神效方 不拘手 白芷 生南星 鬱金 大黃各三 共為末加麝香一分用葱頭搗爛好醋調之再入各藥末

拌勻鋪患處未愈再貼必愈但鋪藥時須留一孔以便出毒若係將起或僅見影一貼即消

大瘡初起

用赤小豆芙蓉葉玉桂末同搗敷立愈用口嚼爛敷更妙或以橘紅葉及甜橙葉搗敷亦可

大毒瘡

名千金 不換丹 料料十枚即 魚公竭 青礬 三觔 入塔內火炮七日加三黃散用石灰封同放在廁內七七四十九日取起

然後聽用

金鑑消毒瘡方 川貝母一錢 知母一錢 川山甲一錢 白芨一錢 半夏一錢 花粉一兩 金銀花一錢 角刺一錢 洋乳香一錢 用無灰酒煎服將渣和芙蓉葉搗爛并水蜜糖調敷瘡上如乾用蜜水調之一宿即消不用再服

服消後忌食發物一月如症重則三劑宜並作一劑服

瘡科藥方 天花粉二錢 黃柏一錢 生大黃一錢 薑黃一錢 香白芷一錢 厚朴六分 天南星六分 陳皮六分 生甘草六分 蒼朮六分 貝母六分 鬱金八分 大茴香八分 白芨六分 木鼈子二枚 防風六分 川

烏頭六分 苦參八分 草烏頭六分 番烏六分 舊橘紅八分 共為末葱蜜開塗

瘡科至妙丹 百足新瓦存性用 大黃炒一錢 山甲一錢 蟾蜍二條炙 全蝎二條炙 共研末蜜為丸如菜豆大每服二分酒送下如毒在上加川芎白芷若在中加桔梗在下加牛膝煎酒送下 另用藥敷之

毒瘡方 名五 黃芩 大黃 薑黃 半夏各三錢 木鼈子五錢 共為末水調塗

將作陰瘡 陳皮二錢 草菓二錢 北細辛五分 蒼朮一錢 南沉香一錢 麝香五厘 川烏一錢 石硫黃四分

共為細末同芙蓉葉搗蜜糖燒酒調敷如見熱去麝香加芙蓉葉或減硫黃

陰瘡方 數日不能行如共 假芥菜 假芝蔴 假苦瓜菜 瓜子菜 同蜜糖搗爛敷患處

消陰瘡良方 既成將漬勿服 北蟾酥一錢半 乳香二錢 沒藥二錢 銅綠二錢 血竭一錢五分 水石二錢 麝香三分 硃砂二錢 雄黃一錢五分 雄黃二錢 全蝎一錢五分 浸 共為細末麵糊為丸如菜豆大每服時

用酒送下七粒至多不過十四粒

陽瘡及小兒瘡 正象胆一兩 苦參八錢 木鼈子二兩 薑黃六錢 山豆根八錢 扁柏一兩 生大黃一兩 青

黛三錢 川黃柏六錢 共為末酒調塗如紅腫甚用生豆腐同藥敷之對口瘡及背癰同用豆腐和藥敷紅腫處如

不紅腫服黃芪內托湯外則敷此藥

敷瘡方 生川烏一錢 黃柏一錢 生草烏二錢 枯礬一錢 山茨姑一錢 雄黃八分 五倍子一錢 白芨一錢

生南星八分 麝香三分 共為細末陽瘡用猪胆汁調塗陰瘡用葱汁薑汁米醋和勻調塗

洗瘡止痛臭妙方 香白芷二錢 樟腦二錢 赤芍藥五錢 乳香二錢 川黃柏三錢 沒藥二錢 用酒一觔煎

洗立即去腐每日一次其臭弗聞其痛立止

塗瘡散 海金沙一錢 山茨菇一錢 白芨六分 蟾酥五分 南星二錢 川連五分 寒水石一錢 水金石一錢

水片二分 紫貝天癸一錢 共研細末磁罐收貯瘡勢紅腫者用蜜水調塗微腫用酒調塗日塗數次甚效

消毒方 生大黃二兩 紅花八錢 血竭三錢 黃丹三錢 共為細末用蘇木四兩煎水放藥末浸濕晒乾燒酒開塗

諸瘡初起統治方 凡癰疽發背魚口便毒頭項胸腹手足腰腿前陰莖門肺癰腸癰無論陽毒陰毒用金銀花四兩歸身

一兩 蒲公英元參各一兩濃煎服一大碗立消 或蔥頭十枚勿用水洗打碎加蜜和敷 天花粉一兩白芷赤芍各

黃各三錢如紅腫加黃柏黃芩蒲黃大黃腫痛加黃芩薑汁同蜜和敷

諸般瘡初起為應散 搗肘樹強皮一兩毒使君葉一兩共搗爛用酒醋調敷之或加南星五枚山茨菇七枚宮花蓬木

蓬共他爛入酒醋調敷之

又 九里明汁一碗 黃芩五錢 黃柏一錢 猪胆一枚 麝香一分 水片一分 以上各藥共煎成膏後入麝香

水片調勻磁盅收貯遇瘡初起即取塗之立消

瓜藤瘡即是一身十餘個 共羊尾 茄葉 五月艾 蔥薑 共搗爛煮醋敷之

對口疽及枕疽 倒吊煤 白菊葉 肥猪即鼠 蒜頭 麝香 水片 生蜜 共搗爛敷之立愈

背癰 向山上或竹林或樹林取一大蟻窠先備空水缸一個放蟻窠在內燒滾水約一小鍋泡之其蟻必盡出即將簣箕

取起其蟻畧乾用蜜糖同搗爛敷之每日換三四次以藥盡為止然後取上等膏藥先貼拔毒後貼生肌者如瘡口有毒

水再用生肌散敷之無不立效

治無名腫毒惡瘡初起 黑丑五兩 白丑五兩 共檳榔三錢 三棱三錢 莪朮三錢 茵陳三錢 牙兒三錢 以

上俱為末 先將二丑為末要頭一次篩出之末一半餘不用其餘五味之末和勻調麵為丸如梧子大每用武夷茶服

三錢其初起者服之立效如大毒已成服之則不驗矣

又 生南星 生半夏 木鼈子 芙蓉葉 各不拘多少為末再用 漿粉炒黑研為末陳醋煮煉成膠入藥末和勻敷患

處治無名腫毒大瘡未成即消已成即潰神效無比敷藥時須留開口子使毒氣出外方妥

治紅腫毒瘡 榴尾青苔 糯米 馬齒莧 三味用沙盆搗爛入蜜一調勻敷之

治諸毒瘡小兒輕項 諸腫俱治 用大鯉魚胆汁塗之立效

青交聖金良方 卷下 瘡部

治諸瘡方 大黃 花粉 白芷 南星 山甲 防風 獨活 乳香 沒藥 角刺 胡椒 黃連 生肌 黃柏

荊芥 雄黃 白礬 斑茅 桂皮 羌活 黃芩 半夏 麝香 水片 各等分 為細末 磁瓶封貯 用時取猪

胆調塗 又骨痛腰痛酒風脚用此藥末作膏心甚有神效

治瘡內托散 桂皮 桔梗 甘草 常歸 赤芍 白芷 各等分 以水二碗煎服

消瘡散 治無名腫毒及跌打腫處流血不止 山茨菇末 紅牙大戟末 各一錢 五倍末 二兩 千金末 二兩 雄黃 硃砂 麝香 各用

糯米糊為丸 每丸重一錢 如大瘡用酒送下一丸 外用一丸開水塗患處立消 製藥期五月五日七月七日九月九日

無有不應孕婦勿服

醫瘡神效活命飲 穿山甲 炒三片 兎角 五分 歸尾 一錢 草節 一錢 金銀花 二錢 赤芍 五分 乳香 五分 沒藥

五分 天花粉 一錢 防風 七分 貝母 一錢 白芷 一錢 陳皮 五分 下部則加牛膝 好酒煎服 最能去

毒消腫定痛化膿生肌如未成服此丸立即消化

軟牙瘡 生蛭三四個 搗開取肉 將壳二隻煨灰 和蛭肉搗爛 敷之甚效

又 嫩白松香 四兩 杏仁 四錢 木鼈肉 三錢 草麻子肉 四錢 上銅綠 五錢 各研細末 和勻入石砍肉搗爛

成膏藥用瓦器收貯待用

風痠瘡 廣陳皮 四錢 草菓 四錢 北細辛 一錢 崖沉香 二錢 蒼朮 三錢 川烏 二錢 共為細末 或加麝香三

厘硫黃一厘 芙蓉花葉搗汁 蜜糖燒酒同為末 和勻敷患處

貢蜈 用敗磁片研極細末 清油調塗 由小至大 由邊至頂

又 用雞屎如糖膠者 攤成膏藥 貼於瘡上 數日即效

貢蜈膏藥 百足 存信 五倍 存性 康青 桑虫屎 松香 肥猪肉 右五味同肥肉搗爛 作膏貼患處

纏身蛇 又名蠱子瘡 用蠟壳研末 清油調塗 屢驗

治瘡散 開楊花 錢半 生 烏 五分 生川烏 五分 先將三味研 乳香 五分 血竭 五分 阿魏 五分 末藥 五分

甘草 三分 兒茶 二分 硃砂 三分 雄黃 五分 麝香 一分 冰片 二分 共為細末 用酒調塗

瘡癰方 用土荊芥搗爛 加蜜少許 調塗患處 或用木鼈子水磨調塗 亦好 又用五更時未語津唾抹之 亦有效驗

又 辰砂八分 血竭八分 乳香六分 沒藥六分 大黃二錢六分 水片二分 三七八分 甘草節六分 共為細

末加珍珠八分用猪胆汁調塗

又 黃連一錢 大黃五分 白芷五分 天花粉一錢四分 急性子一錢 牛黃一錢 苦果一枚 生南星五分 麝香

一分 水片二分 木鼈肉一枚 共研極細末合猪胆熊胆芙蓉根汁京墨為藥條用七月七日水磨塗

火疔瘡 大黃一兩 雄黃精五錢 木鼈子四錢 皮膠三錢 共為末作成條未穿者用酒磨塗已穿者用七月七

日水磨塗

諸瘡及無名腫毒藥線方 巴豆二三兩用沙紙包裹搥油連渣俱要後入血竭輕粉乳香沒藥雄黃硃砂麝香等各四分

和勻捲成紙條浸麻油煎照三五次其瘡立消屢驗

惡瘡似癩十年不愈 用水仙子存性數之

天泡瘡俗名木雞王咬小兒或身或頸癰爛至成水泡 文蛤粉 雄黃 真輕粉 松香 寒水石 煨 雲 川滑石 蜈蚣 洋乳香 沒

藥 各等分為末清油調塗

又 雄黃枯礬共為細末摻患處但見水泡可將衣針挑破去淨水然後將藥擦上即愈忌沾生水

又 用天折菜搗汁連塗數次即愈

治粉瘤 用蜘蛛網已經患處次日又換新的再已約換四五次則全瘤俱消內有結實小粉用手撒去不痛不腫

生粉頭癰 以風栗壳煨猪肉連湯飲食數次其癰漸消

婦科部

妊娠嘔吐數日不食 炒食鹽三分煨姜六分竹茹三分炒米一撮砂糖三錢煎水徐徐服之或有吐蟲吐出加花椒二分

烏梅三枚立效或用水鯉魚一尾蘇兜三錢同煮食并飲湯大妙

保產 當歸一錢詳臨月用歸尾 酒芍一錢 真蘇艾一錢米醋炒 香附二錢 炙芪一錢 阿膠一錢蛤粉炒 荆芥穗二錢 條苓一錢

酒炒二分 貝母一錢打炒 枳壳八分 川羌活八分 厚朴八分 兔絲餅一錢 南樞肉二錢 甘草五分 淨水煎服

遇冬季加紅棗二枚老姜三片去條苓加鹽水炒杜仲二錢

趙氏保產方 當歸一錢酒洗 川芎一錢酒洗 蘄艾一錢醋炒 川羌活五分 兔絲餅一錢酒洗 川朴七分 姜 川枳壳六分鹽炒

精校經驗良方

卷下

婦科部

五

荆芥穗五分炒一

細甘草五分

生黃芪五分又一方用八分

大白芍一錢二分春夏秋用冬用一錢

川貝母一錢去心姜汁炒研細末和藥服

加生薑二片水二盞煎八分服此方宜預於未產時空心服產下不宜服矣

李氏安胎保產方

當歸一錢

貝母八分

黃芪八分

紫蘇六分

枳壳六分

黃芩五分

白芍一錢

甘草二分

厚朴五分

藿香三分

蘼艾三分

兎絲子四分

右藥戥准用白水兩碗煎好熱服凡婦人懷孕三五月或感冒寒熱胎動不安及未足月之時服之即安如足月當產服之即產不論體之強弱年之老少服一二劑或三四劑自然

安胎保產其效如神但既產下切勿再服

益母丸

益母草取紫花方並者八兩不犯鐵器搗碎風乾

當歸

赤芍

木香各二兩

各為細末煉蜜為丸如彈子大照後引服一胎

前臍腹刺痛胎動不安下血不止用米湯或秦艽當歸煎湯送下一胎前胎後臍腹作痛作聲或寒熱往來狀如瘧疾者

米湯下一臨產並產後各先用一丸童便入酒下安魂定魄調順血氣諸痛不作並可催生

催生奇方

用新筆新紙新墨淨硯書

日月似箭急共五個字貼在產婦房門即下不下貼入房內如仍不下即用火

焚此五字於淨水中與產婦服即下矣寫此五字不宜挑鉤至要

又急採樹葉一片或花或草葉皆好要新鮮青色的用淨水貼在床背勿令人知見即下

難產神效方

熟地黃一兩

真綿芪蜜炙一兩

當歸身四錢

白茯苓三錢

西潞黨四錢

淨龜板醋炙四錢

川芎一錢

白芍酒炒一錢

枸杞子四錢

難產不下者連服此方二三貼只用頭煎不用二煎如不見效必須多服數貼蓋產以氣

血為主若忍痛久則傷氣下水多則傷血氣血兩傷產何能下此方大補氣血產久不下者連服此方無不神效或疑產

婦先感外邪補之則恐邪錮不知痛甚且久則腠理齊開邪從表解矣產水迸下邪從水出矣到此時候有虛無實一定

之理切勿遲疑試驗日久萬無一失此方宜於發動半日汗出以汗出為度即可服之

催生仙方

此方未產即安既產即生並治機生逆產胎死腹中

海南椰子蒂即椰子益頂便是

用二三個又用陰手拈米一撮陽手拈米一撮加清遠

茶葉一撮同炒透用水二三碗煎至米開花為度服之片時即生

催生屢驗靈符

用黃紙二條每條二指大長三四寸之間一條寫紫英夫人在此

紫英夫人在此

紫英夫人在此

紫英夫人在此

紫英夫人在此

紫英夫人在此

此係在熱水盥內

既產即將孕婦貼床頭一條用元寶一對向簾當天化送如遲恐生腸並出

羊寫寫時面向東

羊寫寫時面向東

羊寫寫時面向東

羊寫寫時面向東

羊寫寫時面向東

羊寫寫時面向東

羊寫寫時面向東

又 杏仁一粒去皮折開兩邊一邊寫日字一邊寫月字其日月二字俱不要挑鉤用蜜糖少許合還以熱水一茶盅送下

又 用紅草麻四十粒生雞一隻約重十兩八兩之間連毛同草麻子搥爛貼左右兩脚底既產即除去洗淨脚底如瀉出生腸即將此藥貼頭上頂心一經縮入即要除去

又 當歸六錢 川芎三錢 髮餘五分 龜板五錢 將藥煎好和黃酒半盅沖滾勻服

胎前難產 凡孕婦累日不下危急之至將草麻子十四粒去壳明礞砂一錢五分雄黃一錢五分蛇脫一尺燒存性共研

細末用漿水飯和丸如彈子大先用椒湯淋濕產婦臍下後將一藥丸放於臍內用帛數重裹之闊帛束之如兒頭卡急

取去藥

橫生逆產 懷孕九月即用吉房蠱九隻多一月加一隻搥爛加酒飯糟一碗和勻再搥煮煖向頭上頂心刺光厚數之自

然縮上如一日一夜尚不縮即去之用青草搥爛敷回定然縮上即將原數頭上之藥取下加糟分作兩堆令產婦赤足

踏住將餘藥連脚背敷之留脚指了不敷至兩時辰之久即可轉動生下效驗如神

產血不止 用百草霜熱酒冲服如產後血痛用白雞冠花煎酒服或山槿煎汁加片糖冲酒服

胎衣不下 用無名異三錢以鴨卵白調勻碗貯次用老米醋一茶盅滾熱和藥調服其胎衣即縮如秤鏹樣下來如或不

下再服前藥三錢必下經驗不虛

又 生雞一隻連毛剖開用新塔煎水坐薰之另用川芎八錢歸身一兩荊芥三錢香附三錢煎水薰鼻胎衣立下屢試神

驗或用雄雞一隻連毛剖開去臟蓋孕婦臍上雞頭向上以布繫緊即下

又 用生竈立產婦食之即下

又 冷產婦鬆裙帶扶起直立一時俟腹中轉動復將裙頭平胸緊着胞衣即下起身時令穩婆捧兒頭略高為妙 取紅

草麻葉若所產者男則用雙女則用單將葉打碎米醋炒貼兩足心即下倘遲不去葉則腸出若腸出將此藥貼頭頂則

復入 灶心土炒研末加朴硝冲水服 枯礬三分用乾荷葉或花煎水冲服 用醋炒牛屎布包慰腹兼下死胎 一

方用竹向屋正脊連冲幾次即下

產婦中風 歸身 荊芥 等分為末每服二錢水一盞酒少許童便少許煎七分蘆之下咽即愈

產後婦人風氣危急 用香信三兩鐵炒至大焦色米醋一碗煎飲三四杯即愈

產後風癩面如藍色去衣露體眼見鬼神 岡松蟻窠一兩名萬軍窠去淨松毛揉碎用生米一撮與蟻窠同炒米沸時下

水二碗煎至半碗飲之立效

產婦血昏 乾漆渣破漆器燒烟薰之即醒 乾荷葉燒末溫酒和服 荊芥穗研末服或吹鼻亦好

又 用韭菜打碎入酒壺加以滾熱醋泡之將壺口對鼻冲之立醒 不省人事用五靈脂半生半炒或加炒蒲黃研末開

水灌服二錢入喉即愈 忌食蒼麥如與白矾同食立死 一方用舊鐵器燒紅取米醋一盤將燒紅鐵器放醋內置產

婦房中令聞醋氣立愈

血崩及產後血眩 荊芥一兩 川芎二兩 當歸三兩 淨水煎服忌食魚腥

血山崩 用人家益牆頭之碎甕塊捶碎如豆大炒熱碎醋飲之立愈

產後流尿 婦人產傷尿泡茶水入口即尿用大鯉魚一尾止取鯉魚鱗用油煮令酥脆加以鹽醋姜料拌鱗蒸食立效

蘇氏產後發熱作惡發狂方 益母艾汁一杯 老薑汁一杯 茶油一杯 黃酒一杯 便底水一杯 共和勻蒸線

杏一枝久熱服

月信不調 阿膠炒末每服二錢酒送下

經閉不通 鼠糞燒灰熱酒送下一錢即通

調經奇方 當歸一錢五分 陳皮七分 川芎八分 白芍一錢 元胡七分 熟地一錢 香附一錢 茯苓八分 丹

皮七分 吳茱萸二錢滾水炮去黑 水去蒂梗酒炒 如經行先期紫色加條芩一分酒炒 經行後期色淡加官桂五分 泡黑姜五分 艾葉

五分 引用生薑一片水一碗煎至八分空心溫服藥渣再煎臨卧服須俟經行日起服連用四劑次月再用四劑則經調

受孕矣 如有外感他症則且緩服

張氏生化湯 全當歸八錢 真川芎三錢 炮薑五分 炙甘草一錢 桃仁一錢去皮 粒花五分 此方孕婦臨

月俟肚痛照方預備一劑用水二碗即煎煎好加黃酒一茶盅再煎滾去渣燙熱待產下時量便一盅未進飲食之前即

行服下逐瘀生新永免產症倘三日內精神疲倦或腹中作痛再連服三兩劑即愈更治產後乃小產一切危症奇效如

神按產後諸症總以生化湯為君其餘不過隨症加減而已若惡露已行腹痛已止去桃仁粒花再多幾劑服之不妨如

口喝加麥冬花粉寒痛加肉桂砂仁傷食肉加山楂傷飯食加麥芽傷果品食加麵裹煨草菓數分傷酸梅食加吳茱萸

口喝加麥冬花粉寒痛加肉桂砂仁傷食肉加山楂傷飯食加麥芽傷果品食加麵裹煨草菓數分傷酸梅食加吳茱萸

三五分傷 葷肉食加生龜板傷藥食及西瓜加肉桂

婦人陰戶起毒肉此症或大或起或收 白螺獅壳性 南星二錢 半夏三錢 柴胡二錢 甘草一錢五分 用麵糊為丸早晚服愈

婦人肝瘡 川大黃二錢 梔子二錢 生地一錢 白芷一錢 連喬一錢 歸尾八分 羌活八分 銀花一錢 木

鼈子二枚 苦參二錢 蟬退五分 川連一錢 山甲一錢 淨水煎服

婦人懷孕 凡婦人懷孕三四個月者可買雄黃精十粒用布袋隨在身下則六甲平安無犯

兒科部

小兒初生數日不飲乳 用溼檳榔半邊葯灰俱備令其母自食將頭一啖檳汁吐入小兒口內其汁直入腹中腹中必響

其痰即出如是三四吐痰必吐盡牙關自開即能飲乳倘肚實口鎖者則取葱頭老薑搥爛數臍中自愈

小兒生下斷臍帶方 甘草一錢 薄荷一錢 川連一錢 麝香一厘 水片一分 共為細末蜜糖為膏用胭脂一

塊為紙凡小兒生下斷臍帶後即用棉花鋪在臍上將此膏藥貼在棉花上用布扎緊勿令其脫如溼了藥則又換過乾

者貼至滿月之後久此更好永無驚風三朝七日之患後亦無貽毒與瘡癰等症即出痘亦稀

月兒封臍散 丹頭一錢 雄黃一錢 黃丹一錢 枯礬五分 炮姜三錢 麝香一分 水片一分 共研細末放

在臍上用棉花蓋住再加油紙蓋之用帶扎緊不可弄溼若溼即含溼藥照前法另換乾藥已之

小兒鎖喉 用木芙蓉搗汁煎雞卵如薄餅一貼臍門一貼肚臍即愈

又 用黑鯢魚胆一個入糯米在內懸簷前陰乾遇此症取米七八粒研末以小竹管吹入舌上即愈

開關辟鎖愈風散 蜈蚣三 雞肉金一 皮膠三 雄黃三 麝香一 老硃砂三 水片一 青

皮五分 鹽蛇一條 生鹽少許 木槌子十枚 先將鹽蛇蜈蚣同剪碎用新瓦炒乾次用生鹽皮膠青皮等入木

槌子內炒黑後將數味並木槌共研細末但臨症時 須看孩兒苔黃者加竹瀝姜汁乳汁調服若舌腭上有泡起須用

銀針挑破及舌底有黑血筋亦用簪挑破去其瘀毒即用薄荷陳皮煎水京布洗之立愈症淺者用七厘吹入鼻內即愈

小兒急慢驚風驗方 取芙蓉花嫩葉約五六塊男嬰女單將其葉切碎合雞卵打勻煎作三薄餅乘熱敷小兒臍上凍

又換數次即愈

小兒慢脾驚有此病者是也 雄黃精 樟腦 水銀 麝香 水片各一 共為末加蒜子二粒去皮和藥搗爛敷臍上外用

精校經驗良方

卷下

艾絨封益一時立愈並治男婦吐瀉不獨治小兒此症也孕婦則忌用

小兒急慢驚風貼肚臍方

全蝎九隻

僵蠶九條

三仙丹三分

麝香五厘

梅片三分

共為細末用蜜糖為餅

貼臍中藥餅上再加膏藥貼密勿令洩氣

竺黃三錢

珍珠五錢

血珀三錢

麝香五厘

牛黃六分

冰片五分

川連八分

應驗七厘散

天麻三錢

僵蠶二錢

甘草一錢

白附子一錢

共為細末用磁罐貯之勿令洩氣

胆星二錢

天麻三錢

僵蠶二錢

甘草一錢

白附子一錢

共為細末用磁罐貯之勿令洩氣

小兒驚風身熱

硃砂五錢

蜜糖五錢

和勻分作三次白拂水調服其熱即退

驚風失語

雞卵黃二枚炒黑用碗蓋住將米醋半碗淋下灌入病人口其痰即吐自愈

小兒急慢驚風經驗火穴

手掌心三焦

腳掌心三焦

照此法即愈

小兒鎮驚丸

牛黃四分

胆星五分

珍珠五分

琥珀三分

雄黃精五分

僵蠶五分

薄荷葉二分

金箔十二

張 防風一錢

鉤藤鉤五分

竹黃青五分

炙草二錢

硃砂五分

麝香二分

上梅片二分

全蝎頭足

共為細末用蜜為丸重二分金薄為衣如寒者用姜湯開服熱

天麻一錢

白附子五分

半夏五分

水製

共為細末用蜜為丸重二分金薄為衣如寒者用姜湯開服熱

者薄荷水開服小兒在一歲之內每服半丸不宜過多

小兒疳積神方

君子一錢

石決明四分

仙子一錢

山楂一錢

麥芽八分

蟬脫頭足

柴胡四分

地

骨皮四分

海螵蛸四分

硃砂一錢

淮山藥一錢

犀角四分

白朮五分

建蓮七分

川厚朴五分

黃二分

百草霜五分

羊肝二兩

共研極細末用福柿熟粥開服每服二錢

水仙子五錢

谷精一兩

百草霜三錢

蟬蛻六錢

海螵蛸一兩

礞砂五錢

蜜蒙花一兩

硃砂三錢

共為末將一半入猪肝蒸食一半入粥食

又 羊胆一個蜜糖調勻飯面蒸熟與小兒食之數日一服至小兒不肯食其病即能全愈

又 夜明砂三錢

硃砂一錢

枯礞砂八分

使君肉二錢

淮山藥二錢

仙子二錢

海螵蛸三錢

共為細

又 末每用粥水調服一錢五分如積已上服加蟬蛻壯三錢為末和勻調服

又 香茅葉二枚連皮用水煮熟去皮食極效

又 百草霜一兩

雄黃二錢

青黛五錢

共為末蒸羊肝食

又 土木 五錢 淮山 五錢 白朮 五錢 陳皮 二錢 仙子 五錢 牛膝 五錢 銀花蕊 三錢 使君肉 二錢 川

活石 三錢 用水洗過 共為細末入飛淨硃砂錢半調勻每用三錢蒸猪肝食即愈

又 猪苓 五錢 茯苓 五錢 青黛 五錢 硃砂 五錢 海螵蛸 五錢 共為細末每日用牛肝和藥一錢蒸食

試疳膏 青皮 二錢 橘紅 五錢 使君肉 半錢 白朮 一錢 茯苓 七錢 麥冬 三錢 金英肉 五錢 芡實 二錢

山槿肉 五錢 麥芽 五錢 建蓮心 五錢 甘草 一錢 共為末用蜜煉成膏若是疳疔必愛食此

小兒消積 使君肉 三錢 白芍 二錢 夜明砂 一錢 礞砂 一錢 蟬蛻 一錢 硃砂 八分 正陳皮 一錢 牛膝 一錢

炒 銀花蕊 一錢 海螵蛸 二錢 共為細末加白糖少許每服五分日三服用粥水開

小兒肚痛積痛 用龍眼樹身經繞草其葉樣與榆相似取葉曬乾炒過煎水作茶飲

小兒肚痛積痛散 夏薑 二錢 青皮 一錢 茯苓 二錢 神麴 二錢 檀肉 一錢 元胡 一錢 香附 一錢 醋炒

三苓 八分 莢術 八分 靈脂 一錢 共為細末每服一錢粥水開服

小兒面黃生蟲神效 向東邊斬苦楝樹頭皮去青用白剪碎加細茶煎水飲其蟲自出

導蟲 苦楝根皮 三錢 姜汁 燒酒 拌炒 小兒 三錢 則用 白芍 五錢 正陳皮 一錢 使君肉 五錢 搗爛炒 水三碗煎至一

茶盅加明淨黃糖一兩每服要旬日方驗

肥兒糕 山槿肉 一兩 白朮 一兩 白茯苓 一兩 蓮肉 一兩 酒芍 五錢 山藥 一兩 神麴 五錢 陳皮 四

錢 水仙子 五錢 肥大 甘草 三錢 澤瀉 四錢 蓮肉 一兩 芡實 一兩 專治小兒肚大青筋骨

瘦毛焦瀉痢疳熱等症服之瘦者能肥弱者能壯效驗如神 如瘦極成疳加蘆薈二錢 腹中泄瀉加肉果三錢麵煨

內熱口乾大便結加川連三錢薑汁炒 潮熱加銀胡三錢 骨蒸熱加地骨皮五錢 有蟲加使君肉三錢炒 肚

腹脹大便瀉水腸作聲加檳榔五分木香一錢 右為末煉蜜為丸如彈子大空心米飲送下二三錢 此藥味不甚苦

平時可與常吃若腹瀉不必蜜丸可散入磁罐密封勿令洩氣用米飲調下加上白糖少許或加白糖粉白糖作餅亦可

肥兒餅 苡仁 四兩 淮山 二兩 麥芽 一兩 芡實 四兩 茯苓 三兩 建蓮 二兩 檀肉 一兩

富邊 二兩 仙芋 一兩 水 一兩 麥芽 一兩 芡實 四兩 茯苓 三兩 建蓮 二兩 檀肉 一兩

小兒吐瀉 正厚朴 二錢 澤瀉 一錢 車前子 一錢 共為細末每服一錢白滾水冲連服三次