

明 李時珍編著

本草綱目

人民衛生出版社影印

本草綱目

(上、下册)

开本：850×1168/32

印张：57 $\frac{8}{16}$

插页：9

明·李时珍 编著

人民卫生出版社影印

(北京书刊出版业营业许可证出字第〇四六号)

·北京崇文区横子胡同三十六号·

农业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

统一书号：14048·1062

1957年4月第1版—第1次印刷

定 价：8.00 元

1963年6月第1版—第4次印刷

印 数：18,601—35,600

樣本庫



李時珍像 (1518—1593)

紀稱望龍光知古劔。蜺寶氣辯明珠。故萍實商羊。非天明莫洞。厥後博物稱華。辯字稱康。析寶王稱倚頤。亦僅僅晨星耳。楚靳陽李君東壁。一日過予。弇山園謁予。留飲數日。予窺其人。粹然貌也。癯然身也。津津然譚議也。

予弇山園謁予留飲數日予窺其人
粹然貌也癯然身也津津然譚議也

歷代諸家本草

[illegible]

勅封文林郎四川蓬溪縣知縣蘄州李時珍編輯

雲南永昌府通判男李建中

黃州府儒學生員男李建元

校正

應天府儒學生員

黃申

同明

太醫院醫士男李建方

蘄州儒學生員男李建木重訂

生員孫李樹宗

生員孫李樹聲次卷

生員孫李樹勳

荆府引禮生孫李樹本楷書

金陵後學 胡承龍梓行

“本草綱目”的第一刻本，開刻於明萬曆十八年(1590)，是李珍親自主持而由金陵胡承龍承刻的。目前該刻原書在國內雖有，但有全帙。茲特選影四幀於上，以資介紹真蹟。

右上:王世貞原序首頁,左上:卷一首頁,右下和左下:輯書人姓氏

內 容 簡 介

本草學是祖国醫學中一個重要的組成部分，對人類醫藥衛生事業有著很大的貢獻。本書是我國本草學中一部在世界上享有聲譽的著作，因為它不僅總結了十六世紀以前我國人民用藥的經驗，並以當代的成就大大豐富了本草學的內容。

本書作者李時珍（一五一八—一五九三），是我國明代一個偉大的醫藥學家。他以嚴謹的治學態度，用了三十年的時間，編成此書。除參考八百多種有關書籍之外，對於許多重要藥物，還親至各地進行實物採訪，並結合他自己的臨床經驗，才作出慎重的記載。

本書共五十二卷，分十六綱，六十二目。收載藥物將近一千九百種，其中三百七十多種是新收錄的。正文以前，先附實物圖譜，次叙「百病主治藥」，然後依綱就目分述各種藥物的釋名、集解、氣味、主治、修治、發明、正訛、附方等項。由於本書的論述範圍極為廣泛，除了詳述藥物的臨床應用外，還包括有中藥炮制法、藥物鑑定法、藥物培植法……等各方面的知識。因此，本書的用途不僅與臨床治療密切結合，且可供多種專門學術研究者的參考。

總之，本書對我國本草學的發展起着重大的作用，一方面使明以前的歷代本草學，經過作者的「剪繁去復，繩謬補遺」後，得到了比較全面的整理；另一方面因本書對藥物的「析族、分

類、擬制、分目」要求頗為嚴格，給明以后的本草學研究者提供了有利的條件，直到今天，仍為醫藥學界和其他學術研究者所重視。所以，本書自明代刊行以來，不僅國內翻刻甚多，並已譯成多種外國文字而流傳于國際間。

茲據刻本較精的清、光緒十一年（一八八五）張氏味古齋刻本影印。為了使該刻本在質量上提高一步，特據本書第一個刻本「金陵第一板」（李時珍生前開刻的）加以校勘，附校勘記于后。更為符合實用起見，除加編「藥名、釋名索引」外，並根據清、蔡烈先編《萬方針線》一書的內容，改編為「附方索引表」，一併附于卷后。因此，本書在效用上較一般刊本尤為實用。

罌子粟

宋開

釋名米囊子 實御米上象穀子時珍曰其狀如罌

穀而可以供 御故有諸名

集解 藏器曰萬子其囊如囊頭有細米上

氣其處有紅如餅子多其囊如囊頭有細米上

月布子涉冬始生苗極繁茂其花亦不凋年黃地九

者不度侯餅焦黃乃采之其花亦不凋年黃地九

日罌子粟秋種冬生嫩苗大小如草莖子其花亦不凋年黃地九

四月罌子粟結莢莢開則莢脫食甚佳葉如白莖三

蓋罌子粟在二寸大如馬兜鈴上三飯下即謝而罌子粟在莖

酒罌中有一寸大如馬兜鈴上三飯下即謝而罌子粟在莖

緣豆粉作腐食尤佳亦可取油其殼人藥甚多而

本自春不載或謂古人不用之也江東人呼干葉者

者半紫者半白者紅者紫者粉紅者杏黃者半紅

日寶生丹曰錦被花詳見游燕齋食譜又

米氣味甘平無毒 利二便動勝多食 主治丹石發

動不下飲食和竹瀝煮作粥食極美 石人研此水

黃加蜜作 行風氣逐邪熱治反胃胸中痰滯 治

瀉痢潤燥 珍時

經 圖 泄痢赤白 罌子粟子炒罌子粟殼炙等分為末煉

有入經 百一選方 時珍曰凡用以水洗瀉去蒂及筋膜取外

殼脩治 薄皮陰乾細切以米醋拌炒入藥亦有蜜

炒蜜 多者

氣味酸澆微寒無毒 時珍曰得醋 主治止瀉痢固

脫肛治遺精久欬肺澀腸止心腹筋骨諸痛 時

發明 某曰收斂固氣能入腎故治骨病尤宜 震亨

戒者用之止瀉其治痢之功雖急殺人如劍宜深

此乃收後藥也治痢亦同凡痢須先散邪行滯而

可遠投粟殼龍骨之藥以閉塞腸胃邪氣得補而

愈甚初病不可用之泄瀉不已也時珍曰酸主收

而腸滑肛脫欬嗽諸病既久則氣散不收而肺脹

痛劇故俱宜此澀之固之收之按楊氏直指

方云粟殼治痢人皆薄之固矣然下痢日久腹中

無積痛當止澀者豈容不固不有云此劑何以腹中

乎但性緊澀多令嘔逆故人畏而不取服若用醋

神加尤不致閉胃妨食矣或同四君

子藥 尤不致閉胃妨食矣或同四君

附方 新熱痢便血 每服三錢烏梅湯下 普濟方

久痢不止 罌子粟殼炙等分為末煉

果殼十兩 罌子粟殼炙等分為末煉

分生用 罌子粟殼炙等分為末煉

四兩為細末 罌子粟殼炙等分為末煉

小兒下

痢神仙救苦散治小兒赤白痢下日夜百行不止
半兩炒赤研末各收每用等分赤痢蜜湯水泄不
服白痢沙糖湯下忌口味全愈久嗽不止

止各藥十枚水一盞煎七分溫服大棗肉久嗽不止
穀氣素壯人用之即效粟穀去筋蜜久嗽虛嗽同
知百勞散治五服之即效粟穀去筋蜜久嗽虛嗽同
時白湯下取一兩烏梅半兩焙為末每服二錢臥
宣明方

嫩苗氣味甘平無毒主治作蔬食除熱潤燥開胃

厚腸時珍

阿芙蓉目網

釋名阿片時珍曰俗作鴉片名義未詳或云阿方
集解時珍曰阿芙蓉前代罕聞近方有用者云是
針刺其外面青皮勿損裏面硬皮或三五處大早
津出以竹刀刮收入瓷器陰乾用之故今市者猶
粟花片不令水淹頭七八月花謝後刺青皮取之者
案此花五月實枯安得七八月
後尚有青皮或方土不同乎

氣味酸溫微毒主治瀉痢脫肛不止能澀丈夫
精氣時珍

發明時珍曰俗人房中術用之京師售一粒
附方新久病服阿芙蓉小豆許空心溫水化下日一

集赤白痢下鴉片木香黃連白朮各一分研末飯
米飲下忌醋一物生油膩茶酒麪無不止者口渴
暑飲下忌醋一物生油膩茶酒麪無不止者口渴
包神效赤痢用紅花者白痢用白朮者一服一粒金丹
真阿芙蓉一分多服飯後作三服每服一丸未效
再進一丸不可多服飯後作三服每服一丸未效
口目下偏頭風川芎湯下痰喘防風湯下陰風下
活酒下偏頭風川芎湯下痰喘防風湯下陰風下
薑阿膠湯下勞嗽冬花湯下吐衄霍香湯下諸氣
痛黃連湯下白痢薑湯下血氣痛下人血崩五靈脂湯下
下噎食生薑丁香湯下血氣痛下人血崩五靈脂湯下
兒慢脾風雲林醫鑑

本草綱目穀部第二十三卷終

草綱目穀部目錄第二十四卷

穀之三 菽豆類十四種

大豆 本經 大豆黃卷 本經 黃大豆 食鑑

赤小豆 本經 腐婢 本經 綠豆 開寶

白豆 嘉祐 稽豆 拾遺 豌豆 拾遺

蠶豆 食物 豇豆 綱目 藹豆 別錄

刀豆 綱目 黎豆 拾遺 即狸豆

右附方舊五十一新一百

本草綱目穀部第二十四卷

穀之三 菽豆類一十四種

大豆 本經中品 校正 禹錫曰 原附大豆

釋名 未 俗作菽時珍曰 豆未皆莢穀之總稱也 象中之形廣雅云 大豆曰菽 莢曰莢 莢曰莢 莢曰莢

集解 別錄曰 大豆生大山平澤九月采之 須曰今雄用之尤佳 宗奭曰 大豆有絲褐黑三種 有大小兩類 大者可出江浙湖南湖北小者生他處 入藥力斑數色 黑者可名烏豆 時珍曰 大豆有黑白黃青至前腐榨油造醬餘但可作腐及充食而巳 皆以夏

成義 結莢長寸餘 經霜乃枯 按呂氏春秋云 得時之豆長莢短足其莢二七為族 多枝數節小莢則時後時者必短莢先時者必長 蔓浮葉疎節小莢則時焦矣 知種豆不用深耕 豆花惜見日則黃燭而根

易得 可以備凶年 小豆不保歲而難得也 伯曰生

黑大豆 氣味甘平無毒 久服令人身重 溫熱寒

器曰 大豆生平炒食極熱 養食甚寒 作政極冷 造醬及生黃卷則平 牛食之溫 馬食之冷 一體之中

用之 數變 磨汁良 惡五參龍膽得前胡烏喙杏

仁 牡蠣肉同食 必壅氣致死 十有八九 十歲以上

炒豆 豬肉珍曰 服麻子者忌炒豆 犯之脹滿致

死 服厚朴者亦忌之 動氣也

忌之 動氣也

忌之 動氣也

忌之 動氣也

忌之 動氣也

主治 生研塗癰腫 黃汁飲 殺鬼毒止痛 經本逐水服

除胃中熱 癰傷中淋露 下瘀血 散五臟結積內寒

殺烏頭毒 炒為屑 主胃中熱 除癰去腫 止腹脹消

穀 別養食 治溫毒水腫 唐本調中下氣 通關脈 制金

石藥毒 牛馬溫毒 華日黃汁 解礬石砒石甘遂天雄

附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒及蠱毒入藥

治下痢臍痛 衝酒治風痙及陰毒腹痛 牛膽貯之

止消渴 時珍曰 炒黑熱投酒中飲之 治風癰癰緩口噤

產後頭風 食罷生吞半兩 去心胸煩熱 熱風恍惚

明目鎮心 溫補久服好顏色 變白不老 養食性寒

下熱氣腫 壓丹石煩熱消腫 藏主中風腳弱 產後

諸疾 同甘草黃湯飲 去一切熱毒氣 治風毒腳氣

養食 治心痛筋攣膝痛脹滿 同桑柴灰養食 下水

鼓腹脹 和飯搗塗 一切毒腫 療男女人陰腫 以酥

裹納之 孟治胃病 利水下氣 制諸風熱 活血解諸

毒 時珍曰

發明 領曰 仙方脩治末服之 可以辟穀度饑 然多

便覺身輕 又益陽道也 類曰 陶華以黑豆入鹽煮

[illegible]

大豆一升青竹算子四十九枚長熟毒攻眼赤痛
四寸闊一分水煮熟日夜二服蒸卒然中惡大豆
用黑豆一升分作十袋沸湯中煮卒然中惡大豆
過更互熨之三遍則愈普濟方用黑豆三升
升和勻頓服一箇酒半陰毒傷寒危篤者用黑豆
升則復飲汁出腸痛如打大豆半升熬焦入酒
爲度居家必用腸痛如打大豆半升熬焦入酒
后腸脇卒痛大豆炒二升酒三升卒然腰痛六升
水拌淫炒熱布裏熨之冷即易乃腳氣衝心煩悶
張文仲所處方也三升酒三升身面浮腫豆千金
汁以未定再服水廣利方更煮三升分溫三服不
五升再合王廖百一選方用烏豆煮至皮乾爲末
瘥再服二錢米飲下建炎初吳內翰立效新久水腫
忽發腫凸吳檢外臺得此方服之立效新久水腫
再煎取一斗清水一斗煮取八升去豆入薄酒八升
方腹中病硬夏秋之交露坐夜久腹中病如群石
煎一升已來頓霍亂脹痛方寸匕研水服水痢不
服大服三錢炒白朮兩方未赤痢臍痛黑豆一升
止每服一錢米飲下指南方赤痢臍痛黑豆一升
之良接摩經吞嚥赤白下痢方見男子便血黑豆一升
熱酒淋之去豆飲酒一切下血雄黑豆一升
去皮爲末煉豬脂和丸梧子大每服小兒沙淋
三十丸陳米飲下華陀中藏經熱腎虛消渴
入滑石二十箇生甘草一寸新切心鑑腎虛消渴
者黑大豆炒熟花分爲末糊丸梧子大每消
黑豆湯下七十丸日二名救活丸普濟妙方

渴飲水鳥豆置牛膽中陰乾百晝夜不眠以新布
目并蒸大豆更盡囊盛枕之冷即疫癘發腫大黑
易終夜常枕之即愈水一盞煎汁時飲之夷壁
合妙藥炙甘草二錢京師大藥房異人書此方要
志云靖康二年春京師大藥房異人書此方要
立驗也乳石發熱烏豆二升水九升銅器煮五升
解響砒毒大豆黃汁飲酒食諸毒服得吐即愈汁
廣解諸毒魚毒大豆黃汁飲酒食諸毒服得吐即愈汁
飲之方惡刺瘡痛即瘥豆黃汁飲酒食諸毒服得吐即愈汁
飲之方惡刺瘡痛即瘥豆黃汁飲酒食諸毒服得吐即愈汁
升頓服劇者不過三升作千金方二疏瘡煩躁大豆
養汁飲之佳痘瘡淫爛未傅之小兒頭瘡炒豆
性研子母秘錄身面疣目七月七日以大豆拭向
屋東頭第方溜中豆生葉以染髮令烏醋煮黑大
熱湯沃殺即愈外臺秘要染髮令烏醋煮黑大
稠染之牙齒不生三不掬粒大半小兒年多者用黑豆
入麝香少許先以鐵挑破血出以少許牙齦疼痛
指之不得見風忌酸鹹物經驗方牙齦疼痛
黑豆煮酒類類煎之月經不斷服之佳牙齦疼痛
良周密治然齊抄月經不斷服之佳牙齦疼痛
痛合空升心飲之醋煮心鏡子死腹中月數未足母
汁頓服立出產衣不下大豆一升半升酒三
產服辟穢時氣新布盛大豆一升半升酒三
產服辟穢時氣新布盛大豆一升半升酒三

中蛇蠱 蛇毒入菜果中食之令人得病名身如蠱

行加少 大豆漬絞漿旦洗之或小兒丹毒濃黃大

之甚良 風疽瘡疥凡脚腫及腫中癢搽則黃汁

豆一升 在內以馬屎糠火燒薰以器兩頭取金方

之先以 泔清和鹽洗之不過三度極效黑豆懸風

肝虛目 暗迎風下淚用臘月粘牛膽盛黑豆懸風

木小兒 胎熱黑豆二錢甘草一錢入燈心七寸天

蛇頭指 痛臭甚者黑豆生研末濟急方

大豆皮 主治生用療痘瘡目瞤嚼爛傳小兒尿灰

瘡時珍

豆葉主 治搗傳蛇咬頻易即瘥時珍○出

發明時 珍曰按抱朴子內篇云相國張文蔚莊內

乃於有 鼠咬穴養四子為蛇所吞鼠狼雄情現

腰皮斷 而劈腹街出四子尚有氣置於穴外街豆

葉嚼而 傳之皆活後人以

附方新 止渴急方黃豆苗嫩者三五十莖塗酥炙

聖錄小 便血淋黃大豆葉一把水四升人參湯下

花主 治主目盲腎膜時珍

大豆黃 卷中本經

釋名豆 葉之景曰黑大豆為葉牙生五寸長便乾

曰一法 壬癸日以井華水浸

氣味甘 平無毒雄鼠屎共蜜和良惡海藻龍膽

主治溼 痺筋攣膝痛本五臟不足胃氣結積益氣

止痛去 黑肝潤肌膚皮毛別破婦人惡血孟詵頌

多婦藥 中宜腎思除胃中積熱消水病脹滿時

附方新 四大豆葉散治周痹邪在血脈之中水腫不

留帶胃 中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣用大豆

藥一斤 炒香為末每服半錢溫酒調下日三服

明方頭 風溼痺筋攣膝痛胃中積熱大便秘結兩

為末食 前溫水服一水病腫滿喘急大小便澀大黃

錢等分 以細末為度聖濟總錄二小兒撮口芽研爛

絞汁和 乳灌少許良普濟方

黃大豆 經食

集解時 珍曰大豆有黑青黃白斑數色者惟黑入

尺葉似 黑大豆葉而大結角比黑豆角稍肥大其

可食甘 美時

氣味甘 溫無毒時珍曰生溫炒熱微毒多食壅氣

主治寬 中下氣利大腸消水服腫毒原研末熟水

和塗痘 後瘡時珍

附方 新痘後生瘡 黃豆燒黑研末香油調塗。

豆油氣味 辛甘熱微毒 **主治** 塗瘡疥。解髮腫。時珍

稽主 治燒灰入點瘡去惡肉藥。時珍

赤小豆 本經中品 **校正** 自大豆分出

釋名 赤豆 恭紅豆 俗名 荅 荅葉名 荳 時珍曰 案詩云

荳麥此卽入穀也 董仲舒註云 荳是大豆有兩種

小豆皆小豆也 此則入藥用赤小者也 此則

集解 頌曰 赤小豆今江淮間多種之 宗奭曰 關西

河北汴洛多食之 時珍曰 此豆以緊小而赤

黯色者入藥 其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病

俱于夏至後下種 苗科高尺許 枝葉偃而不治微

腐氣結莢長二三寸 比綠豆莢稍大 皮色微白帶

紅 可作粥飯 餛飩 餅 收之可煮可

氣味 甘酸平無毒 渴作瀉同飯食成口瘡 藏器曰

人食身重

主治 下水腫 排癰腫 膿血 經 療寒熱 熱中消渴 止

洩痢 利小便 下腹脹滿 吐逆 卒 辟 治熱毒 散惡

血 除煩滿 通氣 健脾胃 令人美食 搏末同雞子白

關節煩熱 令人心孔開 暴痢後氣滿不能食者 煮

食一頓卽愈 和鯉魚煮食 甚治脚氣 託解小麥熱

毒 煮汁解酒病 解衣黏綴 辟瘟疫 治產難 下胞

衣通乳汁 和鯉魚鱗魚鯽魚黃雌雞煮食 並能利

水消腫 時珍

發明 弘景曰 小豆逐津液 利小便 久服令人肌

以袋盛此 須曰 水氣逐津液 利小便 久服令人肌

治水者惟知治水 夕踏履轉胃 則失之 遂愈 好古曰

和桑根白皮煮汁 治水腫 乃其藥也 藏器曰 赤小豆

設氣無根 名脫皮煮食 去脾胃 乃其藥也 藏器曰 赤小豆

故行津液 利小便 消腫 除血 而通乳汁 下痢 腸

解酒病 除寒熱 癰腫 排膿 散血 而通乳汁 下痢 腸

產難 皆病 除寒熱 癰腫 排膿 散血 而通乳汁 下痢 腸

所以 治其 肌瘦 身重 久服 則辟 瓜蒂 共工 氏作 不

才 子 以 冬 至 其 通 氣 除 溼 散 寒 赤 豆 或 言 共 工 氏 作 不

豆 粥 厭 之 亦 傳 會 之 妄 說 而 畏 赤 豆 或 言 共 工 氏 作 不

得 赤 小 豆 一 升 煮 粥 食 之 當 衣 陳 明 是 日 作 不

此 謾 記 之 又 朱 氏 集 驗 方 云 宋 仁 宗 在 東 宮 時 患 載

而 愈 命 道 士 贊 寧 治 之 取 赤 小 豆 七 十 粒 爲 末 傳 永

授 醫 以 藥 治 之 甚 驗 承 亮 曰 得 非 赤 小 豆 耶 醫 五

鄰 家 乳 婢 用 此 治 之 甚 驗 承 亮 曰 得 非 赤 小 豆 耶 醫 五

及 赤 腫 不 拘 善 惡 但 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

性 黏 乾 則 難 揭 入 芋 根 末 調 塗 卽 不 黏 此 法 尤 佳

附方 新舊十八水氣腫脹 頌曰用赤小豆五合大蒜

條並碎消也 同水煮爛去藥 空心生薑五錢 商陸根一

盡腫立消也 同水煮爛去藥 空心生薑五錢 商陸根一

若已殺人赤小豆一斗 煮極爛取汁 水腫從脚起入腹

汁以東行花桑枝燒灰 以代飯 水蠱腹大 動搖黑者

水養食小豆以消為度 根一握 辟瘴瘟疫 正月朔旦

及十五日 以赤小豆二七枚 辟布囊盛 正月朔旦

中二七枚 竟年無病也 女辟厭疾病 東正月元日 吞

赤小豆并華水吞 赤小豆七枚 又七月立秋日 傷

面西以井華水吞 赤小豆七枚 又七月立秋日 傷

寒狐惑 欲臥汗出 初得三四日 目赤如鳩 七八日

目四皆黃 黑若能食者 屢已成也 赤豆當歸散主

服方寸小豆三升 水浸令芽出 當歸三兩 為末 藥水

止更互坐 之即水穀痢疾 小豆取合 鎔蠟三兩 熱毒

下血 末因食熱物發 動赤梅師方 腸痔下血 升苦酒

五升 末酒服 日乾再浸 至酒盡乃止 舌上出血 如管

豆末 升酒服 日乾再浸 至酒盡乃止 舌上出血 如管

和絞汁 升酒服 日乾再浸 至酒盡乃止 舌上出血 如管

二錢 服一莖 搗酒熱調 重舌驚口 赤小豆末 醋和 小

兒不語 四歲 真秘旨 赤小豆 牙齒疼痛 擦牙末

一及吹 入花 驗少許 家寶方 中酒嘔逆 黃汁徐

徐飲之 頻致墮胎 赤小豆末 酒服方寸 妊娠行

食鑑本草 婦人難產 集驗治難產 日久氣乏 用赤小

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

兩同煎 少時一服 五合 不過三四服 即產 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

豆一升 以水九升 煮取汁 入炙過黃明膠 一胞衣

芽主治妊娠數月經水時來名曰漏胎或因房室
名曰傷胎用此爲末溫酒服方寸匕日三得效乃
止。時珍○出普濟

腐婢
下本品經

集解 別錄曰腐婢生黃中
家不用乾四十日婢生黃中
花別錄乃云未審是否今海
莖葉多曲氣似腐臭土人呼
酒浸皮服療心腹疾此當是
恭曰腐婢相承以爲葛花葛
全無此效當以葛花爲真禹
花亦有腐蘇與葛花爲真禹
病相合陶蘇二說並非服權
也頌曰海邊小樹葛花赤小
之名名同物異也宗奭曰腐
是必不多辨時珍曰葛花已
便治熱中下氣止渴與腐婢
無疑但中豆有數種甄氏藥
論獨指爲赤小豆今姑從之

氣味辛平無毒主治瘰癧寒熱邪氣洩痢陰不起
止消渴病酒頭痛本經○心鏡云上證用花同豉汁五味養羹食之消酒
毒明目下水氣治小兒丹毒熱核散氣滿不能食
養一頓食之藥性治熱中積熱痔瘻下血時珍○宣明葛花丸

附方
新飲酒不醉
小豆花葉陰乾百日爲末。水服
方寸匕。或加葛花等分。千金

疔瘡惡腫之小豆花末傳
普濟方

綠豆
寶宋開

釋名 時珍曰綠以色名也舊本作萊者非矣。

集解
 志曰綠豆屬小者佳粉作餌炙食之良大者
 有官綠油綠苗瘵則一小時能下氣治霍亂之良
 四月下種苗高尺許葉小而而有毛至秋開小花
 如赤豆莢較粗而綠色鮮者爲官綠皮薄而粉多
 小而色深者爲油綠皮厚而粉少早種者呼爲鶩
 綠可類摘也蓮種呼爲拔絳一拔而北人用之
 甚廣可作豆粥飯豆酒燭食炒食磨而爲麵澄
 濾取粉可以作餌蠅餅蠹皮搓索爲食中要物以
 水浸淫生白芽又爲菜中佳品牛馬之食亦多賴
 之眞濟世之良穀也

氣味甘寒無毒。藏器曰用之宜避皮去皮則令人子殺害人。合鯉魚鮓食久則令人肝黃成渴病。主治養食消腫下氣壓熱解毒生研絞汁服。治丹毒煩熱風疹。藥石發動。熱氣奔豚。實治寒熱熱中。止泄痢卒澀利小便脹滿。思厚腸胃作枕明目。治頭風頭痛除吐逆。日華補益元氣和調五臟安精神。行十二經脈去浮風潤皮膚。宜常食之。煮汁止消渴。孟洗解一切藥草牛馬金石諸毒。隋原治痘毒利腫脹時珍

發明
時珍曰綠豆肉平皮寒解金石砒霜草木一切諸毒宜連皮生研水服按夷堅志云有人

服附子酒多頭腫如斗。唇裂血流急求緣。
豆黑豆各數合。嚼食。並煎湯飲之。乃解也。
附方 新蜀鵲三豆飲 治天行痘疹。預服此飲。疎解。
豆黑大豆各一升。甘草節二兩。以水八升。煮極熟。
任意食之。飲汁。七日。乃止。○一兩。以水八升。煮極熟。
豆名五豆。痘後癰毒。赤小豆。以三豆。膏等分。為之神效。綠豆。
時飲。豆五豆。痘後癰毒。赤小豆。以三豆。膏等分。為之神效。綠豆。
醫學正傳。即消。防痘入眼。用綠豆。七粒。令兒未齋調。
小兒丹腫。綠豆。五錢。大黃。二錢。全用。生。赤痢。不。
止。以大麻子。水。研。濾。汁。煮。綠豆。食。老。人。淋。痛。二。青。豆。
橘皮。二兩。煮。豆。食。可。下。麻子。汁。一。升。空。消。渴。飲。水。豆。
食。汁。並。作。粥。飲。其。汁。甚。驗。汁。一。升。空。消。渴。飲。水。豆。
食。汁。並。作。粥。飲。其。汁。甚。驗。汁。一。升。空。消。渴。飲。水。豆。

食易饑 綠豆。黃麥。糯米。各一。升。炒。熟。磨。粉。十。種。水。
氣。用。綠豆。二。合。半。大。附子。一。隻。去。皮。磨。切。作。兩。片。
作。四。碗。煮。熟。空。心。臥。時。食。大。去。皮。磨。切。作。兩。片。
綠豆。附子。再。以。綠豆。二。合。半。大。附子。一。隻。去。皮。磨。切。作。兩。片。
從。小。便。下。腫。如。前。煮。食。二。合。半。大。附子。一。隻。去。皮。磨。切。作。兩。片。
鹽。酒。六。十。日。腫。不。消。末。消。再。服。四。日。如。前。煮。食。二。合。半。大。附子。一。隻。去。皮。磨。切。作。兩。片。
綠豆粉氣味甘涼平無毒 原。曰。其。膠。黏。者。脾。胃。虛。
近。杏。仁。則。爛。主。治。解。諸。熱。益。氣。解。酒。食。諸。毒。治。發。
不。能。作。索。主。治。解。諸。熱。益。氣。解。酒。食。諸。毒。治。發。
背。癰。疽。瘡。腫。及。湯。火。傷。灼。吳。痘。瘡。溼。爛。不。結。痂。疔。
者。乾。撲。之。良。新。水。調。服。治。霍。亂。轉。筋。解。諸。藥。毒。
死。心。頭。尚。溫。者。時。解。菰。菌。砒。毒。正。

發明 時。珍。曰。綠豆。色。綠。小。豆。之。屬。木。者。也。通。於。厥。
久。服。陰。解。毒。之。力。過。之。且。益。氣。厚。胃。通。經。無。
偏。於。熱。能。致。人。病。皆。人。所。為。非。豆。酒。或。偏。於。冷。或。
以。綠。色。其。神。效。詳。錄。一。日。朱。氏。有。論。發。癰。疽。有。內。托。心。散。須。
極。謂。其。神。效。詳。錄。一。日。朱。氏。有。論。發。癰。疽。有。內。托。心。散。須。
攻。能。補。腎。切。詳。錄。一。日。朱。氏。有。論。發。癰。疽。有。內。托。心。散。須。
寒。能。補。腎。切。詳。錄。一。日。朱。氏。有。論。發。癰。疽。有。內。托。心。散。須。
佐。甘。草。石。發。解。五。金。入。石。百。藥。毒。為。使。想。此。方。專。
為。體。虛。者。發。解。五。金。入。石。百。藥。毒。為。使。想。此。方。專。
翹。湯。亦。非。必。用。之。劑。必。當。助。氣。壯。其。在。之。患。五。香。連。
而。行。經。活。血。為。佐。參。治。施。之。早。可。使。毒。氣。外。堅。固。
發。此。則。內。托。之。本。意。治。施。之。早。可。使。毒。氣。外。堅。固。
附方 新。十。護。心。散 治。一。日。至。三。日。之。內。宜。連。有。

十。餘。服。方。免。變。或。使。毒。氣。出。外。服。之。稍。遲。毒。氣。內。
攻。宜。間。服。之。用。真。綠豆。粉。一。兩。食。之。香。矣。四。日。後。
研。和。勻。以。生。甘。草。湯。煎。一。下。乳。香。半。兩。燈。心。同。
毒。氣。沖。心。有。嘔。逆。之。證。大。宜。服。此。益。綠豆。時。壓。熱。若。
氣。消。腫。真。聖。藥。也。香。消。諸。腫。腫。毒。服。至。三。錢。乾。脂。下。
瘡。孔。中。真。聖。藥。也。香。消。諸。腫。腫。毒。服。至。三。錢。乾。脂。下。
下。一。李。嗣。立。外。科。方。瘡。氣。嘔。吐。半。錢。研。勻。新。汲。水。調。
止。普。服。立。霍。亂。吐。利。水。調。服。即。愈。各。二。兩。新。汲。水。調。
燒。酒。毒。綠豆。粉。多。食。之。即。解。皮。利。水。調。服。即。愈。各。二。兩。新。汲。水。調。
毒。汁。綠豆。粉。多。食。之。即。解。皮。利。水。調。服。即。愈。各。二。兩。新。汲。水。調。
服。者。用。綠豆。粉。多。食。之。即。解。皮。利。水。調。服。即。愈。各。二。兩。新。汲。水。調。
陳。氏。傳。定。其。效。如。神。此。方。打。撲。損。傷。新。汲。水。調。服。即。愈。各。二。兩。新。汲。水。調。
木。皮。傳。定。其。效。如。神。此。方。打。撲。損。傷。新。汲。水。調。服。即。愈。各。二。兩。新。汲。水。調。
陳。氏。傳。定。其。效。如。神。此。方。打。撲。損。傷。新。汲。水。調。服。即。愈。各。二。兩。新。汲。水。調。