

張氏醫通卷之九

長洲石頑張

璐路玉父纂述

男

登誕先

叅訂

倬飛疇

瘡瘍

癰疽

癰疽一科自有專擅其術者以是手輯醫通獨畧此門然有兼患內證瘍醫不能措指者因取靈素金匱明之新甫等數條列之本門諸凡治例未遑

遍述。庶免瘡環同類之誚云。

靈樞云。夫血脈營衛周流不休。上應星宿。下應經數。寒邪客於經絡之中。則血泣。血泣則不通。不通則衛氣歸之。不得復反。故癰腫。寒氣化爲熱。熱勝則肉腐。肉腐則爲膿。膿不瀉。則爛筋。筋爛則傷骨。骨傷則髓消。不當骨空。不得泄瀉。血枯。空虛。則筋骨肌肉不相榮。經脈敗漏。熏於五藏。藏傷則死矣。癰發於頤中。名曰猛疽。猛疽不治。化爲膿。膿不寫。塞咽。半日死。其化爲膿者。寫則合。豕膏冷食三日而已。發於頸。名曰天。

疽。其癰大以赤黑。不急治。則熱氣下入淵液。前傷任脈。內熏肝肺。十餘日而死矣。陽留大發。消腦留項。名曰腦爍。其色不樂。項痛如刺。以鍼煩心者死。發於肩及臑。名曰疵癰。其狀赤黑。急治之。此令人汗出至足。不害五藏。癰發四五日。暍熇之。發於腋。下赤堅者。名曰米疽。治之以砭石。欲細而長。疎砭之。塗以豕膏。六日已。勿裹之。其癰堅而不潰者。爲馬刀挾癭。急治之。發於胸。名曰井疽。其狀如大豆。三四日起。不早治。則入腹。不治。七日死。發於膺。名曰肝疽。色青。其戕發。出。

實菰藪常苦寒熱急治之去其寒熱半歲死死後出
膿發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其狀
大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小豆剉陵翹草
根各一升

零陵連翹根各一升也

以水一斗六升煮之竭爲取

三升則強厚衣坐於釜上令汗出至足已發於股脛
名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿傳骨不急治三十
日死發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三
十日死發於股陰名曰赤疽不急治六十日死在兩
股內不治十日當死發於膝名曰疵癰其狀大癰色

不變寒熱如堅石。勿石石之者死。須其柔乃石之者
生。諸癰疽之發於節而相應者不可治也。發於陽者
百日死。發於陰者三十日死。發於脛名曰兔齧。其狀
赤至骨。急治之不治害人也。發於內踝名曰走緩。其
狀癰也。色不變。數石其輪而止其寒熱不死。發於足
上下名曰四淫。其狀大癰。不急治百日死。發於足傍
者名曰厲癰。其狀不大。初如小指。發急治之去其黑
者不消。輒益不治百日死。發於足指名脫癰。一名其
脫疽其
狀赤黑。死不治。不赤黑不死。不衰急斬之。不則死矣。

營氣稽留於經脈之中。則血泣而不行。不行則衛氣從之而不通。壅遏而不得行。故熱大熱不止。熱勝則肉腐。肉腐則爲膿。然不能陷骨髓。不爲焦枯。五藏不爲傷。故命曰癰。熱氣深甚。下陷肌膚。筋骨枯內連五藏。血氣竭。當其癰下。筋骨良肉皆無餘。故命曰疽。疽者。上之皮夭以堅。上如牛領之皮。癰者。其皮上薄以澤。此其候也。○病有形而不痛者。陽之類也。無形而痛者。陰之類也。無形而痛者。其陽完而陰傷之也。急治其陰。無攻其陽。有形而不痛者。其陰完而陽傷之。

也。急治其陽。無攻其陰。陰陽俱動。乍有形。乍無形。加
以心煩。命曰陰勝其陽。此爲不表。不裏。其形不久。
身有五部。伏兔一。腓二。腓者。脛也。背三。五藏之俞。四
項五。此五部有癰疽者。死。○喜怒不測。飲食不節。陰
氣不足。陽氣有餘。營氣不行。乃發爲癰。陰陽不相通。
兩熱相持。乃化爲膿。○其白眼青。黑眼小。是一逆也。
內藥而嘔。是二逆也。腹痛渴甚。是三逆也。肩項中不
便。是四逆也。音嘶色脫。是五逆也。除此五者爲順矣。
素問曰。高粱之變。足生大丁。受如特虛。○汗出見溼。

乃生痲痺。○營氣不從逆於肉理。乃生癰腫。○氣傷痛。形傷腫。先痛而後腫者。氣傷形也。先腫而後痛者。形傷氣也。

金匱云。諸浮數脈。應當發熱。而反洒淅惡寒。若有痛處。當發其癰。師曰。諸癰腫。欲知有膿無膿。以手掩腫上。熱者爲有膿。不熱者爲無膿。

發熱而脈見浮數。證脈相應也。脈見浮數而反洒淅惡寒。是火鬱不得發越。若有痛處而飲食如常。必發癰腫之候。腫熱未甚。尤可消散。腫熱已劇。癰

膿已成。後世用溼紙貼腫上。候其癰腫之頭。亦不出乎此意。

浸淫瘡。從口流向四支者。可治。從四支流來入口者。不可治。

浸淫瘡。黃連粉主之。方缺

病機機要云。癰癰者。結核是也。或在耳後。或在耳前。或在耳下。連及頤頰。或在頸下。連缺盆。皆謂癰癰。或在胸之側。或在兩脇。皆謂之馬刀。手足少陽主之。此本膏梁丹毒火熱之變。因虛勞氣鬱所致。止宜補形。

氣調經脈。其瘡當自消。蓋不待汗之下之而已也。其
不詳脈證經絡受病之異者。下之先犯病。禁經禁故
致失手。且有兼痰兼氣兼血兼陰虛等證者。病本不
同。治當求責。○瘡瘍者。火之屬。須分內外以治其本。
肉之外者。其脈沉實。發熱煩躁。外無焮赤。痛深於內。
其邪氣深矣。故疏通藏府以絕其源。外之內者。其脈
數。焮腫在外。形證外顯。恐氣盛而犯肉。故先托裏也。
內外之中者。外無焮惡之氣。內亦藏府宣通。知其
在經。當和營衛也。用此三法之後。雖未愈。必無變證。亦

可使邪氣峻減而易愈。

外科精要云。熱發於皮膚之間。浮腫根小。至大不過二三寸者。爲癰。六府積熱。騰出於肌肉之間。其發暴盛。腫皮肉光軟。根脚廣大。爲癰。五藏風毒積熱。攻焮肉骨。風毒猛暴。初生一如蓐毒。形自焦枯。觸之應者。乃疽也。夫五善七惡者。動息自寧。飲食知味。一善也。便利調勻。二善也。膿稠腫消。不臭。三善也。神采精明。語聲清爽。四善也。體氣平和。五善也。煩躁時嗽。腹痛渴甚。或泄利無度。小便如淋。六惡也。膿血大泄。腫焮。

尤甚膿色敗臭痛不可近者二惡也喘麤短氣恍惚嗜卧三惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視者四惡也肩背不便四肢沉重五惡也飲食不下服藥而嘔食不知味六惡也聲嘶色敗脣鼻青而目四肢浮腫七惡也五善見三則瘥七惡見四則危然則病有源同七惡者乃皮緊急而知善也病有源同五善者乃皮緩虛而知惡也是豈凡醫所知哉凡人初見發背欲結未結赤熱腫痛先以溼紙覆其上立視候之其紙先乾處卽是結癰頭也取大蒜切

成片如三錢厚薄安於頭上用大艾炷灸之三壯卽
換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時方佳最
要早覺早灸爲上一日二日十灸十活三日四日六
七活五六日三四活過七日則不可灸矣若有十數
頭作一處生者卽用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚
艾於蒜餅上燒之亦能活也若背上初發赤腫一片
中間有一片黃粟米頭子便用獨蒜切去兩頭取中
間切三錢厚正安瘡上著艾灸十四壯多至四十九
壯此謂癰疽初發宜灸之也然諸瘡患久成漏者常

有膿水不絕其膿不臭肉無反肉尤宜用附子浸透切作大片厚三二分於瘡著艾灸之仍服內托之藥隔二三日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣至有膿水惡物漸漬根深者郭氏用自麪硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分安瘡上用艾灸二十一壯一灸一易灸後四五日方用挺子紐入瘡內反肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥內服應病之劑調理卽瘥矣蓋不止宜灸於瘡之始發也惟發於頭腦者皆不可灸頭爲諸陽之會灸之反助

其火毒耳

腫瘍○薛立齋曰腫瘍者以瘡瘍未潰而言也經云
形傷痛氣傷腫又云營氣不從逆於肉裏乃生癰腫
皆因膏粱厚味七情陰火或少灸燂甘美積毒氣血不
和所致當分其經絡所屬五藏相勝與元稟虧損預
爲審用攻補調和之劑速令散潰尤當審其勢之腫
漫色之赤白與痛有微甚毒有表裏若腫高焮痛便
利調和邪在表也宜表散之腫硬痛深大便秘瀉邪
在內也宜下之外無拘急內則便利調和者邪在經

絡也宜調營衛腫焮大痛或麻木不痛邪氣凝滯也
外用隔蒜灸內服活命飲或歸耆飲尤効無問何部
分但赤腫者必消若煩躁飲冷赤痛發熱二便不通
者火熱內熾也用四味清涼飲或活命飲加大黃尤
善若微腫微痛或不痛陽氣虛弱也參耆內托散微
黯微赤或不赤或惡寒而不作膿或膿熟而不潰者
陽氣虛寒也竝用千金托裏散如此則未成者自能
消已成者自能潰尤當別其屬陰屬陽或半陰半陽
而治之若泥於腫瘍禁用辛熱之說不分受證之因